


ХОЗЯИНЪ,

СОСТАВЛЯЮЩІЙ

ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕГО СОЧИНЕНІЯ И ПЕР-
ВЫЯ ШЕСТЬ ЧАСТЕЙ ЗАНИМАЮЩІЙ.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

Отдѣленіе второе.



Х О З Я И Н Ъ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ III ГЛАВЫ.

*О полевыхъ плодахъ каждого особенно
и обхожденія съ оными.*

Е. Г о р о х ъ.

Въ странахъ, гдѣ любяшъ больше копченое и соленое, нежели свѣжее мясо, горохъ сославляешъ лучшее первое блюдо съ шakovымъ мясомъ, и больше употребительное молочныхъ ѣствъ какъ у городскихъ, такъ деревенскихъ жителей, даже у людей средняго состоянія, какъ-то извѣстно въ сѣверныхъ частяхъ Нѣмецкой земли; почему шамъ и больше прилежашъ къ сѣву гороха, нежели въ южныхъ Нѣмецкихъ земляхъ. Но какъ горохъ и для употребленія въ кормъ скотинѣ какъ зерномъ, такъ и соломой своею въ опшѣнномъ обыкновеніи, также и въ перемѣнѣ сѣва на пашняхъ родовъ хлѣбныхъ не малое участіе занимаетъ, то посѣвъ онаго всюду совѣтую.

Въ первой Части сего сочиненія, при описаніи и разсмотрѣніи различныхъ па-

Часть III. Отдѣл. 2. А 2 шен-

шенныхъ сиснемъ видѣли чишапели, въ каковомъ порядкѣ горохъ съ прочими полевыми плодами слѣдуешь. Но гдѣ еще удержано обыкновенное раздѣленіе полей на три клина, яровой, озимой и парину, шамъ сѣюшъ горохъ большею часшью только въ паровомъ клину, а по гороховищу озимую пшеницу или рожь; ибо сїи хлѣбы непосредственно послѣ гороху ошмѣнно урожающся: пошому что горохъ не шокмо землю очень умягчаешъ, но убавляешъ и число сорныхъ травъ, кои широкими своими листьями заглушаешъ. Онъ поправляетъ землю и шѣмъ, что усугубляетъ внутреннїя оной силы, служа онымъ шравянымъ навозомъ въ опадающихъ своихъ листьяхъ, какъ о томъ писано уже въ первой Части. Въ нѣкоторыхъ шранахъ называющъ сѣвъ гороху въ паровомъ клину лѣшнимъ сѣвомъ, или занимаіемъ пароваго земли на лѣшо подъ горохъ.

Есшлы шучную землю, когда оная вновь угобжена навозомъ, обсѣяшъ горохомъ, растешъ онъ слишкомъ въ солому, и мало приноситъ зеренъ. По сему должно подъ горохъ избирать средшвенную землю. Глина, съ пескомъ смѣшанная, сосшавляетъ очень удобную землю подъ горохъ. На черноземѣ и супескѣ, на низменностяхъ, горохъ также слишкомъ идешъ въ солому, и во все лѣшо цвѣтешъ; должно въ эшомъ случаѣ скашивашъ съ молодаго гороха верхушки, чѣмъ запре-
 паш-

пяпствовано будешъ безпрестанному цвѣ-
щенію, и горохъ принесетъ зерна круп-
нѣе. До самаго прибранія съ поля цвѣту-
щій горохъ производишь, что много оспаеш-
ся зеленыхъ зеренъ, кои не шокмо вкусъ,
но и доброшу вида въ горохъ уменьша-
ють; ибо въ разсужденіи варенаго полеваго
гороху желаютъ, чшобъ оной, какъ воскъ,
желтъ на шолѣ казался. Эшопъ желшой
цвѣтъ гороховаго кушанья составляетъ
купно предвѣщаніе его добраго вкуса. Ко-
гда же оной сѣръ, или не желтъ въ варе-
ній, заключають о прошивномъ. Но эшо
должно разумѣть лишь о полевомъ горо-
хѣ; ибо шолбчашой горохъ, кошорой
въ разсужденіи шолшой на немъ кожи про-
ширають, никогда не можетъ быть ша-
ковъ желтъ, какъ воскъ. Эшо свойствен-
но одному шолько хорошему полевому го-
роху; а чшобъ онъ имѣлъ совершенную
доброшу, должно, чшобъ опчасни мяг-
ко разваривался, часстью же чшобъ и луз-
га съ него скакивала, а пошому не было
бы нужды и въ прошираніи. Естли же
полевой горохъ шолспокожъ, такъ чшо
шребуешь проширанія сквозъ сито, и для
шсла посредшвеннаго состоянія людей
составляетъ эшо уже не хорошее онаго
качество.

Образъ пріугошвленія пашни подъ
сѣвъ гороху не можетъ во веѣхъ мѣсахъ
быть одинаковъ. Гдѣ земля плотная и
связная, шамъ къ посѣву гороху въ паро-

вомъ клину должно пашню съ осени еще вспахать взмешомъ, и еспьли оная надлежишь къ самымъ твердымъ, шо подъ зиму и передвоишь, дабы можно было рано весною горохъ сѣять. Но гдѣ земля меньше плошна, тамъ вспахивають землю уже весною, и прямо по свѣжимъ бороздамъ сѣютъ. Горохъ пускаетъ свой корень на поларшина въ землю. Еспьли земля тверда, должно пахать глубже, дабы облегчить шѣмъ проицаніе корней въ глубину, а на рыхлыхъ земляхъ можетъ онъ и безъ того самъ укоренишься.

Гдѣ сѣютъ горохъ въ паровомъ клину, дабы снявъ оной непосредственно сѣять озимой хлѣбъ, тамъ по большой части землю унавоживаютъ, и по запаханіи навозу горохъ разсѣваютъ. Еспьли же земля не плошна въ связи своей, не худо горохъ сѣять не подъ борону, а запахивать, и особливо когда сѣвъ происходитъ не рано, дабы въ землѣ оспалось довольно влажности, члобѣ и въ недостаткѣ дождя горохъ могъ взойти и роспи порядочно. Въ эшомъ намѣреніи вспахивають землю поздно осенью, рано по веснѣ начисто проскораживають, угобжаютъ навозомъ, разравниваютъ оной, по навозу сѣютъ горохъ, мѣлко запахивають и послѣ заскораживають. Въ нѣкопрыхъ мѣстахъ возяшь навозъ на землю подъ горохъ еще съ осени, разравнианіемъ онаго по пашнѣ землю какъ бы при-

кры-

крывають, и шѣмъ не шокмо ошмѣнно оную умягчаютъ, но и упшучняютъ, какъ о томъ писано уже въ первой Часпи сего сочиненія.

Въ которыхъ большихъ помѣстьяхъ состоишъ недостатокъ въ сѣнѣ, шамъ прилежашъ къ великому сѣву гороха, дабы соломою онаго замѣнить недостатокъ въ сѣнѣ для овецъ. Гороховая солома, ешъли шолько горохъ не былъ поврежденъ мучняною росою, и ешъли не мокра оная свезена съ поля, всѣхъ прочихъ соломя въ кормъ овцамъ лучше. Полагають въ шаковомъ случаѣ мѣру высѣву гороха на сшо овецъ по 6 чешвериковъ въ паровомъ клину.

Поселику прежде о нѣкоторыхъ сѣменахъ сказано, что полезно онымъ одно проскораживаніе, ошчаспи когда онья всходишъ начнушъ, частью же когда и совсѣмъ взошли, дабы землю по состоянію пашни и погоды содержишъ опшверзшою, шакже и сурѣпицу изшребить; однако шаковаго проскораживанія надъ горохомъ, горошкомъ и сочевицею никогда производишъ не должно. Сіи спручковые плоды могушъ бышъ шѣмъ въ концѣ погублены.

Полеваго гороху два рода, *ранней и поздній*: первой сѣтсѣ, лишь шолько снѣгъ сойдешъ, а другой въ Апрѣлѣ; они не слишккомъ шерпяшъ вредъ ошъ ночныхъ морозовъ, развѣ уже велики опрошупшъ. Такъ на примѣръ видѣли мы въ

1781 году, когда извѣстные Майскіе морозы въ споль многихъ странахъ хлѣбъ повредили, при чемъ въ пядень опроспшѣ горохи какъ варомъ поварило, а позднѣе, въ половину первыхъ росомъ, хошя пошерпѣли, но ошяшъ справились и вновь корень оппустили.

Многіе Хозяева за шѣмъ больше сѣютъ горохъ ранней, что оной обыкновенно опщѣшается и завязывается въ спручѣе прежде, нежели сполько вредныя горохамъ мучняныя росы упадшъ начинаютъ. *Хагедорнъ* пишетъ: Осшорожный Хозяинъ долженъ спарашъя завести хорошій родъ ранняго гороху, которой снизу зацѣшается, и много спручей приноситъ: эшомъ родъ поспѣваетъ заблаговременно, и уходитъ чрезъ шо отъ многихъ мучняныхъ росъ. Когда горохъ цѣшетъ, и въ эшо время случитъся мучняная роса, или многократно сухая молнія, производитъ сѣе погибель его. —

Случается однако и раннему гороху отъ мучняной росы поврежденіе, или отъ противной погоды плохой урожай. Для сего въ большихъ помѣстьяхъ производятъ шроякой сѣвъ, подобно какъ-шо дѣлаютъ съ грѣчихою, дабы, когда два сѣва не удадутъся, шо третій навѣрно будетъ хорошъ, а чрезъ эшо въ здоровой гороховой соломѣ, въ пользу овцеводства, ни въ которомъ году не будетъ недоспашку. Если же удадутъся два сѣва, или еще
всѣ

всѣ три, ранній, средній и поздній, по
составитѣ это великую замѣну сѣну, ибо
нѣтъ лучшаго корму какъ для овецъ, такъ
лошадей и рогаатаго скопа, умалчивая о
томъ, что въ урожайные годы горохъ при-
ходитъ самъ - 8 и самъ-двенадцатъ, и про-
дажа онаго составляетъ хорошій доходъ.
Между учинелами домоводства отличает-
ся въ особливости въ разсужденіи гороху
Экхартъ, который возражавъ прошиву
нѣкоего обычая сѣять плодъ эшотъ въ
нѣкошорыя перемѣны луны, послѣ о шрой-
номъ онаго сѣвѣ говоритъ слѣдующее: Хо-
зяину должно поля свои искусно распоря-
жать, для каждаго рода сѣменъ способ-
ную землю избирать, и кой часъ время
года и состояніе погоды позволивъ, на-
чать сѣвъ, и рачительно оной продол-
жать. Поелику въ большихъ помѣстняхъ
и безъ того сѣвъ не можетъ окончанъ быть
прежде 4 и даже 6 недѣль, по сѣе правило
къ тому самое лучшее: не должно сѣву
производить въ одно время; это безъ за-
трудненія расположить можно, когда ше-
ченіе сѣву продолжается отъ 4 до 6 не-
дѣль, по выдѣтъ въ эшотъ ранній, сред-
ній и поздній сѣвъ, и тогда съ шерпѣ-
ніемъ ожидать, который изъ нихъ лучше
удастся. — Но должно каждому Хозяи-
ну какъ въ разсужденіи гороху, такъ и про-
чихъ хлѣбовъ, стараться имѣть чистыя
и здоровыя сѣмена, а не червоточенныя
и сморщившіяся; гороховыя чшобъ были

крупны, тяжелы, лосковаты, красноватобѣлы, и безъ всякаго сору. —

Въ сѣменахъ, гдѣ очень прилежатъ къ сѣву гороху, господа собираютъ въ зимніе вечера ребяшишекъ, и приказываютъ онымъ сѣменный горохъ перебирать, какъ для того, чѣмъ не попало съ онымъ въ землю сѣменъ сорныхъ травъ, шакъ чѣмъ и сѣменный горохъ имѣтъ вышеописанной доброты.

Гдѣ сѣется вблизи гороховищъ малой горохъ или собственно называемый горошекъ, тамъ между самыми опборными сѣменами въ посѣвѣ бѣлаго лѣшняго гороху проскакиваютъ многія черныя горошинки. Причины иной шому не можно полагать, кромѣ чѣмъ сѣменная пыль цвѣтущаго горошку попадаетъ на цвѣшны бѣлаго гороху, бывъ принесена вѣтромъ, и оныя оплодоношиваетъ. *Хагедорнъ* говоритъ объ этомъ, не показывая причины, слѣдующимъ образомъ: Почасту горохъ перераживается, и приноситъ вмѣсто бѣлаго цвѣту красноватой. Отъ бѣлыхъ цвѣтовъ выходитъ бѣлой горохъ; красноватой же напрошивъ производитъ черныя зерна. Сначала при молодѣи различіе это не очень примѣтно; но когда горохъ полежитъ нѣсколько мѣсяцовъ въ жишницѣ, мало по малу много зеренъ почернѣютъ. Въ вареньѣ это разношны не дѣлаетъ, кромѣ чѣмъ зерна сїи не шаковы желшны выходятъ, какъ бѣлаго гороху; вкусъ одина-

наковъ. (Въ эшомъ люди тонкаго вкуса совсѣмъ не согласны). Въ продажѣ убытокъ уже больше; всякой покупатель не думаетъ, чтобъ черной горохъ былъ столь-кожъ вкусенъ и питателенъ, какъ бѣлой; почему шаковой горохъ бракующъ и дающъ за него цѣну дешевле. Должно эшомъ горохъ заблаговременно сбывать, и на сѣмена промышлять лучшаго. — Въ поездку мою 1783 года въ средній Маркб-Брандбургскій въ одномъ мѣстѣ, въ которомъ вывозящъ на продажу прекрасной бѣлой внутри желтой горохъ, видѣлъ я, что около цвѣтущаго гороху ходящъ люди, которые гороховины съ красными цвѣтками выдергиваютъ, дабы продажной горохъ выходилъ безъ пороку. Однакожъ шаковое выдергиваніе красноцвѣтнаго гороху должно производить съ оспорожностію, чтобы не попопшашъ плесей другаго гороху, и шѣмъ не произвешъ больше вреда, чѣмъ пользы. Когда гороховинъ съ синекраснымъ цвѣтомъ будетъ много, то почти миновать не лзя, чтобъ не подавить при семъ многія плести.

Сочинитель *Der Berlinischen Beiträge*, Band I. С. 674 замѣчаетъ, что пашня, хотя бы подъ ношеніе гороху была очень удобна, но прежде не обсѣвана была симъ плодомъ, въ первой годъ принесетъ только плохой, или по крайней мѣрѣ умѣрен-ной урожай онаго; почему слѣдуетъ пашню подъ горохъ не часто перемѣнять, но опре-

опредѣливъ единожды, сколько можно оную подѣ нимъ удерживать. — Понеже гороховищи у меня большею частію смѣняющіяся каждые 3 года, или по крайней мѣрѣ въ 6 лѣтъ, то замѣнилъ я, что на нѣкошорыхъ десятинахъ горохъ всегда лучше урожаешся, нежели на другихъ. Между оными тѣ, кои подѣ черноземомъ имѣютъ вязкую глину, и къ ношенію пшеницы и ячменя у насъ лучше другихъ, всегда приносятъ урожай гороху худшій, не взирая на то, что въ каждый шрешій годъ бывають подѣ горохомъ. Напрошивъ здѣсь другія десятины, кои столькожъ часто бывають подѣ горохомъ, всегда производятъ обильный онаго урожай. Чпожъ уиътверждають въ иныхъ мѣстахъ, будто бы онъ гороху пашня обложбешъ; можешъ бышь то у нихъ, у насъ же напрошивъ. Другіе говорятъ, что хотя горохъ и удастся, но родившаяся послѣ него на томъ же мѣстѣ рожь оннудъ не такова бываетъ, какъ на другихъ десятинахъ; и сего у насъ не примѣнно. У насъ посѣянная по гороховищу рожь полегаешъ, и естли на ономъ будетъ сѣяна пшеница, приууждено бываетъ оную прежде другихъ приспригашъ, т. е. верьхи ея скашивашъ. Лишь тогда у насъ родится худая рожь по гороховищу, когда наша травянистая земля по снятій гороху долго пролежитъ не вспахана взметомъ: шаковыя лишь пашни приносятъ у насъ

ху-

худой урожай. Если же вспашемъ оныя по снятій гороху, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и по крайней мѣрѣ не больше 8 дней спустивъ; тогда озимой хлѣбъ по гороховищу всегда бываетъ удаченъ. Можешь быть переспануть жаловаться и тѣ, у которыхъ послѣ гороху хлѣбъ плохъ урожаешь, когда гороховища скорѣе стануть вспахивать. Можешь быть во многихъ мѣстахъ мѣшаютъ тому столько вредныя права скопопашва Хозяевамъ сихъ пашенъ оныя скоро вспахивать; потому что для выправливанія овцами оставляющъ гороховища недѣли на 4 и на шесть. Тогда вырастающъ на нихъ всякія травы усильно, вынимающъ изъ пашни соки, и приводящъ въ заобложеніе. Пропадаетъ же тогда произходящій отъ гороховинъ навозъ, и вытягивается воздухомъ и погодами; ибо съ гороховинъ засыхающіе снизу листья, свернувшись въ трубочку, спадывають на пашню, что очень примѣтно по спасканіи гороховинъ въ копны. И если гороховище для пашбы останетсѣ нѣсколько недѣль не вспахано, трубочки сіи либо разноситъ вѣтромъ, или солнце и воздухъ вытягивающъ изъ нихъ соленныя частицы, соснавлиющія главную силу ихъ, такъ что пашнѣ ничего оныхъ не достанетсѣ. Въ нашихъ мѣстахъ и въ прешій день по свезеніи гороху гороховища вспахивающъ. Крестьяне здѣшніе, не очень поспигая физи-

физическую причину, обыкновенно говоряшѣ, что гороховины съ корнями чѣмъ больше простояшѣ не перепажаны, тѣмъ больше пашню изтощаютъ. Но что въ другихъ мѣстахъ утверждаютъ, что горошекъ лучше пашню поправляетъ, нежели настоящій горохъ, у насъ сего не примѣчено. Когда горошекъ ошмѣнно уродится, тогда только въ хорошемъ дѣйствиіи на пашнѣ гороху уподобляется, но никогда онаго не превосходитъ. Изъ таковыхъ противорѣчій можно оныя вывести, что учили домоводства разному мѣстѣ различаютъ, и по примѣчанію въ одной собственной округѣ всеобщихъ правилъ не предписываютъ.

На поспѣваніе и прибираніе гороху надлежитъ въ особливости обращать вниманіе, дабы такъ сказать не прешерпѣть кораблекрушенія у самаго пристанища. Когда горохъ подкоситъ рано, вымолоченныя зерна его будутъ зелены, морщиваты, въ продажѣ не шоварны и дешевы, а сверхъ того и умолотъ выйдетъ малъ. Если же дашь гороху только нѣскольکو поспѣть, и придетъ нечаянной дождь, а потомъ припечетъ солнце, тогда стручья разколются и горохъ на рядахъ вытечетъ, при чемъ можетъ зерна остаться на полѣ въ 8 и 12 разъ противъ посѣву. Когдажъ во время лежанія гороху на рядахъ пойдетъ продолжительной дождь, солома его почернѣетъ, и въ кормъ скотинѣ

шинѢ будетѢ не способна; даже и зерна проросшѢ въ спручьяхѢ: или, когда гороху дашь на корнѢ въ спручьяхѢ засохнушь, большая часть листовѢ съ плетей поопломаешся, а шаковымѢ образомѢ лучшій скопскій кормѢ пропадетѢ, какѢ-то производитѢ и при кошеніи дятловины на сѣно. Ни одинѢ экономическій писатель не разпроспраняетѢ о сей вещи, какѢ *ЭкхартѢ*; слова его достойны, чтобѢ я внесѢ оныя сюда.

ВѢ разсужденіи сѣву гороха въ большихѢ помѣстьяхѢ, по причинѢ высѣванія другихѢ хлѣбовѢ въ тоже время, не можно положить меньше 3 или 4 недѣль на окончаніе онаго; и шакѢ, когда сїи 27 или 28 дней раздѣлитѢ на три, выдетѢ 9 дней для ранняго сѣву, 9 дней для средняго, и шолькожѢ для поздняго, слѣдственно ранній сѣвѢ ошѢ поздняго различествуетѢ двумя недѣлями; навѣрное два сѣва изѢ нихѢ будутѢ удачны и безѢ сомнѣнія одинѢ другаго созрѣетѢ прежде. КакѢ скоро плети полягутѢ къ землѢ, шакже спручья начнутѢ желшѣть и бѣлѣть, пришомѢ будутѢ полны и содержатѢ крупныя зерна, и начнутѢ морщиться; шогда время шаковую десяшину подкоситѢ, хопя бы плети и лисы не всѢ поблекли, а ешѢ между ими зеленыя; ибо малаго числа дожидатѢся не должно. Ештли кошеніе будетѢ произведено въ добрую, сухую и шеплую погоду, можно
пола-

полагать, что эшотъ горохъ въ два дни
совсѣмъ подсохнетъ. На эшотъ конецъ
должно рано по утру, пока еще солнцемъ
не обогрѣетъ, выслать на подкошенное
гороховище довольное число гребцовъ,
кои бы какъ возможно скорѣе горохъ сгре-
бли, вязали въ проховыя связки, не ме-
дливъ клали на возы, свозили въ гумно,
и клали въ сараяхъ на верхнихъ рѣше-
шинахъ, гдѣ бы воздухомъ прохватывать
могло. Какъ въ высокихъ сараяхъ на
верхнихъ перекладинахъ подъ кровлю
дѣлается рѣшешина изъ толстыхъ жер-
дей, для храненія на оной разнаго снопо-
ваго хлѣба; можно удобно на эту рѣше-
шину класть горохъ по свержъ, а подъ
нимъ овесъ, горошекъ или сочевицу. Та-
ковымъ образомъ въ разсужденіи гороху
можно быть безъ всякой заботы, и при
молотьбѣ онаго окажется, что ни мала-
го ущерба въ немъ не послѣдовало; зерна
будутъ желпы въ вареніи, а сырыя бѣлы
и лосковапы. Таковымъ образомъ продол-
жается свозка, пока весь горохъ до до-
жда въ сараи прибранъ будетъ. Кто же
въ жашвенное время дастъ гороху слиш-
комъ переспѣть, и ославивъ оной до
пѣхъ поръ на корнѣ, пока вся трава его
пожелтѣетъ и поблекнетъ, увидишь
потомъ на другой день по скошеніи, что
большая часть спручьевъ отъ жару лоп-
нетъ и горохъ выскочетъ, и что эшотъ
горохъ по вымолотѣ будетъ красноватъ,
или

или мяснаго цвѣту, и не хорошѣ въ вареньѣ. Дабы рѣшишь всеобщій понынѣ еще продолжающійся спорѣ о мяткѣ развариваніи гороху, и показашѣ, ошѣ чего производишѣ, что горохѣ въ нѣкоторомѣ мѣстѣ хорошо разваривается, а въ иной годѣ нѣшѣ; возьми для сего мѣстечко гороху, ошмѣнно хорошо распущаго, и раздѣли оное на двѣ часши. Какѣ скоро сшебѣ соломенной на ладонѣ ошѣ земли пожелшѣетѣ и завянетѣ, показываешѣ шо ясно, что впрочемѣ прямо сшоявшая гороховина должна повалишѣся на земаю, и за недоспашкомѣ пишательнаго въ землѣ соку сшояшѣ больше не можешѣ, слѣдственио корень ея замерѣ, а плодѣ поспѣлѣ, почему и нѣшѣ нужды держашѣ его долѣе на корнѣ. Оказываешѣ же приномѣ видѣ спручѣевѣ бѣловашѣ и желшовашозеленѣ, горошины въ нихѣ полны и швердовашы. Хотя и будущѣ между онымѣ совсѣмѣ зеленыя гороховины, ясный шо знакѣ, что зеленоспѣ сѣя производишѣ единственио ошѣ находящейся въ толсныхѣ ихѣ сшволахѣ (плешяхѣ) водяносши; на это не взирая, должно горохѣ эшотѣ поспѣшно скосишѣ, въ шреншй день свезшѣ въ сарай, особливо скласшѣ, особенно обмолотишѣ, и сего гороху на опышѣ сваришѣ, окажется, что оной разваришѣся, какѣ кисель, и будетѣ желшѣ, какѣ воскѣ. Другой часши гороху дай простояшѣ на корнѣ 8 дней лишнихѣ,

Часть III. Отдѣл. 2. Б пока

пока вся солома пожелтѣетъ, а спручья совѣмъ поблекнутъ и зашвердѣютъ, потомъ скосить, дать дней 6 или 8, какъ-то и въ обыкновеніи, лежаши на рядахъ, смокнуть отъ дождя, послѣ свезти, обмолотить и сварить на опытъ; оной опіюдъ не разварится. Сколькожъ его пропадетъ на полъ? Но чтобъ еще ближе извѣдать, набери совѣмъ зеленого гороху изъ его мягкихъ спручьевъ, вари оной, и замѣчай, какъ мягко оной разкипитъ, и каковъ опмѣнно будетъ вкусенъ. Возьми напропиво гороху на корнѣ поблекшаго или только пожелтѣвшаго, вари оной; усмотришь, что оной трудно разваривается, и далеко не такъ вкусенъ. И такъ свойство земли или году, ни мало не содѣйствуетъ къ сему различію, но зависить единственно отъ Хозяина, которому надлежитъ знать свойство всѣхъ растѣній, и пошому въ надлежащее время учреждать жатву оныхъ. Вся причина неразвариваемости гороху состоитъ въ великомъ онаго зашвердѣніи, которое уменьшается раннею жатвою. По сему, когда плечи снизу совѣмъ пожелтѣютъ и завянутъ, также большая часть спручьевъ будутъ бѣловаты, желты и зеленожелтоваты, должно весь горохъ косить, и какъ скоро оной нѣсколько засохнетъ, что можетъ быть въ шестій или четвертый день по скошеніи, свозить и склать на пошолокъ сарая. Но какъ на доброй рыхлой землѣ горохъ растетъ лучше,

ше, нежели на другой, также и поздній сѣвъ нерѣдко удачливъ бываетъ; но и въ этомъ случаѣ нужно часть лучшаго гороху и крупнаго зерномъ, у котораго спручья длинны и полнозернисты, опкладывать на сѣмена, отъ чего зависить будущая выгода Хозяина. —

Примѣчаніе.

а) Должно Экхаршту ошдать справедливость въ утверждаемомъ имъ, что на корнѣ пересохшій горохъ трудно разваривается, хотябъ и на самой лучшей землѣ родился; однако есть пашни, какъ вышеупомянуто, на которыхъ и въ надлежащую пору скошенный горохъ не доспѣваетъ. Для сего должно лучшія пашни въ своемъ мѣстѣ для гороху узнавать, и на оныхъ по вышесказаннымъ признакамъ горохъ не совсѣмъ доспѣлой скашивать.

б) Когда найдетъ туча съ бурей, можетъ оною еще на рядахъ лежащій не совсѣмъ досохшій горохъ подхватить на воздухъ и унести за нѣсколько верстъ, оставивъ Хозяину пустое мѣсто. Къ отвлращенію такового случая, косьбу гороха производятъ такъ, чѣмъ при каждомъ махѣ оставалось по нѣсколько гороховинъ неподкошенныхъ. Сіи неподкошенныя гороховины съ подрѣзанными перепушывающся и препятснвуютъ схватить его съ рядовъ вѣтру,

какъ-то многократно случается, а особливо на мѣстахъ возвышенныхъ. Хоша это работу нѣсколько задерживаетъ во время гребли и вязки, ибо нескошенныя гороховины должно припомъ выдерживать, но безопасность отъ случающихся бурь, это отъ излишекъ труда въ собираніи гороху замѣняетъ.

в) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, или также въ мочливые годы, вырастаетъ много разной травы между гороху, отъ чего оной и скошенной не скоро засыхаетъ. Къ ускоренію засыханія должно горохъ на рядахъ почасту грабельнымъ концомъ разворачивать. Еслили производится это по ушу, и ряды не шлосы, или травы между оными тонкія, то, въ случаѣ солнечнаго жару, можно будетъ уже надъ вечеръ горохъ вязать, ибо отъ переворачиванія просыхаетъ онъ съ обѣихъ сторонъ.

г) Въ нѣкоторыхъ сѣнахъ есть обыкновеніе, горохъ не связывать вязанками, но вдоль по рядамъ сгребать въ кучи, которыя копнами называются, и такъ навозы накладывающія по мѣрѣ того, какъ шѣлега вдоль ряду ѣдетъ. Шипящій шакowymъ дѣйствіемъ убавитъ работы и траты времени, потребныхъ для связыванія, но въ этомъ заблуждающій, для того что накладываніе копенъ больше времени занимаетъ, нежели связокъ; складываніе же въ сараѣ еще боль-

больше, потому что бравъ охабками съ возу, должно будетъ силою прерывать гороховины. Въ то время, какъ работникъ вилами сниметъ 4 подъема, можетъ онъ въ одной связкѣ столькожъ или еще болѣе прибрать. Сверхъ того и въ разсужденіи свозки можно сдѣлать лучшее распоряженіе. Свѣдомо, сколько счепомъ связокъ, и сколько потребно возовъ и времени къ накладыванію и свозкѣ. Не можно же шаковыхъ копенъ и съ мѣста поднимать чисто, какъ связокъ, кои порядочно сгребены, повязаны и подобіемъ крестцовъ складены. Еслили упадетъ хотя небольшой дождь на копны, не можно оныхъ шакъ скоро просушить, какъ связки, изъ коихъ только верхнія обмокаютъ, и вскорѣ отъ вѣтру и солнца просушиваются. Когда же ударитъ градъ по копнамъ, онымъ горохъ вымолошится; напрошивъ связкамъ, подобіемъ крестцовъ складенымъ, вреда бываетъ мало, и только съ той наружной стороны, откуда градъ придетъ; даже и въ случаѣ проливнаго дождя связки бываютъ безопасны. Хотя спручя и разколются, но зерна вышекшія большею частью остаются въ связкахъ, кои по окончаніи дождя нужно только разкласать порозь, и шѣмъ просушить; въ гороховинахъ же, въ кучи сгребенныхъ, выпавшія зерна опчаша при просушиваніи, частью же при

накладываніи на возы, оспающся на землѣ и пропадаютъ. Свясла гороховыхъ сноповъ должно вязать не туго, и не закручивая косылемъ; употребляютъ къ тому сипарыя соломенные веревки, коими связываютъ вымолоченную солому, и кои собираетъ тотъ работникъ, кошорой рѣжетъ солому въ рѣзку на кормъ скопинѣ.

- д) Выше сказано уже, что гороховая солома составляетъ важную снатью въ прокормленіи скота. Горохи всѣ, со всѣми родами горошку и сочевицы, надлежащъ къ родамъ дяшловины; хотя гороховая солома и не приноситъ такого питанія, какъ засушенная въ сѣно красная дяшловина, однакожъ естли она хорошо засушена будетъ и не повреждена мучняною росой, можетъ въ корму занимать мѣсто послѣ дяшловины и обыкновеннаго добраго сѣна. Въ кормленіи рогатаго скота закладываютъ часно въ ясельныя рѣшетки коровамъ и воламъ; но рогатой скотъ можетъ легко выломать себѣ плетми гороховинъ зубы, вырывая оныя изъ рѣшетки, а особливо естли онѣ въ влажную погоду опволгнувъ, сдѣлаются тягучи, подобно ремнямъ. Лучше гороховую солому употребляютъ въ кормъ коровамъ и воламъ рѣзкою одну, или смѣшивая съ рѣзкою другихъ соломъ; такъ же и лошадямъ можно давать гороховую

ховую соломенную рѣзку, которую бѣдѣ онѣ охотиѣ рѣзки изъ другой соломы. Овцамъ закладывають гороховую солому просно нерѣзанную.

- е) Когда гороху уродиѣся изобильно, можно онымъ, такъ какъ сказано будѣтъ во второй половинѣ сего сочиненія подъ заглавѣмъ *Хозяйка*, въ продовольствіи и опкармливаніи домовой скопины произвести великую разстановку. Въ Берлинскомъ полуосминникѣ гороху бываетъ въ сомѣ 2 пуда съ четвертью, а въ той же мѣрѣ ячменю только 60 фунтовъ; видимо изъ того, что двумя четвериками гороху можно шожъ произвести, что шремя ячменю. Въ которомъ году четверикъ ячменю стоить 20 копѣекъ, а гороху 25 копѣекъ; то замѣна ячменю горохомъ приносиѣтъ въ кормленіи выгоды 10 копѣекъ. Въ случаѣ великаго урожая можно горохъ не шокмо вышеписаннымъ образомъ употребляѣтъ, но и въ прокъ на многіе годы храниѣтъ въ запасъ для корму скопины. Изъ обыкновенныхъ нашихъ хлѣбныхъ зеренъ никакія не способны столько къ прочному лежанію, какъ стручковыхъ плодовъ, просо и гречиха. Онѣ избавлены отъ поѣданія хлѣбныхъ червей, и нужно ихъ лишь всыпашъ въ бочки или лари, чтобы продержатъ до возвышенія цѣны, или недосатку въ другомъ хлѣбѣ; въ бочкахъ и ларяхъ меньше займутъ онѣ мѣ-

ста въ амбарѣ, и могутъ лежать безъ переворачиванія до шѣхъ поръ, какъ надобяшся. Есѣли же гороху и не упошребляшь въ кормъ скопинѣ, можетъ оной служить въ пищу людямъ, и шѣмъ замѣнишь недоспашокъ во ржи. Гороховой муки шрешъ прошивъ двухъ часней ржаной въ печеніи производишь самой прекрасной, здоровой и пышной хлѣбъ. Хотя же гороху и не молошь, но въ сбереженіе лопашокъ за помолъ на мѣльницѣ, а особливо въ дорогую пору, можно оной варить цѣлкомъ въ большихъ кошлахъ, и какъ разварится, прошереть, а потомъ при мѣшаніи хлѣбовъ со ржаной мукою прилѣжно перемѣшавъ и перешереть, чѣобъ нигдѣ кускомъ гороху не оспалось, это въ печеніи произведешъ тоже дѣйствіе, что и мѣшаніе гороховой муки. Мѣшаніе еще удобнѣе произвести, когда прошершую гороховую гущу разболтать жидко съ водою. Но хлѣбы выходятъ лучше, есѣли гущи на водѣ не разбалтывать, а упошребишь шрудъ въ вымѣшиваніи шѣста. Въ случаѣ нужды можно въ эту смѣсь подбавлять и часъ яшной муки. Однакожъ этой муки (яшной) не должно перекладывать, дабы хлѣбъ не крошился.

АА. *Сѣрой полсвой горохъ.*

Сѣрой горохъ, называется инако Прусскимъ. Сѣютъ оной въ Польшѣ и Пруссіи; онъ

онѣ нѣсколько крупнѣе обыкновеннаго бѣлаго полевого гороху. Сырой бываетъ онѣ вкуснѣе, и вареной подающъ его на столѣ не проширая, но только разваривъ, чтобъ ѣсть оной ложками, какъ обыкновенной разварной горохъ. Къ намъ привозящъ эшотъ горохъ чрезъ Штешинъ, и во многихъ домахъ средственнаго сословія охотно оной въ столѣ употребляютъ.

Когда мы эшотъ горохъ, имѣющій синіе цвѣты, сѣмъ здѣсь близъ нашего обыкновеннаго гороху, выходивъ оной крупнѣе лискомъ и правою толще и длиннѣе, также цвѣтъ имѣетъ полнѣе. Сколько замѣтилъ я, меньше оной бываетъ подверженъ дѣйствію мучняной росы, нежели обыкновенной полевой горохъ. Когда я эшотъ горохъ въ первый разъ испытывалъ сѣять, и высѣялъ въ концѣ Марта, оный не удался. Въ нынѣшнемъ году посѣялъ я онаго въ концѣ Апрѣля, и еще въ первую недѣлю Мая. Послѣдній уродился лучше, но созрѣлъ позднѣе. Былъ оной близъ крупнаго ячменю, на томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ близъ мѣжника выпрѣлъ. Множайшіе опыты покажутъ у насъ, какая пашня и какое время сѣву для сего гороху лучше. Я очень склоненъ думать, что эшотъ горохъ, какъ кажется у насъ въ бѣлой перерождающейся, имѣетъ сѣрой цвѣтъ кожи своей отъ свойства земли своей опичизны, въ глубинѣ копорой находится желѣзистая земля; ибо на выпрѣвшихъ у меня

сѣменахъ сего гороху кожица вышла свѣшлѣе, а сѣянной прямо изъ опчины своей полученной горохъ, имѣлъ оную несравненно шемѣе. Этомъ горохъ еще зеленой въ спручяхъ, имѣетъ вкусъ несравненно пріятнѣе нашего полевого гороху, и не нужно варя оной съ мясомъ или рыбою въ соусахъ, подслащивать сахаромъ, какъ-то во многихъ домахъ производятъ съ полевымъ горохомъ. Удивился я, не найдя сего гороху между Хозяйственными испытаніями Г. фонъ Бренкенгофа, когда ему получить оной было легко, ибо онъ самъ видалъ его на поляхъ въ Польшѣ и Пруссіи; можетъ быть по близкому сосѣдству, показался оной ему довольно обыкновеннымъ и несостоящимъ испытанія. Напротивъ нахожу, что ввелъ онъ родъ гороху, которой по описаннымъ признакамъ очень сходствуешь къ гороху Прусскому, и названъ Куявскимъ безъ различія, сѣрой ли онъ, или бѣлой. Если это сѣрой горохъ, то родился оной не въ одной Куявіи, но во всѣхъ мѣстахъ Польши, равно и въ Пруссіи.

ББ. *Аглинской горохъ.*

Объ этомъ горохѣ въ описаніи жизни *Бренкенгофа* на стр. 159 писано сѣе: Онъ сѣялъ множество Аглинскаго гороху, котораго отличность весьма выхваляетъ. Урожай онаго былъ столько изобилень, что никогда не приходилъ оной меньше самъ-двѣнадцатъ, и нашелъ солому его

весь-

весьма способну въ кормѣ овцамъ. Онъ завелъ у себя въ деревняхъ другой родъ гороху, кошорой нашелъ въ Куявѣи, коего снручья и зерна уподоблялись сахарному гороху, кошорой очень расшешъ въ солому, опмѣнно хорошаго вкусу, и снольшко плодовиѣ, что самъ-пятнадцатъ приходитъ. Но солома его въ кормѣ не годишся, пошому что толста и жестка. Должно сѣять его поздно въ Маѣ. Въ примѣчаніи, поставленномъ шамъ же внизу, написано объ Аглинскомъ горохѣ еще сіе: Оной не слишкомъ крупенъ, но очень желтъ, и вкусу весьма пріятнаго. Кожицы на немъ почти головою нѣшъ, и для того легко разваривается. Солома его не очень длинна, но шѣмъ нѣжнѣе. Сѣять оной должно рано, чтобы заблаговременно поспѣлъ. —

Эшопъ Аглинской горохъ предъ нашимъ обыкновеннымъ не заслуживаетъ еще преимущества пошому, что самъ-12 приходитъ; ибо прежде сказано, что на добрыхъ земляхъ и въ хорошіе годы, и обыкновенной горохъ урожается самъ-двѣнадцатъ. Но въ томъ его преимущество, что нѣшъ на немъ лузги или кожицы, и что онъ очень желтъ. Во многихъ домахъ средственнаго состоянія, даже въ городахъ, готовятъ его разварной съ вешчиною и копчеными свинными боковинами. Однако эшо кушанье совсѣмъ не годишся, когда употреблять горохъ толстокожей,

жей, и лужга будешъ плавашь сверху супа, или на горошинахъ сидѣшь. Въ этомъ случаѣ вкусъ супа будешъ водянь, отъ того что шолспокжій горохъ не разваривается. Желшина же разварившагося гороху бываешъ сполькожъ пріятна, какъ желшой цвѣтъ Майскаго коровьяго масла, и въ обоихъ составляетъ признакъ лучшаго вкуса. Въ разсужденіи Куявскаго гороху, нельзя сказать, чтобъ солома его въ кормъ скошинъ совсѣмъ не годилась. Я упомянулъ уже прежде, что солома гороховая въ мѣлкой рѣзкѣ лучше въ корму, нежели не крошенная. Конечно въ послѣднемъ случаѣ окажется, что скопина охотнѣе будешъ ѣсть гороховую солому тонкобылую предъ шолспую; но въ рѣзкѣ ѣсть она охотно и шолспую. Въ разныхъ мѣстахъ видимо, что несравненно шолспѣйшія хмѣлевья плети коровы въ рѣзкѣ ѣдятъ охотно. Сверхъ того вдвое крупнѣйшіе листы Прусскаго гороху, съ копорымъ шочно сходенъ и Куявской, солону учиняютъ уже пріятнѣе. Когда сію солону закладываешь овцамъ за рѣшетки, ощипывають онѣ одни листки, спебли же остающія къ подстилкѣ для умноженія навозу.

Ж. Горошекъ.

Горошекъ по Нѣмецки *Wicken*, называется инако *черный горошекъ* (и есть не иное что, какъ *дикий горохъ*), и требуетъ съ горохомъ одинакаго земледѣлія и па-

пашни равнаго свойства. Однимъ только ошличается онъ отъ гороху, что морозы неудобно выдерживаетъ; по чему должно сѣять оный позднѣе въ Апрѣлѣ и Маѣ. Если же посѣять его на низменной еще влажной пашнѣ, пока она еще теплаго времени не просохнетъ, всходъ горошку произойдетъ вялъ и листки его не будутъ зелены, не оправятся, совсѣмъ пропадутъ, и ничего не выдетъ на мѣстѣ томъ, кромѣ негодныхъ травъ.

Сколько нужно въ разсужденіи гороху наблюдать, чтобъ оной не переспѣла, тѣмъ больше нужно оное въ разсужденіи горошку; ибо въ этомъ состояніи лишается онъ почти всѣхъ листовъ своихъ до скошенія, а остальныхъ во время уборанія. Листы же горошку еще нужнѣе въ кормъ скошинѣ, нежели самыя зерна; почему многихъ Хозяевъ распоряженіе хорошо въ томъ, что они горошекъ въ два раза подкашиваютъ. Въ первый разъ подкашиваютъ, когда спручья на горошкѣ бываютъ совсѣмъ плоски безъ зеренъ, или въ шакъ называемыхъ лонасточкахъ, дабы получить сочнѣйшую солому съ листомъ, и когда она равняется въ доброшѣ дятловинному сѣну. Во второй разъ косятъ, когда зерна въ спручьяхъ поспѣютъ, для употребленія оныхъ впредъ къ посѣву и въ кормъ домовою скошинѣ. Когда горошекъ, скошенной на рядахъ, просохнетъ, не должно онаго прибирать при жаркомъ сол-

солнечномъ сїянїи, ибо по весьма ломкимъ его плешамъ, оныя будутъ крошиться, при чѣмъ много спручье вѣ разпропадетъ. Равномѣрно лучше горошекъ не вѣ копны сгребать, но вязать подобїемъ сноповъ, и вѣ крестцы складывать.

Естьли куръ зимою кормить горошкомъ, кошорой для нихъ несравненно прїятнѣе самаго гороху, очень онѣ отъ него жирѣютъ; но не должно посыпать имъ онаго слишкомъ. Лучше перемѣнять оной со дня на день съ другимъ зерномъ.

Естьли горошекъ на полѣ не уродится, будетъ низокъ ростомъ и рѣдокъ, а между его выросшущъ травы, шакковая пашня вѣ паровомъ клину подъ слѣдующій сѣвъ озимаго хлѣба не слишкомъ годится. Чшо же прежде сего совѣшывано объ неукоснительномъ паханїи гороховищъ, тоже надлежитъ наблюдать и вѣ разсужденїи пашни, бывшей подъ горошкомъ, какъ скоро оной снятъ будетъ. Естьли по снятїи онаго дать правамъ пробишься и урости, изъ будущихъ озимей мало выдетъ пущнаго.

Вѣ мѣстахъ, гдѣ великіе конскїе заводы, очень прилежатъ къ сѣву горошка, кошорой немолоченной дающъ лошадямъ вѣ рѣзкѣ. Лѣнныя слуги, не любящіе шрудишься надъ рѣзкою, закладываяшъ горошковую солому онымъ не рѣзавъ, но шакковой поспупокъ не похваленъ, пошому чшо много зерна высыпается и пропадетъ вѣ

въ навозѣ. Когда время начнетъ становиться теплѣе, лошади не охотно ѣдятъ горошекъ; бываетъ оной имъ тогда очень прошивенъ. Онѣ сбиваютъ тогда эшотъ кормъ лишь подъ ноги, почему и должно оной задавать имъ только въ холодное время году.

Зерна горошковые мѣлютъ и употребляютъ въ пересыпку коровамъ и воламъ; мука сія для нихъ столькожъ полезна, какъ гороховая. Еслии эшою одною пересыпкою кормить дойныхъ коровъ, масло отъ того получишь не очень пріятной вкусъ. Когда же эшою мукою опкармливать свиней и воловъ, шожъ бываетъ съ ихъ мясомъ. Почему за нѣскольکو недѣль предъ убоемъ надлежитъ давать имъ кормъ не столько упучняющей и не столько горькой. Чшожъ задача моркови вмѣстѣ съ горошкомъ, опкармливаемыхъ воловъ въ короткое время будшо бы упучняетъ, есль неосновательная сказка, перешедшая къ намъ изъ сипаринныхъ экономическихъ книгъ. Не можно отъ горошку ожидать излишняго дѣйствія, какъ отъ гороху, бобовъ, ячменю и шому подоб. кои по внутреннему содержанію своему сходны, или уравнены будуть въ задачу въсомъ. Истинна лишь шо, что воли охотнѣе ѣдятъ пересыпку горошковой муки съ морковью, которой сладость убавляетъ горьковатость горошку. Но давая цѣлкомъ горошковые зерна рогатой скотинѣ

шинѢ не совѣшую, пошому что вѢ желудкѢ ея много зеренѢ оспаеся несваренныхѢ и выходитѢ цѢлкомѢ, слѣдшвенно безѢ пользы.

НапослѣдокѢ вѢ голодное время можно горошковую муку мѣшашѢ со ржаною кѢ печенію хлѣбовѢ, какѢ - то случилось вѢ 1772 году; однако примѣчено, что шаковой хлѣбѢ приключаетѢ людямѢ безпреспанную изгагу, и очень зловонное дыханіе изѢ рта, почему и должно щипашѢ горошковой хлѣбѢ за нездоровую человѣку нищу. Еспли во время дороговизны горошку будешѢ изобильно, лучше оной употребитѢ вѢ кормѢ домовымѢ живошнымѢ, и вмѣсто того обратишѢ вѢ пользу людей другія здоровѣйшія зерна, какѢ - то горохѢ, ячмень, овесѢ и шому подобныя, кои впрочемѢ скошамѢ даются.

Еще должно ХозяевамѢ, сѣющимѢ горошекѢ, посовѣтовашѢ, чтобѢ онаго вѢ запасѢ по нѣскольку чешвершей оспавляли, подобно сѣмянамѢ подсобнаго ячменю. Когда подсобный сѣвѢ ячменя нужно производишѢ вѢ лѣша, подверженныя засухѢ, такѢ шочно подсобный сѣвѢ горошку вѢ лѣша мочливый. КакѢ вѢ 1772 году ошѢ извѣстной излишней мочливости былѢ неурожай, и крупной ячмень пожелѣлѢ у меня на всходахѢ, и ни уклочитѢся, ни росши силы не имѣлѢ, то приказалѢ я все шо мѣсто, гдѢ виденѢ былѢ слабый ячмень вспашѢ, и по свѣжимѢ бороздамѢ раз-

разсѣявъ горошекъ, заборонить. Не можно описатьъ, какъ уродился э́топъ позднего сѣву горошекъ; оной отъ безпресшанныхъ теплыхъ дождей, превзошелъ ростомъ, толщиною стеблей и крупностію лисповъ всѣ прочіе горошки въ полѣ, кои сѣяны были въ обыкновенное время въ Апрѣлѣ. Естли бы оной могъ проспоятъ на корнѣ долѣе, по причинѣ упошребляемаго здѣсь подъ пашву скопины за 5 и 6 недѣль до Воздвиженья яроваго жнивья, конечно и зерна въ немъ совсѣмъ бы выспѣли. Но для меня ничего не значило получение зеренъ, для того что по прежде сказанному зеленую скошенную горошекъ, когда еще имѣетъ плоскіе стручья или лопашки, въ кормъ скопинѣ уравнивается дядловинѣ; почему велѣлъ я оной скосить и засушить въ первыхъ числахъ Августа, къ упошребленію онаго въ рѣзку моимъ жеребяшкамъ зимою, кои безъ прибавки зерноваго хлѣба несказанно отъ сего раздобрѣли. Со временемъ еще съ равною удачею повторилъ я э́топъ опытъ. Однако въ сухія лѣта столько чрезмѣрно поздній сѣвъ горошку бываетъ не удаченъ, развѣ упошреблятъ подъ него самыя низменные пашни. Я забылъ еще сказать, что въ оба сїи опыта мѣшалъ я въ горошекъ третью часть овса, потому что у меня не доставало по величинѣ мѣса сѣменъ горошковыхъ.

Естьли всѣ горошки вообще сѣютъ большею частью для полученія зерна, нежели лису ихъ съ правою, и чѣмъ по вышеписанному не дашь онымъ пересѣвъ, надобно примѣчать слѣдующіе признаки, когда ихъ должно скашивать. Когда прямо вверху стоявшія плечи начнутъ прилегать, снизу и сверху зажелтѣютъ, также и совѣмъ позавянутъ, а спручки будутъ черноваты и начнутъ твердѣть, не должно больше медлить косью. Естьли улучишь въ первой степени ихъ зрѣлости, можно косить ихъ и въ дождливую погоду, а особливо естьли дѣло идетъ не объ зернахъ, а къ употребленію вмѣсто дѣловины. Естьли будутъ горошекъ въ первомъ степени зрѣлости скошенъ въ дождь, въ разсужденіи утѣчки зеренъ нѣтъ причины опасаться; для того что спручья его не такъ какъ гороховые онѣ припеченія потомъ солнцемъ прескаются. Но когда скошенной въ дождь горошекъ на рядахъ лежитъ толстымъ слоемъ, должно оный часто переворачивать, для того что листы и спручья къ землѣ лежащія, скоро загниваютъ, и могутъ составить нездоровой кормъ скотинѣ.

Зеленой горошковой кормъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при большихъ помѣстьяхъ издавна бывалъ въ обыкновеніи; состоитъ оной изъ посѣву смѣшанныхъ зеренъ какъ въ паровѣ клину, такъ и въ

въ шрешій рядъ сѣву съ начала убоженія земли, и употребляется лѣтомъ зеленой въ кормленіе на стойлахъ. Обыкновенно для сего зеленого горошковаго корму берушъ сѣмена въ слѣдующемъ размѣрѣ къ посѣву: четверикъ гороху, четверикъ горошку, четверикъ овса, и два четверика ячменю. Когда ячмень начнетъ наливанъ, горохъ и горошекъ имѣющъ тогда только лопапочки и слѣдственно спелолы и плѣши еще зеленыя; въ эпомъ сосноянтіи по немногу онаго косящъ ежедневно и возящъ домой въ кормъ скотинѣ.

Есѣли горошекъ посѣянъ будетъ въ смѣси съ ячменемъ однимъ, и оба сѣи хлѣба будутъ скошены поспѣвшіе и такъ засушены, называется это *горошковой ячмень*. Говорено будетъ объ эпомъ въ слѣдствіи подробнѣе, при описантіи всѣхъ смѣсей спручковыхъ плодовъ, высѣваемыхъ съ хлѣбными зернами.

Хотя имѣемъ мы очень многія опрордіа горошковъ, но по днесъ еще испытаніе посѣву оныхъ было пренебрегаемо, кѣмъ-то, можетъ быть, ошъ того производимъ, что въ наше время дятловина вошла въ великую честь, а зерна горошковъ, исключая бѣлаго, въ пищу человекѣмъ не служашъ. Однакожъ стоило бы шруда сполькожъ различныхъ опытовъ произвесити надъ разными родами горошковъ, сколько оныхъ по нынѣ произведено надъ другими родами хлѣбовъ, и ошчасш не безъ пользы;

ибо еще зеленью или въ незрѣлости скошенной горошекъ, для сбереженія листовъ какъ къ сырой задачѣ, такъ и засушивъ въ сѣно, хотя доброшою дятловицѣ и не уподобляется, но по тому заслуживаетъ преимущество, что дятловина въ первой годъ по посѣвѣ совершенства своего не достигаетъ, и должно ждать оной до другого года; горошекъ же чрезъ 8 и 10 недѣль по посѣвѣ совсѣмъ поспѣваетъ. Тѣмъ лишь дятловина преимуществуетъ, что длится на корнѣ нѣсколько лѣтъ; а горошекъ, еслили хотѣшь сто имѣть, надлежитъ всякой годъ сѣять, и для того въ разсужденіи воздѣлыванія земли несравненно больше трудовъ требуетъ. Напротивъ можешь онъ нѣкошорымъ пашнямъ оказывать пользу, еслили оныя опятающаюся какою нибудь сорною травой, что испребляющся оныя раннимъ и позднимъ вспахиваніемъ земли, бывшей подъ горошкомъ. Еслили бы утверждать, что дятловина составляетъ пріятнѣйшій кормъ рогатому скоту, нежели горошекъ, сказано бы то было слишкомъ; ибо когда дятловину и зеленой еще горошекъ, тогда какъ оныя цвѣтутъ, или спручя на горошкѣхъ будущъ въ лопаткахъ, класъ рядомъ ковромъ, ѣдая онъ и тотъ и другой кормъ съ равною охотою, и зелень горошковую не презираетъ. Сверхъ того есть за горошкомъ и та особливостъ, что онъ рѣже терпитъ вредъ отъ мучняной росы,

не-

нежели горохъ и дятловина, и что когда
дашь сѣменамъ его выпѣшь, могутъ оныя
лѣшъ 20 лежать безъ дальняго присмотру,
но только всыпанные въ бочку или ларь
въ запасъ, на случай недоспашка въ корму
домовой скопинѣ. Почему полезно совѣ-
щать Хозяевамъ, чтобъ они кромѣ
обыкновеннаго извѣстнаго нашего чернаго
горошку прочія онаго отродія со щипані-
емъ испытывали, не заслуживающъ ли нѣ-
кошорыя изъ нихъ шолкаго же или еще
множайшаго сѣву, или смѣси съ онымъ;
ибо оказывается, что погода нѣкошорыхъ
годоу бываетъ благосклоннѣе нѣкошорымъ
хлѣбамъ, нежели дуугимъ, по каковой при-
чинѣ нѣкіе Хозяева шолько придерживающі-
ся смѣси хлѣбной въ посѣвъ, дабы, когда
одинъ родъ хлѣба будетъ не удаченъ, то
другой уродится, а чрезъ это не даромъ
пропадутъ труды земледѣлія. Я намѣренъ
описать здѣсь различные роды горошковъ,
такъ какъ находятся оныя по *Линнееву*
порядку въ новомъ зрѣлищѣ Природы, и
коснувшись шолько главнѣйшихъ отличи-
тельныхъ знаковъ между оными, на шомъ
концѣ, шипобъ желающимъ испытать нѣ-
кошорыя изъ нихъ не были не знакомы,
или не подверглись бы ошибкѣ въ перемѣ-
нѣ названій, какъ то случалось съ други-
ми незнакомыми отродіями хлѣбовъ, и
по днесъ еще случается, и чему было до-
вольно примѣровъ.

Ривинусъ раздѣляетъ горошекъ на два рода, и при томъ по различному положенію ихъ цвѣтшвъ. Онъ называетъ *Vicia* томъ горошекъ, у котораго цвѣты къ листовому углу сидятъ по одиначкѣ, или и въ множайшемъ числѣ на одномъ короткомъ стебелькѣ; томъ же, котораго цвѣты разположены продолговатымъ колоскомъ, составляя у него другой родъ, названный *Cracca*. Линней удержалъ этотъ порядокъ, и въ первомъ пославилъ слѣдующія ошродія.

АА.

Горошекъ съ продолговатыми цвѣточными стебельками, или колоскомъ расположенными цвѣтами.

1) Крупной горохоподобной горошекъ съ маленькими подлистками, кои отъ задняго плотно прилегающаго листка прикрываются. Крупной широколистной и гладкой лѣсной горошекъ съ блѣдножелтыми цвѣтами, *Vicia pififormis*, Linn. *Cracca* flore ochroleuco, Rivin. Растетъ этотъ горошекъ въ Венгріи, Швейцаріи и въ разныхъ мѣстахъ Нѣмецкой земли, имѣетъ многолѣшній корень, а видомъ уподобляется широколистному гороху, исключая цвѣтшвъ, которые меньше и желты. Стебель прямой не рѣдко вырастаетъ въ человѣка вышиною, коленчатъ, бороздатъ, зеленъ, голъ, и на многія вѣтви раздѣляется. — Изъ угловъ листовыхъ выходящіе цвѣточные стебельки почти таковы же длины, какова средняя большая жила въ

ли-

листь, жолобовашы, гладки и оканчивающ-
ся цвѣточнымъ колоскомъ, кошорой спо-
ишь прямо вверхъ. Самые цвѣточки ви-
сятъ внизъ, и бывають оныхъ по 20 и
по 30 въ кучкѣ. Цвѣшокъ малъ, желто-
вашъ, съ полосками. — Спручки висятъ
внизъ, оканчивающя оспрымъ носкомъ,
малы, гладки, желшовашы, и въ каждомъ
изъ оныхъ содержишя по 4 и 5 круглыхъ,
какъ шарикъ гладкихъ, темнаго цвѣшу
съ бѣлыми полосками сѣмечекъ. —

Когда эшотъ горошекъ съ молоду и
попомъ многокрашно въ году подкашивашъ,
можно ошъ него получаь всегда ранній
кормъ; ибо корень его многолѣшный и еже-
годно произращаетъ праву.

2) Крупной лѣсной горошекъ съ за-
воротившимися продолговатыми листа-
ми и зазубристыми подлистками, *Cras-*
sa sylvatica, Riv. *Vicia dumetorum*, Linn. Оный
многолѣшный, какъ и предшедшій, выдер-
живають нашу суровую зиму, и много сход-
ствуетъ къ первому роду; но цвѣты имѣ-
ють не желтые, листки длиннѣе, и зад-
нѣе изъ оныхъ не такъ близко къ травно-
му стеблю сидящіе. Цвѣточной его коло-
сокъ состоишь изъ 4 и 8 внизъ висятыхъ
цвѣточковъ; загнутый или каскою бываю-
щій цвѣточный листокъ узокъ, сердечкомъ,
и фіолетово-пурпуровъ; а крылушки цвѣ-
точные пурпуровы съ широкими выемка-
ми. Спручья имѣють черные, широкіе, и
въ каждомъ бываетъ по шести и боль-

ше сѣмечекъ. Изрѣдка попадаются былки съ бѣлыми цвѣтами. — (Въ Россіи называютъ оной журавлиной горохъ.) —

Въ четвертой и шестой выпискѣ изъ пропологовъ собраній перваго класса Лейпцигскаго эконома. Обществу можно читать объ этомъ горохѣ слѣдующее: Оный растеніе обвиваясь около деревъ (ибо растеніе дикой самъ собою по лѣсамъ), аршинъ до 4 въ вышину, и можетъ, заключая по сему общоушельству, естьли посѣять оный къ употребленію кормною правю, ежегодно до 6 и 8 разъ быть подкашиваемъ. — Около 6 Марша (разумѣется, гдѣ снѣгъ сходитъ въ Февралѣ) опроспашъ онъ уже въ палецъ длиною. Уповательно, что соспавишъ онъ лучшую изъ кормныхъ травъ, и тѣмъ пріятнѣйшую, что растеніе она въ нашей странѣ.

3) Лѣсной горошекъ съ яйцеобразными листьями, и остро вызубренными подлистниками. Большой Нѣмецкой горной горошекъ съ бѣлыми синими клѣточками испещренными цвѣтами. *Vicia sylvatica*, Linn. Этомъ горошекъ растетъ по лѣсамъ во Франціи, Швейцаріи и Нѣмецкой землѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ, и имѣетъ многолѣпный корень. Его коленчатый и на многія вѣтви раздѣляющійся стебель растетъ вилочками отъ аршина до полупора вышиною. Цвѣточный колосокъ не рѣдко состоитъ изъ 15 цвѣтковъ. Сосудецъ цвѣточной

ной бѣлѣ съ зеленоватостію; листокѣ касочной прочерченѣ синевашиными жилочками, нѣкоторымѣ образомѣ завороченѣ прочѣ и съ вырѣзкою; листочки крыловые длинны, съ малыми выемками, и на концахѣ съ синевашиными полосочками; листочекѣ, лодочкою бывающій, разколонѣ, короче прочихѣ, бѣлѣ и на шупомѣ концѣ синѣ. Гладкій внизѣ навислый спручокѣ содержитѣ въ себѣ обыкновенно по 6 сѣмечекѣ круглыхѣ, какѣ шарикѣ.

4) *Птичій горошекѣ съ ланцетообразными, мясистыми листками и цѣльными подѣ листками. Крупной синій лѣсной горошекѣ, Cracca, Rivin. Vicia Cracca, Linn. Цвѣтешѣ въ Іюнѣ мѣсяцѣ; растешѣ многешественно у насѣ по мокрединамѣ и лугамѣ; корень имѣешѣ многолѣтній, стеблѣ прямой чешверобокой съ бороздками, выраспающій вершковѣ въ 14, и мало вѣшвей отпускающій. Цвѣточныя черешки у него кругловаты, изборожены, и держащѣ густой, односпоровній колосокѣ, состоящій болѣе, нежели изѣ 30 колосковѣ. Сосудецѣ цвѣточной полосатѣ изѣ фіолетоваго съ пурпуровымѣ; касочной листокѣ синеващѣ, и просягивающія по немѣ темныя жилочки; крылушковые листки блѣдно-синеваши, а лодочной листокѣ или корабликѣ короче прочихѣ, краски смѣшанной бѣлой и синей. Иногда бывающѣ кусты его съ бѣлыми цвѣтами. Навислые его, гладкіе, темно-желшоватыя спручья,*

содержатъ въ себѣ отъ 5 до 10 плоскихъ шарелочкою черныхъ сѣменъ. —

Эпошъ горошекъ въ нашихъ мѣстахъ многіе крестьяне любяшъ, пошому что нашли оной полезнымъ для опшнѣмыхъ отъ машерей жеребѣшъ въ задачу онымъ зимою въ кормъ рѣзкою. Когда оный попадется имъ въ яровомъ хлѣбѣ, откладываюшъ снопы, съ горошкомъ симъ смѣшеные, на рѣзку для жеребѣшъ. Чшо оной сырой вреденъ рогатшому скошу, какъ-то опчаспи сказываюшъ, за недоспашкомъ опытноспи ушверждашъ не могу. Однако я не слыхалъ, чшобъ крестьяне приносили на него жалобу, и шѣ, кои сѣюшъ оной вмѣстѣ съ кормнымъ шравами, и даюшъ зеленью или сырой лѣшомъ въ кормъ коровамъ, но овчары эпошъ горошекъ не хваляшъ; однако нѣкоторыя говоряшъ, чшо онъ лишь тогда не годишся, когда скошенъ и засушенъ будетъ не спѣлъ, но чшо очень хорошъ ягняшамъ, когда въ разсужденіи зеренъ большею часшю или совсѣмъ спѣлыхъ будетъ скошенъ и засушенъ, ибо зерна его имъ здоровы. Прилѣжные наблюдатели должны еще вещь сію рѣшишъ испытаніемъ.

5) *Восточныхъ странъ горошекъ съ продолговатыми листками, цѣльными подлистнями и мохнатыми стручьями.* *Vicia Nilfoliana*, Linn. Горошекъ эпошъ только однолѣшній (ш. е. которой должно всякой годъ сѣяшъ), и произходишъ изъ

восточныхъ странъ. Стебель травяной у него бороздчатъ. Пучковой лиснъ его состоишъ большею часью изъ 6 паръ продолговатыхъ, какъ бы наставкою оканчивающихся лисновъ, нѣсколько моховатыхъ; подлиснни у него узенькіе, ланцетообразные и безъ перехватовъ; цвѣтничной колосокъ содержишъ 5 и 6 малыхъ темно-пурпурово-красныхъ цвѣтничковъ. Навислые его стручья плоски, длинноваты, мохнаты, и содержишъ обыкновенно по 5 сѣмечекъ.

б) *Двулѣтній горошекъ съ жолобоватыми листовыми черешками и шестью парами ланцетообразныхъ гладкихъ лисновъ*; Сибирской удивительной горошекъ; *Vicia biennis*, Linn. Опчизна его Сибирь; стебель травы его вырастаетъ иногда аршинъ пяти и слишкомъ, и цвѣтешъ по посѣвѣ на другой годъ. —

Названіе его удивительной горошекъ происходитъ отъ того, что ни одинъ изъ горошковыхъ родовъ не вырастаетъ такъ высокъ, и не равняется съ нимъ во множествѣ приносимыхъ сѣменъ. Нѣкто изъ экономовъ говоритъ объ немъ въ протоколѣ Лейпциг. экон. Общества такъ: Въ Іюлѣ, когда лѣсной горошекъ, *Vicia dumet.* (№ 3) былъ только въ два локтя ростомъ, а эшотъ достигъ выше 5 локтей. Скопина бѣтъ его. Можно высѣвать его подъ зиму съ рожью, для получения

ченія въ слѣдующую весну ранняго корму, и судя по его великому росту заключающъ, что можно его чрезъ каждыя двѣ недѣли косить. Второй эконо́мъ при-
соединяетъ къ сему прибавленіемъ произведенный послѣ опытъ въ слѣдующемъ извѣстїи: Въ первый годъ можно его одинъ разъ скосить въ свѣжую задачу корму. На другой годъ выросъ онъ у меня 12 локтей вышиною (въ сравненїи Лейпцигскаго локтя къ Россійскому, каждый содержитъ около 13 вершковъ Рос. въ 12 локтяхъ будетъ больше 9 аршинъ: росъ невѣроятный, кошорому ни одинъ изъ полевыхъ плодовъ не уподобляется), и былъ скашиванъ до осьми разъ. Онъ приноситъ ужасное множество сѣмянъ. Однако въ жаркое лѣтнее время должно спручьа обирая со тщаніемъ, впрочемъ они лопаются, и зерна высекаются. На послѣдокъ лишетъ прешій эконо́мъ въ 8 выпискѣ изъ протоколовъ помянушаго общества: Около Дрездена находящъ нынѣ эконо́мъ горошекъ дикорастущій по разнымъ мѣстамъ. Оный по посѣвѣ въ другой годъ приноситъ спручьа, и обыкновенно вырастаетъ локтей въ 8 и слишкомъ. (Слѣдственно величайшій или малѣйшій ростъ его зависить отъ доброшы и воздѣланія земли, на которой онъ посѣянъ.) По сему можно его косить въ кормъ по однажды чрезъ каждыя 2 или 3 недѣли; но что не должно прогашъ сполько травы его, сколь-

сколько нужно для собранія зеренъ къ будущему сѣву.

7) Бенгальской горошекъ съ цѣльными подлистнями и вверъхъ торчащими стручьями; *Vicia Bengalensis*, Linn. Ошечество сего горошку оспрова Споихадскіе, и естъ онъ распѣнїе лѣпшее. Трава его волосиста и мохната, цвѣточный колосъ не длиннѣе его листовъ, и состоитъ обыкновенно изъ 5 цвѣтковъ самыхъ алыхъ; но только кончекъ хвостоваго цвѣточнаго пера черной. Спручья большею частью торчатъ вверъхъ. —

ББ.

Горошки, у которыхъ цвѣты сидятъ почти плотно къ углу листовому.

8) Повѣсной горошекъ съ тупыми листами, крапчатыми подлистнями и гнѣздами (по - парно) расположенными цвѣтками; Домовой горошекъ; Кормной горошекъ; *Vicia Sativa*, Linn. Это нашъ всюду извѣстный посѣвный горошекъ. Ошродіе сего горошку чаятельно самое то, которое Ривинусъ называетъ *Vicia Angustifolia*, или узколистной гладкой лѣсной горошекъ съ синевашо - красными цвѣтами и черными сѣменами, кошораго множество растетъ на возвышенныхъ травянистыхъ лугахъ, шакже въ лѣсахъ и около холмовъ, а особливо въ мокрую и шеплую погоду; нынѣ до причинъ сѣву его на

на поляхъ, завелся и во многихъ мѣстахъ между хлѣбовъ.

9) Бѣлый горошекъ съ бѣлыми сѣменами. *Vicia alba*. Г. Миллеръ и съ нимъ многіе щипаютъ эшотъ горошекъ съ бѣлыми сѣменами и другой съ черными сѣменами за два разные рода. Но Г. Д. Бемеръ въ новомъ зрѣлищѣ Природы полагаетъ, что онъ составляетъ только опрордіе чернаго горошку. Я рѣшилъ это давно уже въ Вишненбергскомъ еженедѣльникѣ 1771 года въ No 20, и доказалъ, что въ Италіи столько уважаемый *Пизелли Романи* есть не иное что, какъ бѣлый горошекъ. Плодъ эшотъ составляетъ какъ челоуѣку, такъ и скотамъ, очень пріятную пищу какъ свѣжій, такъ и засушенный. Листы на немъ совсѣмъ шире, нежели на черномъ горошкѣ, заворочены сердцеобразно, и плешь правная раздѣляется на многія ошрасли. —

Въ 8 выпискѣ изъ протоколовъ собраній, 1 класса Кур-Саксонскаго экон. Общества *Piselli Romani* ш. е. горошекъ Римской похваляется, и сказано о немъ, что польза его не столько еще всѣмъ извѣстна, сколько бы надлежало. Бѣдные люди могутъ изъ зеренъ его подмѣшивать въ печеніе хлѣбовъ, или варить вмѣсто гороху; равно какъ и солома составляетъ удобный кормъ для скотовъ. — (Объ эшой соломѣ еще мало сказано, что она составляетъ удобный кормъ

кормѣ скошамѣ. Понеже эшотѣ горошекѣ сполько вкусенѣ, какѣ самый лучшій горохѣ, шо и солома его вкуснѣе всѣхѣ прочихѣ горошковыхѣ, почему скошина бспѣ оную сушеную лучше дяшловиннаго сѣна.)

Во второй часпи Берлинскаго *Haus- haltungs- Garten- und Geschits- Kalenders* на 1754 годѣ, равномѣрно упоминается обѣ эшомѣ *Пизели*, подѣ именемѣ малаго дико распущаго горошку сѣ бѣлыми сѣменами. Тамѣ написано: сѣюшѣ его вѣ огородахѣ и на пучныхѣ пашняхѣ вѣ полѣ вмѣстѣ сѣ горохомѣ; скошину кормить какѣ свѣжею, шакѣ и сушеною его шравую опмѣнно хорошо; а сѣмена какѣ зеленыя, шакѣ и спѣлыя сухія, на лучшихѣ сполахѣ спавяшѣ и кушаюшѣ сѣ удовольствіемѣ. Одно обстоятельство учиняетѣ эшо расшѣніе еще достойнѣйшимѣ примѣчанія, что оной вѣ нѣкоторыя годы, бываетѣ между горохомѣ многочисленнѣе, чѣмѣ вѣ другіе. Какѣ оный вмѣстѣ сѣ горохомѣ вѣ гумно свозится и обмолачивается, остающіяся его малыя и совсѣмѣ кѣ гороху сходныя зерна вѣ ономѣ, и побуждаютѣ простодушныхѣ земледѣльцовѣ утверждать, что вѣ эшотѣ разѣ горохѣ вѣ горошекѣ переродился. О достовѣрности сего произшествія нѣкоторыя головы шакже упорливо споряшѣ, какѣ о мнимомѣ произхожденіи дяшловины изѣ золы. —

Земледѣльцы вѣ Саксонскомѣ Кур-Фиршскомѣ округѣ, по сѣю сторону Эльбы,
по

по всему среднему Марку называютъ этотъ горошекъ *бѣлымъ горошкомъ*. Прилагаютъ къ сему прозвище, и въ нѣкопрыхъ мѣстахъ называютъ его *стеэне*. Онъ имѣетъ не заслуживаемую учась по недоспапку свѣдѣнiя о его добромъ вкусѣ и полезности бытъ всегда испребляемъ. Но не успѣютъ оглядѣться, какъ появляется онъ между горохомъ еще множесшвеннѣе, равно какъ бы Нашура намъ припоминала шѣмъ: не испребляйте сего расшѣнiя, оно всегда появляется вновь, хотя вы его и не уважаете, и полезности его узнать не хотите! однако въ причинѣ сего испребленiя его должно обвинять больше городскихъ жителей, нежели деревенскихъ. Когда кѣто изъ послѣднихъ въ дешевой годъ вывезетъ свой горохъ на торгъ, и покупщики увидятъ этотъ бѣлой горошекъ въ ономъ, шотчасъ говорятъ: въ этомъ горохѣ горошекъ; это не людямъ ѣсть, а скотинѣ. Еслили земледѣлецъ не хочетъ впредь опдавать своего гороху за половинную цѣну, принужденъ съ намѣренiемъ горохъ свой на сѣмена перебираетъ, и зерна бѣлаго горошка выкидываетъ. Таковымъ образомъ на нѣсколько времени не будетъ онаго между горохомъ, пока вновь опять пояшися въ удивительномъ множесшвѣ.

Выше упомянуто, что горошекъ этотъ лучшему гороху во вкусѣ не успупаетъ; можно пошому варить его одинъ, или смѣшавъ съ горохомъ. Но какъ предразсудокъ

во многихъ пищахъ весьма участвуешъ, можно при вареніи первую воду сливашъ, чпобѣ доставишъ кушанью мнимый лучший вкусъ. А какъ одно только названіе горошекѣ за споломѣ средственнаго соспоянія людей производишъ возмущеніе, можно оное совсѣмѣ оставишъ, и опѣ нынѣ назвашъ *пизели Римской*: названіе и по тому приличествующее, что много сѣюшъ онаго въ Церковной Обласпи, и въ Римѣ на лучшіе сполы подаюшъ. Можешъ быть это новое имя удовлетворишъ нашимъ лакомцамъ до чужестранныхъ пищей и напишковъ.

Въ урожаѣ зеренъ этошъ Римской горошекѣ весьма превосходишъ нашъ обыкновенной горохъ. Когда опѣ полуосмины высѣву приходишъ нашъ горохъ самѣшесшъ, Римской горошекѣ опѣ той же мѣры урожается самѣ - девашъ. Когда же въ самомъ изобильномъ урожаѣ не рѣдко приходишъ онѣ самѣ-12, шо опѣ полуосмины приносишъ 4 чешверши сѣ половиною: обстоятельство, долженствующее поощришъ насѣ оставишъ дѣйствовашъ естеству на нашихъ пашняхъ, и горошку сего не истребляшъ. Къ сему присовокупляешся иное главное обстоятельство, что нашъ обыкновенной горохъ не рѣдко повреждаемѣ бываешъ такѣ называемою медвяною или мучняною росю, а пошому очень подверженѣ неурожаю. Можно всегда въ сложно-сти полагашъ шрешій годѣ для сего приключенія

ченія съ обыкновеннымъ горохомъ. Когда разсмотрѣшь тогда десятину, въ которой горохъ смѣшанъ съ этимъ Римскимъ горошкомъ, оказывается, что и она отъ медвяной росы страдаетъ. Но видима бываетъ припомъ на особливосшь, что по слѣдамъ за медвяною росю слѣдующія травныя вши, кои сокъ изъ расцвѣтія высасываютъ, нападаютъ несравненно больше на листья гороху, чѣмъ горошку, или и совсѣмъ на оныхъ не бываютъ. Вообще же о простомъ горошкѣ довольно извѣстно, что оной меньше подверженъ медвяной росѣ, нежели горохъ. Что же урожай горошку въ сухія лѣта во многихъ мѣстахъ бываетъ скуднѣе, нежели гороху, происходитъ оное отъ того, что подъ него обыкновенно назначаютъ возвышенно лежащія и худшія пашни, на копорыхъ онъ только въ мочливые годы урожаяся можетъ.

Также и пчеловодство можно больше поправитъ посѣвомъ Римскаго горошку, нежели обыкновеннаго гороху, какъ то довольно извѣстно, что пчелы, когда только могутъ имѣть свободу въ избраніи, гороху совсѣмъ не касаются, а охотнѣе берутъ съ цвѣту обыкновеннаго горошку.

Но наконецъ, откуда же попадаетъ бѣлой горошекъ между горохомъ, когда онаго особливо въ полѣ не сѣютъ? На это простой земледѣлецъ, по сказанному въ Берлинскомъ календарѣ, отвѣчаетъ: горохъ переродился или превратился въ горо-

рошекъ. Естества испыташелю должно произхожденіе сего выводись изъ инаго испочника. Попадается оной единспвенно шолько въ шѣхъ мѣсахъ между горохомъ, гдѣ на томъ же полѣ сѣются черной горошекъ. Оной попадаетъ въ гумна просыхъ земледѣльцовъ, а всюду съ навозомъ, вывозимымъ въ полѣ, пошому, что лошади, въ кормъ оной получающія, не всѣ въ желудкѣ своемъ переваривающъ, но многія безъ поврежденія извергающъ, и такъ доспавляющъ оныя на пашню, подѣ горохъ назначенную. Конской навозъ обыкновенно употребляется къ угодженію земли подѣ горохъ, и очень рано въ поле вывозишъ, по пашнѣ разравнивается и въ послѣдспвѣ сѣ разсѣянымъ горохомъ запахируется. При эшомъ попадшія въ землю зерна чернаго горошку, когда онѣ нѣсколько лѣтъ сѣ горохомъ будущъ вмѣстѣ высѣваемы и опашъ пожинаемы, могутъ наконецъ въ бѣлой горошекъ переродиться, какъ - то о многихъ плодахъ извѣсно, что цвѣшочная пыль однихъ цвѣшовъ другія опродія оныхъ оплодотспиваетъ и новое опродіе производитъ: такъ можешъ дѣисповашъ сѣмянная пыль обыкновеннаго гороху надѣ цвѣшами чернаго горошку, и по состоянію погоды въ одно лѣто больше, нежели въ другое, а шѣмъ производитъ выродки изъ гороху сѣ чернымъ горошкомъ. Многократно повреждается горохъ, какъ выше сказано, опѣ медвяной росы, а го-

рошекъ бываетъ свободенъ. Послѣдній по-
тому и безъ того бывъ трешью умолотнѣ
гороху, появляется тогда въ великомъ мно-
жествѣ, такъ что иначе вздумать и объ-
яснить не умѣющій крестьянинъ, съ изу-
мленіемъ говоритъ тогда : горохъ превра-
тился въ горошекъ. Можно объ этомъ испо-
доволь производящемъ превращеніи чернаго
горошку въ бѣлой легко удословѣриться,
когда замѣшишь, что зерна попавшаго съ
навозомъ чернаго горошку въ сѣменахъ
отбѣрнаго бѣлаго гороху уже и въ первый
годъ выходящъ не таковы цвѣтомъ темны,
какъ въ настоящей своей природѣ. Когда
этоу горошекъ посѣянъ будетъ въ смѣ-
си съ горохомъ на другой годъ, принесетъ
онъ сѣмена уже бѣлеса и только съ нѣ-
сколькими черными почками по бѣлому.
Когда же уродится черной горошекъ у то-
го или другаго Хозяина на таковомъ по-
лѣ между горохомъ, гдѣ онъ обширными
полосами одинъ сѣется, то перерожденіе
чернаго горошку въ бѣлой еще скорѣе про-
изойти можетъ. У меня не можешь
сѣе совершиться такъ скоро, потому что
у насъ горохъ сѣютъ не особливими отдѣ-
ленными клинами, но порознь въ отдале-
ніи, и при томъ больше сѣютъ чернаго
горошку, нежели гороху.

10) *Малый весенній горошекъ съ тре-
мя парами листковъ и однимъ гладкимъ
стручкомъ*; *Vicia minima*, Rivin. *Vicia Lathy-
roides*, Linn. Этоу горошекъ оказывается

ве-

весною послѣ дождливой погоды множественно на возвышенныхъ лугахъ, по лѣсамъ и около холмовъ. Оцѣ главного стебля выходящѣ снизу многія, попеременно выходящія, одинакія, около полуфута длиною оспрали. Перистые его листы сидящѣ попеременно на гладкихъ черешкахъ, выходящихъ корешками одинакими вилочками, и состоящѣ въ шести ланцетобразныхъ, нѣсколько волосистыхъ листьяхъ, изъ коихъ задніе почти совсѣмъ сердцеобразны. Подлистни у нихъ спрѣлообразны и цѣльные. Въ углахъ листовыхъ состоящѣ одиначные малые цвѣточки, почти вполнѣ къ листу прижаты. Сосудецъ цвѣточной полосащѣ, изъ краснаго съ зеленымъ, и оканчивается пятью очень острыми равнообразными зубчиками. Кругловатой касочной листокъ нѣсколько оспрѣ, блѣднопурпуроваго цвѣту съ шемнѣйшими полосами; нѣсколько корешкіе крыловые листочки вверху другъ противъ друга загнушы и блѣлокрасноваты; а хвостовой листокъ гораздо меньше, и блѣлой съ пурпуровымъ. Тонкіе спручки споятъ почти прямо, окружаящя чашечкою, оканчивающя къ наружной сторонѣ загнушымъ оспрѣемъ и содержащѣ каждой оцѣ 5 до 7 малыхъ, темноватыхъ съ чернымъ пятнышкомъ сѣменъ. Волокнистый корень его многолѣтній. Гдѣ растѣніе эшо находящя, щипается мѣсто шаковое лучшею пашвою свцамъ.

11) Желтый горошекъ съ гладкими цвѣтами и одинакими мохнатыми висящими стручками; *Vicia lutra*, Linn. Растетъ самъ собою въ Испаніи, Франціи и Италіи, а по сказанію Г. Поллиха близъ Дармштада и Франкфурта, что на Майнѣ, цвѣтешъ въ Іюнѣ, и по его же сказанію, имѣетъ волокнистый, многолѣшный корень; по сказанію же Г. Линнея, только однолѣшній. Коленчатый и гладкій его спелебель выросшаеъ вершковъ 14 вышиною. Желтые его цвѣточки шорчаеъ вверхъ, а спручья внизъ висяеъ, обыкновенно мохнастые, но иногда большею частью гладкіе.

12) Желтый горошекъ съ мшистыми цвѣтами и одинакими мохнатыми висящими стручками; *Vicia hybrida*, Linn. Этогоъ однолѣшній горошекъ растеъ въ Монпельерѣ, и многимъ сходствуетъ къ предшедшему; но листья на немъ шупѣе, меньше, усажены волосками; подлистки не темны, но совсѣмъ зеленые, а цвѣшны сверху сѣроваши и волосисты.

13) Подзаборной горошекъ съ четырьмя вмѣстѣ сжатыми цвѣтками; Крупной ранней горошекъ; *Vicia serium*, у Ривина и Линнея. Находятъ этогоъ горошекъ во влажныхъ перелѣскахъ и лѣсахъ, гдѣ шень и добрая земля; корень его длинся многіе годы; цвѣтешъ въ Маѣ и Іюнѣ. Онъ много сходствуетъ ко второму роду. Волокнистой его корень далеко разпросируется. Общій цвѣточный черешокъ раздѣ-

дѣляется въ началѣ своемъ на четверо, даже на пятеро и шестеро, изъ коихъ на каждомъ опроспкѣ черешка сидитъ на сторону и внизъ загнувшійся цвѣшокъ. Касочной листокъ въ цвѣшкѣ блѣдносинь, равно и крыловые листки; малой хвостовой листокъ бѣлѣ, лоснящійся, и на кончикѣ синь. Спручья на немъ черные, сначала загибающіеся внизъ, потомъ вверхъ, гладкіе, лосковаые, оканчивающіеся какъ бы выспавкою, и въ каждомъ изъ нихъ бываетъ по 4, иногда больше, круглыхъ, гладкихъ, темныхъ съ черными пятнами сѣмечекъ; иногда попадающіеся былки съ цвѣтами, совсѣмъ бѣлыми. Не взирая на то, что горошекъ эшотъ имѣетъ нѣсколько вяжущій вкусъ, овцы ѣдятъ его съ охотою.

14) *Вифинской горошекъ съ двумя парами листовъ и одностебельнымъ цвѣткомъ*; *Vicia Bithynica*, Linn. Горошекъ эшотъ расхетъ въ Италіи, также въ Баваріи по пашнямъ, имѣетъ многолѣтній корень, коленчатый стебель, многообразно вызубренные подлишки и листки, кои состоятъ въ числѣ только двухъ паръ ланцетообразныхъ. Касочной листокъ въ цвѣшкѣ фіолетовъ, крыловые листки бѣлы, спручья на немъ сдвлены, мохнаты и содержатъ по 6 сѣмечекъ.

15) *Французской горошекъ съ двумя и тремя парами листовъ, и тройными соединенными цвѣтами*; горошекъ Лан-

гедокской; черной горошекъ; Арабской горошекъ; *Vicia Narbonensis*, у Линнея и Ривинуса. Но не должно сего рода смѣшивать за одно съ Ривинусовымъ *Lathyrus Narbonensis*, кошорой у Линнея названъ *Lathyrus latifolius*. Распешъ во Франціи и Англіи, также въ Сибири, и ешь лѣшнее распешіе. Снебель имѣетъ коленчатой и бороздчатой; иногда, а особливо когда распешъ на худощавой землѣ, цвѣшы на немъ бывающъ по одиначкѣ и сидящъ въ углу листовомъ, впрочемъ по тройкѣ вмѣстѣ и шемноурпурово - красные. Г. Гледитшъ одобряетъ посѣвъ въ особливости для пчелъ всѣ роды горошковъ, такъ и эшотъ Французской горошекъ, и совѣщаетъ къ полученію цвѣшовъ рановременно и продолжительному имѣнію оныхъ, сѣмена его сажаютъ или сѣяютъ весною какъ скоро снѣгъ сойдетъ, и эшотъ сѣвъ повторяютъ чрезъ каждыя 3 недѣли до половины Іюня или позднѣе. Въ самомъ эшотѣ намѣреніи и описалъ я извѣстные роды горошковъ по ихъ главнымъ характерамъ, дабы впредь можно было приаждать къ посѣву разныхъ родовъ оныхъ, частію для получения зеренъ, отчасти къ употребленію въ пользу скошководства въ свѣжій и сухой кормъ, а потомъ къ подкрѣпленію и умноженію пчеловодства, дославляя пчеламъ ежемѣсячно свѣжіе цвѣшы оныхъ, съ весны до самой осени: ибо наша обыкновенная дятловина мало пользуется или вовсе не пользуется

собствуетъ къ приращенію сборовъ отъ пчелъ, исключая одной бѣлой дикораснувшей дятловины, кошорая кой гдѣ сама собою видима на поляхъ и лугахъ. Но цвѣшны гороховъ могутъ всюду возстановить пчеловодство, гдѣ бы недоспашокъ ни былъ въ полевыхъ цвѣтахъ, и на примѣръ гдѣ не сѣютъ рѣпнаго сѣмени и гречихи, или оныя не уродятся, или посѣвъ оныхъ яко неудачливый оставленъ будетъ. Въ нашихъ мѣстахъ гречиха родится плохо, почему и сѣмъ мы оной мало, не взирая на то, что она лучшую пищу пчелъ составляеть. Въ отношеніи же къ пчеловодству держимся мы болѣе горошковъ; а сему подражать и во всѣхъ мѣстахъ не худо, кроме содержанія онымъ скопины, яко главнаго предмета, такъ и въ пользу пчеловодства многіе онаго роды испытывають, и кошорые изъ нихъ лучше удадутся, шѣхъ сѣвы и впредь продолжать съ множайшимъ прилѣжаніемъ. Во многія лѣта здѣсь примѣчено, когда весенніе мѣсяцы были холодны, и пошому цвѣшны на лугахъ и поляхъ, такъ и древесные были пчеламъ недоспапочны, ходили оныя на полетъ единственно къ цвѣшущему горошку запасаться медомъ, а безъ горошкового цвѣшу конечно бы и на полетъ не пошли.

3. *Сочиво, сочевица или чечевица.*

Сочевицы имѣемъ мы два рода: обыкновенную сочевицу, кошорую и красною называющую, *Lens vulgaris*, у Бавхинія, и

крупную сочевицу, *Lens major*. Но можно еще положить средній родъ сочевицы, которая покрупнѣе обыкновенной и поменьше крупной сочевицы; пошому что обыкновенная или малая сочевица, когда посѣяна будетъ на лучшей землѣ, а особливо когда она будетъ унавожена и вскопана засшупомъ, родится крупнѣе, и переходитъ въ средній родъ; равнымъ образомъ и крупная сочевица, естли посѣяна будетъ на худшей землѣ, выраживается въ средній родъ. Въ городахъ крупной сочевицѣ дають преимущество, но средняго роду бываетъ вкуснѣе. Малаго роду сочевицу, ш. е. мѣлкую у насъ и на шоргѣ вывозить не за чѣмъ; купцовъ на нее не выищется, и принуждено будетъ употреблять въ кормъ скотинѣ. Но когда посѣяна она на доброй землѣ, родится она умолошнѣе крупной и солому ея молодая скопина бстѣ охошнѣе.

Сочевицы не шаково хорошо родятся на плошной или связной землѣ, какъ на мягкой и пришомѣ шучной. Не любяшъ же онѣ и слишкомъ влажную землю.

Когда естъ на сочевицу расходъ, и пошому нужно будетъ сѣять оной больше, не худо, по подобію сказаннаго о горохѣ, занимать подъ оную нѣсколько десятинъ, свѣжеунавоженныхъ въ паровомъ клину, а нѣсколько во второй и шретій разъ по унавоженіи подъ хлѣбъ приходящихъ, дабы, какъ навѣрное ожидашь можно, на ко-

шс-

порой нибудь десятиинѣ уродилась оная лучше.

Кто сѣетъ сочевицу для своего спола, а всего паче на продажу, долженъ къ предваренію всякаго бракованія и къ скорому расходу по шоргамъ, сѣять сѣменами самыми чистыми; ибо сорныя травы ни въ какомъ хлѣбѣ сполько не размножаются, какъ въ сочевицѣ, и наполняютъ оную множествомъ своихъ сѣменъ; и для того сочевицу на сѣмена должно выбирать и начисто освобождать отъ всякаго сору. Гдѣ земли правянисты, тамъ по всходамъ сочевицы, когда оная будетъ еще въ палецъ ростомъ, начисто травы выпалываютъ, чѣмъ при молотбѣ оной никакого сору съ нею не смѣшалось. Тѣмъ меньше будетъ труда въ перебираніи сочевицы на кушанье; ибо на споль подають оную не проширая, по подобію гороху, но цѣлкомъ разварную, и доброша сего кушанья гѣ шомъ, чѣмъ никакихъ постороннихъ сѣменъ между оной не было. Значитъ, что сочевица совсѣмъ поспѣла, и пора оную косить, когда красивая ея зелень пропадетъ и не видно будетъ кудрявыхъ ея кустовъ, но пожелтѣвъ и поблекнувъ къ землѣ прилегающъ начнетъ, а спручки ея будутъ очень желты и коричневы. Какъ права и спручки ея поше и нѣжише прочихъ спручковыхъ плодовъ, высыхаетъ она скорѣе, и въ третій день по скошеніи можно оную сгребать.

Соче-

Сочевичная солома въ кормленіи молодого скопа составляетъ главную пищу, и далеко предпочитается гороховой соломе. Закладываютъ оную ягнямъ и пѣляшамъ попеременно съ обыкновеннымъ сѣномъ въ рѣшешку для щипанія.

И. *Конскіе бобы.*

Конскіе бобы, называются инако *кормные* или *полевые бобы*; *Faba minor seu equina*, Bauh. Это отродіе отъ свинныхъ бобовъ, или большаго рода, которые въ огородахъ сажаютъ, находится во многихъ мѣстахъ, и множественно сѣется въ полѣ для скотскаго корму съ немалою пользою; ибо на удобныхъ пашняхъ приходящъ оныя отъ самъ-12 до самъ-20 противъ посѣву.

Не всякая пашня удобна къ хорошему урожаю сихъ бобовъ. На песчаномъ мѣстѣ они не удаются; на глинистой связной пашнѣ, также на тучномъ черноземѣ, хорошо они урожаются, а особливо еслили пошва шаковая глубока и мокрота. На травянистыхъ пашняхъ посѣвъ сихъ бобовъ не совѣшую, для того что они могутъ испортить землю къ будущему сѣву; ибо за рѣдкимъ ростомъ своимъ дающъ свободу сорнымъ травамъ весьма усиливаться, чрезъ что земля обложится и лишается своихъ соковъ. Еслили желать, чтобъ пашня подъ бобами не испортилась, должно оную либо полоть, или бобы оканчивающъ

пывашь мошыкою, и шѣмъ отъ нравъ освобождашь.

Поелику бобы сїи сѣютъ шокмо для зеренъ, а солома ихъ не слишкомъ въ кормъ скопинъ способна, пошому что шолспа и дровяниста, развѣ очень дробно въ рѣзку будешъ перекрошена; оная имѣешъ суровой вкусъ, почему и въ рѣзкѣ безъ подмѣси другихъ соломы не годится.

Когда спручья бобовъ начнутъ чернѣть, и пошому можно заключаешь о ихъ спѣлости, подкашивають ихъ косою, и пошребна хорошая погода дней на 8, чшобъ они по перовороченїи просохли. Въ дождливую погоду зыпекають они изъ спручьевъ, такъ какъ горохъ, ешъли послѣ пригрѣшъ солнцемъ; связываютъ ихъ въ связанки, и въ свое время на гумнѣ обмолачивають. Бобы сїи очень долго безъ всякаго призору могутъ лежать въ амбарѣ. Для задачи въ кормъ скопинъ ихъ размачивають, или мѣлять въ муку на пересыпку.

I. Цицеръ или материнка, или Италіанской горохъ.

Эшотъ полевой плодъ въ Нѣмецкой землѣ довольно извѣстенъ подъ названїемъ Richern, Zieser-Erbisen, у Линнея *Cicer sativum*, или *arietinum*, и въ здѣшнихъ мѣстахъ лѣтъ за 20 и за 30 начали было его сѣять множественно, но за шѣмъ оставили, что въ продажѣ мало на него расходу, и городскіе жишели охотнѣе покупають простой горохъ, сочевицу и бобы. Цвѣтомъ горохъ эшотъ бываетъ различенъ, пошому что зер-

зерна его бывають бѣлыя и красноватыя, но въ добротѣ и вкусѣ разношны не имѣють. Нѣкоторые называютъ этошъ горохъ кофейнымъ, пощому что жгутъ и пьютъ оной вмѣсто кофе; однакожъ напишокъ изъ нихъ ни мало къ настоящему кофе не сходенъ, да и не очень здоровъ, пощому что производитъ надмѣнїе чрева. — (Во Франціи горохъ этошъ называютъ *шишъ*).

Чтожь наши земледѣльцы, опричь малаго расходу на этошъ горохъ, переспали его сѣянъ, причина тому большею частью, что солома его меньше гороховой къ кормленію скопины удобна. Также нужно обсѣянные имѣ пашни, а особливо естли оныя шравянисшы, выпалывать, чтобъ сорныя шравы плода сего не одолбли, землю не ишожили и не залубнили; подъ него опредѣляютъ пашню, бывшую подолномъ, и кошорая дѣйствіемъ зимы ошъ сорныхъ шравъ очистишся. Нынѣ земледѣльцы сѣютъ его лишь тамъ, гдѣ земля подъ горохъ не годишся, и приносишъ горохъ худо, или шаконъ, кошорой не развариваетъ; но гдѣ доброй горохъ урожаешся, тамъ вообще его цизеру предпочитають. Земля подъ него пошребна средшвенная, и въ случаѣ нужды, умѣренно унавоженная. Сѣютъ его въ Апрѣлѣ, и косятъ не давъ ему доспѣшъ, а въ прошивномъ случаѣ, естли спрыснетъ его дождемъ, почти всѣ зерна изъ спручковъ вышекуютъ и про-

пропадутъ. Въ Испаніи и Италіи много цизеру сѣютъ, и охотно употребляютъ въ пищу.

К. *смѣсь стручковыхъ плодовъ.*

Подъ названіемъ смѣ разумѣется смѣшеніе высѣваемыхъ стручковыхъ зеренъ съ сѣменами другихъ хлѣбовъ въ томъ намѣреніи, чѣмъ опчастіи отъ малаго количества сѣменъ стручковаго плода больше получишь умолоту, нежели обыкновенно урожается, когда сѣютъ оныя одни, часью же чѣмъ вышелъ изъ того лучшій кормъ для домашней скопины всякаго рода; ибо оная солому, смѣшанную съ стручковыми растѣніями, бѣтъ охотнѣе, да и кормъ эшотъ ей здоровѣе. Горохъ, сочевица и горошекъ суть главнѣйшіе изъ стручковыхъ плодовъ, которые во многихъ мѣстахъ высѣваютъ въ смѣси съ хлѣбными зернами съ немалою выгодною; но конскіе бобы высѣваютъ, смѣшавъ только съ одною сочевицею, рѣдко съ горохомъ. Не взирая на то, что стручковые плоды не великую часть въ смѣси къ посѣву съ другими родами хлѣба составляютъ, но предшесвуяшъ названіемъ своимъ смѣшаннымъ съ нимъ зернамъ, такъ на примѣръ, не говоришя ячмень съ сочевичею, ячмень съ горошкомъ, но сочевица съ ячменемъ, горошекъ съ ячменемъ, и проч. Надлежитъ же наблюдать и нѣкошорый размѣръ въ смѣси сѣменъ стручковыхъ плодовъ съ другими, есшлы желашъ доспигнуть предпрі-

пріемлемаго намѣренія. По сему въ нѣкоторыхъ сѣменахъ, на примѣръ, не должно брашь столько горошку, сколько сочевицы, естли мѣшашъ ихъ съ ячменемъ; а гороху должно брашь еще меньше, нежели горошку, пошому что оной своими крупными плешами, и особливо широкими листвами, расущій съ нимъ хлѣбъ заглушишь можешъ; а главное намѣреніе состоитъ въ томъ, чтобъ отъ каждого хлѣба въ смѣси получить зерна и солому. Можешъ также и состояніе пашни произвешъ, что иногда больше, иногда меньше сѣменъ стручковыхъ плодовъ въ подмѣсъ класъ должно, какъ-то въ разныхъ родахъ смѣсей, ниже описываемыхъ, объяснено будетъ.

АА. Горохъ съ рожью.

Во многихъ странахъ, гдѣ свойство воздуха позволяешъ, сѣютъ яровую рожь еще въ началѣ Февраля на сухихъ возвышенныхъ пашняхъ; но въ другихъ мѣстахъ, и гдѣ пашни низки и мокры, сѣютъ оную уже въ Апрѣлѣ, когда земля обсохнешъ. Естли пашня подъ яровую рожь будетъ легка и не довольно сильна, можно размѣръ гороху противъ ржи положить, какъ 6 къ 10, или для смѣси полуосмины гороху съ рожью взять 6 гарнцовъ гороху и 10 гарнцовъ ржи. Естли же пашня надлежитъ къ самымъ легкимъ возвышеннымъ песчанымъ землямъ, должно гороху взять только 4 гарнца, что-бы

бы оной очень рѣдко росъ, и земля бы сѣвъ поднять могла.

Можно не однократно пробѣжая тому, у кого нѣтъ собственныхъ равнаго содержанія пашенъ, замѣшивъ, что легкая песчаная земля, когда нечаянно попадеши въ нее нѣсколько гороховыхъ зеренъ между распушею на ней яровою рожью, производишь таковыяжъ дородныя плеси и лисы съ цвѣтомъ и спручьями, какъ бы на лучшихъ земляхъ. Нѣкоторые по недосыпкѣ опытности обманувшись таковымъ явленіемъ, побуждены были къ таковому же раннему сѣву, каковъ обыкновенно бываетъ яровой ржи на возвышенныхъ легкихъ поляхъ, одного гороху на пашняхъ сего роду, находясь во мнѣніи, что горохъ выходитъ столько доброшенъ лишь ошъ одного ранняго сѣву; однакожъ обманулись, увидѣвъ, что горохъ ихъ хотя взошелъ довольно рано, но получилъ пощѣе лиски со слабыми и коропками плешами, что цвѣтъ былъ только на немногихъ, и то въ маломъ числѣ, что они гороху, которой по песчаности мѣста лишь по землѣ сплался, советамъ косить не могли, и едва половину сѣменъ возвратили. Основанія сему искашь не въ иномъ, кромѣ того, что пощяя пещаная земля для столько многихъ гороховыхъ расѣнѣй не имѣла въ себѣ довольноаго количества питательныхъ частицъ, и сообщила имъ лишь

Часть III. Отдѣл. 2. Д сколь-

сколько могла. Опыты съ этимъ совершенно согласны. Чѣмъ меньше гороху въ смѣси съ рожью на худой землѣ выскъ-яно будетъ, тѣмъ дебелѣе окажутся ли-сты гороху на всходахъ, и тѣмъ больше можно ожидать урожая ни нхъ зеренъ.

Въ разсужденіи средспвенныхъ пашенъ, въ чемъ разумѣются песчаныя пашни, нѣ-сколько низменно лежащія, должно на полосмны сѣменъ также не больше 4 гарнцовъ гороху подмѣшивать, развѣ-шолько кто уповаетъ, что въ разсужде-нїи обстоятельствъ погоды горохъ луч-ше другихъ хлѣбовъ уродиться можетъ. Когда погода послѣдуетъ по ожиданію, тогда вся рожь отъ высокихъ и разши-ряющихся гороховинъ будетъ задавлена, оной уродится очень мало, или совсѣмъ ничего, но тѣмъ больше гороху. Однако можетъ при семъ случиться, что бошѣ-ющій изъ заглушенной ржи высоко выро-стающій горохъ будетъ на цвѣту захва-ченъ медвяною росю, и тѣмъ плодono-шенію его возпрепятствуется: тогда обо-ихъ родовъ сѣменъ, ржи и гороху по рав-ной уродится мѣрѣ; и такъ безопаснѣе наблюдать умѣренной размѣръ въ подмѣ-си гороху въ рожь для пашенъ помяну-таго содержанія.

Въ жатвенное время должно избиратьъ средній путь допусканія къ созрѣванію между спручковаго и другаго хлѣба, а не того ждешь, оба пока хлѣбы совсѣмъ поспѣ-ютъ.

юшѣ. Есѣли въ подмѣсь яровой ржи взятѣ будещѣ не ранній горохѣ; шо хощя горохѣ поспѣетѣ нѣсколько позднѣе ржи, но при сжатіи оной, а особливо при косѣбѣ, очень много зеренѣ потрапишя, развѣ только работу такѣ учредитѣ, чѣтобѣ ранѣе поспѣвшую рожѣ не во время жару дневнаго, но съ росю коситѣ.

Когда въ выше приведенномѣ умѣренномѣ размѣрѣ смѣсь гороху произойдетѣ, получишя и та выгода, чѣто горохѣ съ рожью скорѣе просохнетѣ и поспѣетѣ къ вязанію и свозкѣ.

На гумнѣ по обмолоченіи во время вѣянія гороху, смѣшаннаго съ рожью, должно размахѣ дѣлать больше, чѣтобѣ горохѣ по тяжести далѣе оплеталѣ; а хощя часть онаго и останеѣ во ржи, не мѣшаетѣ шо, хотя бы употребляѣть оную и не въ скотской кормѣ, молоѣть оную въ муку; ибо выше объявлено, чѣто гороховая мука со ржаною сосѣавляетѣ въ печеніи здоровой хлѣбѣ.

БВ. Горохѣ съ овсомѣ.

По обвѣщеніи опыту моего надѣ горохомѣ съ овсомѣ въ Виппенберг. Еженедѣльникѣ 1772 года въ Stucke 5, многіе Хозяева учинились моими послѣдователами, и начали сѣять сію смѣсь стручковаго плода. Въ разсужденіи размѣру гороха съ овсомѣ, такѣ и въ снятіи сего плода, должно наблюдать все шо же, чѣто сказано выше о горохѣ съ рожью; лишь сіе

долженъ я присовокупить, что по обстоятельству ранняго или поздняго посѣву, получается ранній или поздній горохъ. Когда овесъ посѣянъ будетъ въ Маѣ, поздній горохъ съ овсомъ вмѣстѣ не поспѣетъ, почему вѣрнѣе въ смѣсь эту употреблять сѣмена ранняго гороху.

Къ подтвержденію вышесказаннаго моего опыту, долженъ я прибавить, что къ сѣву на худой пашнѣ бралъ я нѣсколько разъ только червопоченной горохъ, до половины зеренъ червями выѣденной, которой отобранъ былъ изъ сѣменнаго гороху; однако этотъ червопоченной горохъ хотя очень хорошо взошелъ, но не таково бодро росъ, какъ цѣлыхъ непронувыхъ зеренъ. Если бы такія поврежденные зерна высѣять на лучшей землѣ, больше пипанія доставляющей, конечно оныя удачный урожай принесутъ.

При вѣяніи гороха съ овсомъ должно размахи производить еще больше, нежели съ рожью; потому что тяжесть ржи цѣлою трешью больше, нежели вѣсъ овса.

ВВ. *Горошскъ съ рожью.*

Гдѣ недоспашокъ въ сѣнѣ, намѣщаятъ шамъ оной щадательно сѣвомъ этой смѣси, и совѣшую всѣмъ Хозяевамъ, кои и не имѣвъ недоспашку въ сѣнѣ, желаютъ сдѣлать пользу своему скопководству, чтобы они прилѣжали къ сѣву смѣси горошку съ рожью, дабы шѣмъ легче всего могли поправить зимній кормъ своей

ей скошины. А шерпящимъ недостатокъ въ сѣнѣ Хозяевамъ не можетъ быть показано инаго легчайшаго пуши къ скорому намѣщенію сѣна; и такъ онымъ должно стараться больше о запасеніи горошковой соломы, яко роду дяпловиннаго сѣна, нежели о полученіи при томъ зерна.

Предпріемля сѣять горошекъ съ рожью, должно сѣвъ производить нѣсколько позднѣе обыкновеннаго сѣву яровой ржи, не въ самомъ началѣ Апрѣля, а особливо на мокрыхъ пашняхъ; попому что опчаспи горошекъ мокрую спужу не такъ хорошо выдерживать можетъ, какъ горохъ, но на таковыхъ пашняхъ при холодной погодѣ, и прежде нежели оныя обсохнутъ, вскорѣ зажелтѣвшъ и сдѣлается боленъ.

Распѣніе горошковое, прислоняющееся ко ржанымъ былинамъ, или обвивающееся около ихъ, не таково тяжело-вѣсно, какъ гороховое, и имѣетъ листы несравненно меньше, почему размѣръ смѣси къ посѣву полуосмины можетъ прибавленъ быть горошку гарницами двумя, по содержанію свойства земли, противу размѣру показаннаго о смѣси гороху съ рожью.

Когда въ смѣсь съ рожью взятъ будетъ обыкновенной черной горошекъ, и горошекъ при вѣянтіи отъ ржи чисто не отдѣлился, таковыя смѣшанныя зерна употребляются въ кормъ скотинѣ. Если же намѣренно эту смѣсь употребляютъ

въ муку, должно вмѣсто сего горошку въ сѣмена подмѣшивать бѣлой горошекъ или *пизели* Римской, которой, какъ выше сказано, по своему вкусу равняется гороху, и составляетъ очень сладостный, и всякой домовый сѣноядной скошинѣ пріятный кормъ.

ГГ. *Горошекъ съ ячменемъ.*

Горошекъ мѣшаютъ къ посѣву какъ сѣ крупнымъ, такъ и сѣ малымъ ячменемъ, полагая 3 доли ячменю, и одну долю горошку.

Кому равная надобность въ зернахъ гороховыхъ, какъ и въ соломѣ его, долженъ тотъ сѣять оной сѣ крупнымъ или раннимъ ячменемъ. Въ смѣси сѣ малымъ ячменемъ, которой чрезъ 9 и 10 недѣль по посѣвѣ поспѣваетъ, зерна горошку вырѣть не могутъ, но тѣмъ сочѣйшая получится солома, такъ что довольно наградишься тѣмъ урономъ зеренъ, или не-совершенство оныхъ.

Есѣли сѣ крупнымъ ячменемъ зерна горошковые выспѣютъ, употребляютъ ихъ вообще къ кормленію скопины; зерна цѣлкомъ въ задачу лошадямъ и домовымъ ппичамъ, а малыя въ пересыпку рогащому скоту и свиньямъ.

ДД. *Горошекъ съ овсомъ.*

Въ подмѣсъ овсу, есѣли только оной по состоянію климата не въ Мартѣ еще высѣвается, берется горошку одна часть, а овса три части. Зерна горошку лучше

вы-

выспѣютъ въ смѣси съ овсомъ, для того что оной ранѣ ячменя высѣвается.

ЕЕ. *Горошекъ съ конскими бобами.*

Какъ по вышеписанному конскіе бобы, а особливо на правянистыхъ пашняхъ, очень гадятъ попущеніемъ росу всякимъ правамъ, ошвращаютъ это подмѣсю въ смѣна бобовъ цѣлой половины горошку. Однако эту смѣсь на низкихъ мокрыхъ пашняхъ не должно высѣвать рано; впрочемъ горошекъ росномъ отъ бобовъ ошстанетъ. Въ нехорошую погоду и на рядахъ подкошенной горошекъ отъ дождя весьма повреждается; ибо въ смѣси съ горошкомъ бобы на рядахъ прежде двухъ недѣль просохнуть не могутъ. При семъ верхній слой горошку высохнетъ, случившійся дождь обобьетъ съ него листья, а пошомъ зерна изъ спручковъ вышекутъ. И такъ, кому угодно сѣять смѣсь горошку съ конскими бобами, шотъ лучше учинишь, ештли возьмешь шрудъ бобовины изъ горошку повышаскашь и скласъ особливо, дабы онѣ однѣ высыхали.

ЖЖ. *Горошекъ съ гречихою.*

Въ странахъ, гдѣ гречиха хорошо урожается, а въ травѣ и сѣнѣ недосапокъ, сѣютъ горошекъ въ смѣси и съ гречихою. Такъ происходитъ по сосѣдству моему въ флемингенѣ, и въ посѣвѣ мѣшаютъ большею частью на 3 мѣры гречихи одну мѣру горошку, и либо оба сѣи расшѣнія на цѣвшу косятъ и сушатъ въ сѣно, а на

отростающей отъ корней правѣ пасутъ скошину; или сѣютъ эшу смѣсь единственно для справливанія скошиною, дабы впряжной скошинѣ не было недоспашку въ корму, когда паровой клинъ вспашутъ.

33. *Сочевница съ ячменемъ.*

Сѣвъ сочевицы съ ячменемъ издавна упошребителенъ въ Австрїи. У насъ производящъ его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при большихъ помѣстьяхъ, гдѣ послушались полезныхъ *Экхарттовыхъ* совѣтовъ. Онъ пишетъ объ этомъ слѣдующее: Сочевичная солома лучше гороховой, и очень способна для тѣлящъ и ягнящъ, а особливо жеребятъ.

Должно сѣять сочевицу съ ячменемъ, говорю я это изъ опыту; и сѣву сего при большихъ помѣстьяхъ довольно выхвалишь не можно. Когда не случится запасныхъ шаковыхъ сѣменъ, можно смѣшать полшоры чешверши ячменю съ полуосминою сочевицы, и осмину эшой смѣси высѣять на десяшинѣ пашни, приходящей подъ впорой сѣвъ по унавоженіи. Хлѣбъ эшой обыкновенно распешъ, за шѣмъ что нѣжныя плещи сочевицы обвиваются около ячменныхъ соломинъ, такъ что смотрѣшь на него любо. Солома сія составляетъ въ зимнее время преизрядный кормъ всякаго рода скошинѣ, какъ цѣльная, такъ и рѣзкою обкаченная варомъ для откармливаемыхъ воловъ и дойныхъ коровъ.

ровѣ. Зерна можно молоть для хлѣбовѣ, и мѣшашъ муку сію со ржаною въ домашнемъ расходѣ; выпекаемые изъ него хлѣбы очень бывають пышны. Въ особливо-сти зерна сіи соспавляютъ шаковой кормъ лошадямъ, какого лучше желать не лзя. Кошнымъ овцамъ предъ шѣмъ, какъ оныя ягнятся, задача снопами сочевицы ячменной очень ихъ подкрѣпляетъ, и снабжаетъ ихъ силами къ разрѣшенію и выкармливанію ягнятъ. —

Въ Австріи получаемыя отъ эшой смѣси зерна мѣшаютъ пополамъ и въ шрешъ съ рожью, и смоловъ пекутъ очень вкусной и пишательной хлѣбъ для служителей. Въ эшу смѣсь употребляютъ ранній ячмень, которой въ сѣверныхъ частяхъ Нѣмецкой земли не ранѣе высѣваютъ, какъ въ обыкновенную пору сѣва сочевицы.

А. Чречиха.

Гречиху или гречу не во всѣхъ мѣстахъ сѣютъ; но гдѣ оную сѣютъ, шамъ можетъ она въ урожайные годы приходить сама-12 и даже сама-двадцаша. Требуешъ оная земли больше легкой, нежели тяжелой, кошую подъ нее не уваживаютъ, пахутъ разъ или два; въ особенности урожается оная по ноямъ разпаханнымъ, кои содержатъ супесокъ; шакъ и на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ растетъ боровикъ или верескъ права, *Erica vulgaris* у Линнея названная, и кои будутъ разпаханы, гречиха

очень хорошо урожается, учиняетъ землю мягкою, прѣуготовляетъ къ будущему сѣву ржи, и содѣйствуетъ, что въ урожающейся попомъ ржи не бываетъ никакого сору, но одни полноцѣсныя зерна. Полезна же эшомъ родъ хлѣба и на обыкновенныхъ родахъ пашенъ, къ учрежденію полезной перемѣны въ посѣвѣ родовъ хлѣба; ибо опчаси пашню не такъ, какъ другіе роды хлѣбовъ, высасываетъ, такъ и для того, что широкими своими листьями нѣкоторые сорныя травы глушитъ, а землю учиняетъ рыхлою. По таковому учрежденію, гдѣ поля раздѣляющіяся на три клена, обыкновенно сѣется въ паровомъ клину (*), но не очень рано. Гречишное растѣніе очень нѣжно, и спужи никакой сноситъ не можетъ. Въ нашихъ мѣстахъ (въ верхней Саксоніи) до Іюня мѣсяца о сѣвѣ гречи и помышлять не должно.

Въ гречихѣ есть та особливостъ, что она лучше урожается на холодныхъ пашняхъ, нежели теплыхъ; почему у насъ она бываетъ рѣдко удачна. Она цвѣтетъ хорошо, но большею часью выходитъ

(*) Въ Россіи нѣтъ обыкновенія сѣять гречиху въ паровомъ клину, но всегда въ яровомъ; но кажется, что и не удобно сіе сдѣлать: ибо сѣвъ гречи обыкновенно начинаютъ съ 1 го и 14 Іюня; а сѣвъ озимаго хлѣба съ 1 Августа: то въ два мѣсяца гречи хоща выспѣетъ, но землю подъ рожь приготовить не успѣетъ.

дитѣ пуспозерница; въ Флемингѣ же по сосѣдству напрошивъ урожаеся очень хорошо, для того что тамъ холодныя пашни. Вообще кажется мнѣ, что замѣшилъ я, гдѣ распушъ березы, на той землѣ и гречишъ родѣ.

Въ Флемингѣ наблюдають разные времена къ сѣву гречихи: ранній, средній и поздній; потому что когда одинъ не удастся, другіе могутъ быть успѣшны. Первый производитъ тамъ въ началѣ Мая, второй въ концѣ, а третій или поздній въ Іюнѣ.

Чипобъ гречиха получила прямо широкіе листы, въ разсужденіи пріуготовляемаго изъ оной сушенago скотскаго корму, и чипобъ хорошо окуспилась, не должно оную сѣять густо. Она растетъ скоро, но къ удачливому росу требуетъ часнаго дождя. Для пчеловодства не можетъ быть на поляхъ инаго лучшаго растѣнія: ибо какъ скоро гречиха выроснетъ въ пя-
денъ длиною, начинаетъ уже цвѣсти, и цвѣщеніе ея продолжается почти до самаго ея кошенія. Если на цвѣту ея случится мучная роса или сухая молнія, послѣдуетъ пуспозерница. И такъ гречи-
ха имѣетъ прехъ враговъ: холодную погоду или ночные морозы въ Маѣ, въ разсужденіи ранняго или перваго сѣву; а въ разсужденіи поздняго медвяную росу и часто бывающую сухую молнію. Чрезъ сіе объясняется причина, для чего совѣ-
ють

ютъ производить при сѣва. Когда случись годъ, производящій медвяную росу, ранній сѣвъ большею частью уже опцѣвѣшъ, и потому опъ медвяной росы ничего не потерпишъ; есѣли же напротивъ ранній сѣвъ поврежденъ будетъ Майскими морозами, то два слѣдующихъ, средній и поздній, или кошорой нибудь изъ нихъ, обыкновенно опъ медвяной росы и сухой молнѣи мало потерпишъ или вовсе ничего, развѣ только присовокупись къ тому засуха, какъ случилось въ 1783 году. Только въ разсужденіи поздняго сѣву должно напомнимъ, чѣобъ оной производить не слишкомъ поздно, дабы косѣба оной приходила не позднѣе 24 Августа, есѣли кто хочѣшъ хлѣбъ эшопъ порядочно прибавить; потому чѣо его очень сочные и нѣсколько дровянистые стволы перебувають по крайней мѣрѣ недѣли сушенія на солнечномъ жару, въ недоспашкѣ же онаго попребно недѣли двѣ, чѣобъ гречишная солома высохла. Есѣли оную не очень сухою свезти въ гумно, плѣсневѣшъ она, и въ кормъ скопинѣ не годится, а особливо овцамъ. Зерна равномѣрно, есѣли не ускорено будетъ молошью, повреждаются, и по вымолоченіи оныхъ изъ влажной соломы принуждено будетъ просушивать ихъ въ прохладномъ амбарѣ.

Косѣбою сего полевого плода Флемингцы не выжидаютъ, пока всѣ листья на немъ пожелтѣють. Нѣтъ ни одного изъ
поле-

полевыхъ плодовъ, кошорой бы въ жашвенную пору имѣлъ опчаспи столько спѣлыхъ, часью же столько незрѣлыхъ зеренъ, какъ гречиха; производить сѣе отъ того, что она такъ рано зацвѣшаетъ, и такъ долго цвѣтитъ, а въ иныхъ мѣстахъ до самаго исходу не перестаетъ цвѣсти. Изъ сего, и по тому, что гречиха такъ долго на рядахъ сохнетъ, легко заключить, какое множество зеренъ ея въ полѣ остается, и сколько бы это плодъ наградило труды, когда бы разпространить лучшихъ зеренъ возпрепятствовать можно было. Путь, показанный къ сему *Экхартомъ*, очень мало имѣетъ шествующихъ. Наспавленіе его собирать гречиху безъ попрашы зеренъ поднесъ еще очень мало извѣстно, чтобы можно было щипать излишнимъ помещеніе онаго здѣсь.

Больше бы, говоришь онъ, Хозяевъ прилѣжало къ сѣву гречихи, поелику оная удобно можетъ расти на легкихъ песчаныхъ и рыхлыхъ пашняхъ, естли бы они не опасались случающагося великаго урону съ ея зернами: для того что гречиха во все лѣто цвѣтитъ, и когда наступитъ жашва, содержишя въ ней 4 доли зеренъ перезрѣвшихъ, 6 $\frac{1}{2}$ доли спѣлыхъ, 3 доли полуспѣлыхъ, и 2 доли въ четверть спѣлыхъ зеренъ; а прочія еще цвѣтущъ и не завязались.

При кошеніи сего хлѣба, изъ первыхъ 4 доль перезрѣлыхъ зеренъ половина отъ
дѣй-

дѣйствія косы обсыпается на землю; а какъ солома сего плода сохнѣвъ на рядахъ ошъ 10 дней до двухъ недѣль, въ какое время пищи часть изъ сихъ чешырей доль переспѣлыхъ зеренъ поѣдаѣтъ, а когда въ сушеніи переверотятъ рядъ на другую сторону, ошпаденъ цѣлая четвертая доля зеренъ; ибо оныя очень слабо укрѣпленно висятъ въ своихъ цвѣточныхъ чашечкахъ; естли же при томъ случится дождь, а пошому гречиха еще долѣе на рядахъ пролежатъ должна, тогда при частомъ переворачиваніи, послѣ при сгребаніи въ снопы, вязаніи, накладываніи на шѣлеги и свозкѣ въ гумно, изъ шрехъ чашей оставшихъ самыхъ спѣлыхъ зеренъ еще пропадетъ половина; почему почти всѣ Хозяева это растѣніе не любятъ. Но какъ между шѣмъ гречиха составляетъ очень нужный плодъ, и за мѣсто свое конечно преизящно платитъ, сверхъ того солома ея шаковажъ хороша, какъ сѣно, мякина очень способна скошинѣ: пошому производилъ я у себя съ эшимъ хлѣбомъ опышы, и безъ дальнихъ околичностей и издержекъ до того довелъ, что изъ всѣхъ моихъ гречишныхъ зеренъ ни одного не пропало, но вообще вошли оныя въ мою жизньницу.

Когда жатва гречихи приближается, и по прилѣжномъ разсмотрѣніи окажется, что большая часть зеренъ поспѣли, и въ своихъ содержалищахъ черноваты кажутъ-
ся,

ся, также отъ малѣйшаго шренія легко выпадають, а прочія зерна большею часью налили и побурѣли, сверхъ же того верьхи правы и цѣлыя кусты вообще начнушъ блекнуть, знакъ, что она поспѣла, и можно съ Божією помощію оную косить. На эпошъ концецъ, по мѣрѣ величины нивы потребное число мушинъ и женщинъ разспавить въ самой жаркой день, кои начали бы съ конца нивы, и захватывая гречиху горстями, выдергивали съ корнемъ, что очень легко. Каждой работникъ снабжаетъ себя занавѣскою, которой концецъ зашкнушъ за поясъ; осмыгиваетъ въ эпошъ мѣшокъ, сдѣлавшійся изъ занавѣски, концы захваченной гречихи, отъ чего всѣ годныя зерна очень легко выпадають, солому же бросають позадь себя на землю. По наполненіи занавѣсокъ, приносятъ зерна и высыпають на разоспанные простыни, другіе люди ссыпають оныя въ мѣшки, и отвозятъ домой; разсыпають, просушиваютъ часъ съ шестю переворачиваніемъ, вѣютъ потомъ и ссыпають въ житницы на сохраненіе. Такое выдергиваніе и осмыгиваніе зеренъ продолжается, пока вся гречиха будетъ снята. Солому оставляють на землѣ, пока отъ солнца высохнетъ; тогда сгребаять оную подобно сѣну въ копны, свозятъ и хранятъ къ употребленію въ кормъ скотинѣ, какъ самое лучшее сѣно. Хотя къ выдергиванію шаковому потребно много

людей, но я по опыту нашель, что оныхъ упошребляешся цѣлою половиною меньше, когда сравнишь прошиву упошребляемыхъ обыкновенно косцовъ, переворачивальщиковъ, сгребашелей и вязальщиковъ; не надобно же къ сему ни веревокъ, ни лыкъ на связку сноповъ, и наконецъ молошильщиковъ; всѣ мои зерна вошли безъ всякаго вреда въ мою житницу, и припомъ мѣрю въ десять кратъ больше обыкновеннаго вымолоту. —

Примѣчанія.

- а) При таковомъ всевозможнаго подражанія досшойномъ предписаніи можно и еще больше сократить число работниковъ. Къ выдергиванію гречихи съ корнемъ не нужна шѣлесная сила, почему въ мущинахъ, исключая надзирашеля, никакой нѣшнѣ надобности; оные могутъ употреблены бытъ въ другомъ мѣстѣ. Есѣли мало своихъ женщинъ, а гречиху нужно наскоро выбрать, можно нанять сшарухъ изъ поденной платы для эшой легкой работы. Такъ на прим. поступаемъ мы въ здѣшнихъ мѣстахъ по причинѣ великаго сѣву прося: жнушъ у насъ оное обыкновенно сшарухи, пошому что къ сѣзыванію онаго серпомъ не много пошребно силы, а дѣвки эшо время занимающся приборомъ поздняго сѣна и другими работами. Могутъ также и взрослые навичные

ные ребяшка за половинную цѣну въ наемъ пріискиваны бышь, и вмѣстѣ съ старыми къ выдергиванію гречи разсхавливаемы.

- 6) Еще шого больше произойдетъ замѣны въ людяхъ въ разсужденіи связыванія въ снопы и ношенія гречи въ копны. Хозяину нужно только приказатъ подростку впредь одну или двѣ лошади въ большія или шакъ называемыя голодныя грабли, оныя по десяшинѣ возишь, а другому мальчику или дѣвкѣ ходишь позади, и грабли временно приподнимаешь, чрезъ что солома гречишная спаскана будетъ въ кучи, и послѣ можетъ быть свезена въ гумно. Если опредѣлишь двухъ мальчиковъ, могутъ они поочередно ѣздишь, одинъ на лошадяхъ, возящихъ грабли, а другой ходишь между шѣмъ за граблями къ приподниманію оныхъ; нуженъ однако при семъ одинъ шолько взрослой работникъ, кошорой бы ходилъ позадь грабель, и закладывалъ оныя къ спаскиванію кучь, или рядовъ соломенныхъ. Сіи ряды на большихъ загонахъ должны бышь спаскиваны съ обѣихъ сторонъ въ толстой валъ, дабы шѣлеги къ навиванію соломы свободно между шаковыхъ валовъ проѣзжашь могли, и накладывашь съ правой и лѣвой стороны. Если же загоны узки, должно голодными граблями спаскивашь поперегъ загона, а пошомъ рясать.
- Часть III. Отдѣл. 2. Е ды

ды въ кучи, чѣмъ шѣлегамъ свободно можно было ѣздить вдоль загона къ накладыванію кучь.

в) Какъ солома гречишная во многихъ мѣстахъ должна служить вмѣсто сѣна, то чѣмъ она не слеглась и не намокла, надлежитъ класъ ее въ сараяхъ подъ кровлю на жердномъ потолкѣ. У сосѣдей моихъ флемингцовъ, по недоспашку въ лугахъ, и употребленію гречишной соломы зимою въ кормъ овцамъ, должно оную свозить съ поля очень суху. Они разпоряжаютъ такъ, что искармливаютъ оную до Срѣженія, а потомъ принимаются за сѣно; ибо естли давать гречишную солому овцамъ подъ исходъ зимы, когда снужа уменьшился, получаютъ онѣ отъ того болыны на брюхѣ.

г) Гречишныя зерна даются въ кормъ домовымъ птицамъ либо однѣ, или съ перемѣшкою другихъ зеренъ; но лошадямъ не должно гречихи давать инако, какъ пополамъ съ овсомъ. Онѣ ѣдятъ охотно гречиху и безъ овса, но она ихъ очень разгорячаетъ, такъ что при работѣ, а особливо въ теплую погоду, легко здоровье оныхъ повредиться отъ того можеть, также и въ смѣси съ овсомъ лучше гречиху для лошадей молошь, дабы въ пересыпкѣ шла она вся въ питаніе; а впрочемъ зерна опчасти цѣлкомъ выходятъ. Гречишная му-

мука очень же хороша въ пересыпку и свиньямъ, откармливаемымъ на убой, а особливо съ примѣсю другаго чего нибудь. Въ разсужденіи кормленія свиней гречихою, желалось бы мнѣ знать опыты другихъ разныхъ Хозяевъ, согласныль или не согласны они будутъ съ опытами сосѣдей моихъ Флемингцовъ. За нѣскольکو лѣтъ имѣвъ надобность, по домашнимъ обспояшельствамъ, проѣзжая въ Іюнѣ мѣсяцѣ чрезъ округу Флемингскую, когда всѣ спада паслись въ полѣ, на немаломъ разстояніи во многихъ спадахъ сряду не видалъ я ни одной бѣлой свиньи, но вообще черныхъ или чернопѣгихъ. Я подѣхалъ къ работающимъ на полѣ людямъ и спросилъ о причинѣ, для чего у нихъ бѣлыхъ свиней не видно. Они отвѣщствовали мнѣ единогласно, что имъ бѣлыхъ свиней держать не можно; для того что когда оныя взойдутъ на гречишное жнивье, а наѣвшись онаго придутъ къ водѣ, тотчасъ начнутъ, лишь напьются, падаютъ, болтають ногами и визжатъ; при чемъ прочія свиньи, какъ-то имъ свойственно, на шаковую свинью нападутъ съ такимъ остервененіемъ, что пасухъ отбить не можетъ, и заѣдаютъ оную до смерти. Я желалъ бы, чтобъ кто нибудь увѣдомилъ меня чрезъ газетъ, не случается ли гдѣ подобнаго. Должно это приключеніе относить зернамъ гречишнымъ, высыпавшимся на пашняхъ,

няхъ, и что оныя въ бѣлыхъ свиньяхъ больше, нежели въ свиньяхъ другихъ шерстей, кровь до безумія разгорячающъ. Почему и откармливаніе на убой бѣлыхъ свиней гречихою можешь производить шже, хоша въ меньшемъ степени; для того что откармливаніе оныхъ производишь большею часью осенью и въ началѣ зимы, когда уже холодно, при томъ же и зерна получающъ онѣ либо размоченныя въ водѣ, или мукою въ пересыпкѣ. Однако изъ сего приключенія бѣлыхъ свиней въ флемингенѣ и великой пошливости лошадей, кормимыхъ гречихою одною, заключишь можно, что здоровѣе будешь для скошавъ, когда онымъ, а особливо въ жаркое время года, не даваешь одной гречихи безъ подмѣси другихъ зеренъ въ кормъ.

д) Гречиха надлежитъ въ число шѣхъ хлѣбныхъ зеренъ, кои чрезъ многіе годы, подобно просу и спручковымъ плодамъ, безъ поврежденія отъ червей и безъ переворачиванія въ житницѣ цѣлы лежать могутъ. Почему въ урожайные годы надлежитъ оныхъ откладывать въ запасъ предбудущій; ибо въ случаѣ засухи хлѣбъ эшотъ бываетъ мало удачливъ.

е) Обдираемая изъ гречихи крупы, кои въ отличіе отъ другихъ крупъ прозываются *грешневая крупы*, составляющъ для насъ пріятную и очень здоровую

вую пищу, въ приготоуленіи разныхъ кашъ, блиновъ и прочаго. У кого своя мѣльница, тому надобно спарашься выдѣлывать изъ нее три рода крупъ, мѣлкїя, среднїя и крупныя. Послѣднїя идутъ въ домашнемъ расходѣ слугамъ, среднїя въ продажу, а мѣлкїя на господской столѣ. Есть еще самыя мѣлкїя крупы, называемыя *манными*, и получающіяся онѣя отъ крупнаго молотїя въ жерновѣхъ и просѣванїя въ разныя рѣшета, кои одно другаго чаще.

ж) Изъ гречихи выходитъ очень бѣлая мука, копорую не токмо можно мѣшать въ хлѣбопеченїе со ржаною мукою, но и изъ одной ее печь хлѣбы и блины, такъ же употреблять въ подбивки кушанья, и другїе разные поваренные расходы.

Прим. Переводч.

Квасъ изъ гречишной муки отменно прїятенъ и молодистъ, но не проченъ, и когда окиснетъ, къ употребленїю не здоровъ. Не бесполезно бы было въ нашемъ холодномъ климатѣ зимою гречишныя крупы употреблять, какъ - то большею частїю и производить; но лѣтомъ, въ разсужденїи ихъ разгорячающаго кровь свойства, оставлять, и довольствоваться крупами овсяными, а по нуждѣ просяными и яшными, а особливо рабочимъ людемъ.

АА. Сибирская гречиха, или кырлыкѣ.

Угловатая Сибирская гречка, Polygonum fataricum, Sibiricum, у Линнея, растетъ въ Сибири и отъ предшедшаго роду гречихи, кошорая въ Ботаническомъ различеніи прозывается гладкою, мало разнишя. На первой цвѣшѣ бѣлые съ брусничнымъ, и сѣмена бывають гладкія; а на Сибирской гречѣ цвѣшѣ бывають зеленоватые и сѣмена угловатыя. Каждый уголъ возвышается двумя тупыми зубцами.

Сія гречиха, кромѣ своей опчиэны, поднесъ еще заведена большею частью только въ Швеціи. Лѣтъ за 15 и за 20 испытывали оную и сосѣди мои Флемингцы, но онашь бросили и оспались при старой своей гладкой гречихѣ.

Однакожъ Сибирская гречиха имѣетъ свои преимущества, почему разводъ и поспѣвъ оной заслуживаетъ уваженіе.

- 1) Когда гладкая гречиха у насъ на теплой пошвѣ земли не урожается, и замѣсто свое не плашитъ; то Сибирская гречиха здѣсь даже и на мокрыхъ пашняхъ урожается изрядно.
- 2) Сибирская гречиха произходитъ изъ холоднаго отечества, выдерживаетъ у насъ стужу болѣе, нежели гладкая; почему можно оную ранѣ высѣвать и нѣтъ опасенія, чтобъ Майскіе морозы ее побивали. Я видѣлъ даже въ огородѣ моемъ, что послѣ умѣренныхъ зимъ, какова у насъ была въ 1783 году, зерна падалицы

ся весною взошли (*) и выросши плодъ принесли. Но по недоспашку дальнѣйшихъ опытовъ, не могу сказать, могутъ ли оныя выдерживать жестокіе морозы безснѣжныхъ зимъ.

- 3) Четвершка Сибирской гречихи шынетъ вѣсомъ $10\frac{1}{4}$ фунтовъ, а обыкновенной гладкой только $8\frac{1}{2}$ фунт. Съ выходомъ крупъ равное содержаніе. Въ употребленіи полфунта крупъ Сибирской гречи столькожъ споры, какъ фунтъ обыкновенныхъ гречневыхъ крупъ.
- 4) Каша изъ крупъ Сибирской гречихи въ варенье молокомъ или масломъ лучше сдобривается, нежели изъ крупъ обыкновенной гречихи, да и вкусомъ пріятнѣе.
- 5) Сибирская гречиха умолотиѣ обыкновенной гладкой.
- 6) Поелику сія Сибирская гречиха ранѣе можетъ быть сѣяна обыкновенной, и лошади траву ея ѣдятъ столькожъ охотно, какъ дяпловину, можно оную давать

Е 4

имъ

(*) Нѣтъ сомнѣнія, чтооь и обыкновенной гречихи зерна не могли выдержать зимы, когда только оныя сѣять подѣ зиму предѣ самыми морозами, чтооь оныя прорости не успѣли. Въ употребленіе сего не введено, потому что въ нашемъ климатѣ весенніе морозы оную побить могутъ; но я слышалъ примѣръ, что въ Скопянскомъ уѣздѣ нѣкто посѣялъ гречиху подѣ зиму; вѣсною она взошла и начала ростъ, морозомъ въ Маѣ оную побилъ; однако она отъ корня она прѣснула, и принесла изобильной урожай. Заслуживаетъ это множайшихъ испытаній.

имѣ свѣжую, въ рѣзкѣ соломенной скрошивъ. Для сего надлежитъ высѣвать оную на тучной хорошо унавоженной землѣ, на которой она послѣ перваго скошенія травы ея скоро и хорошо опростаетъ. Для дойныхъ коровъ, содержи-мыхъ въ сѣнахъ, она перемѣжкою въ зеленомъ кормѣ съ дяшловиною споль-кожъ удобна, какъ трава горошку; ибо можно говорить это съ опыту, что наша домовая скошина, какъ и человѣкъ, всегда одною пищею наскучивъ, что нужна въ оной перемѣна, и что ошъ сего скошина бываетъ здоровѣе.

- 7) Если Сибирскую гречиху сѣять не въ намѣреніи полученія зеленого корму, не нужно занимать подъ нее иной земли, кромѣ употребляемой подъ обыкновенную нашу гречиху. Она очень кустится, и сѣмень оной пошребна только осьмая доля противу обыкновенной гречихи, т. е. на шридесятую десяшину четверикъ. Посредствомъ рѣдкаго сѣянія доставляется ей свобода укушаться и разпространяться. Она можетъ вырастать выше аршина. Цвѣты этой гречихи доставляютъ пчеламъ споль-кожъ доброе пианіе, какъ и обыкновенной гречихи.

ББ. Вьющаяся гречиха.

Вьющаяся гречиха, называется инако *полосатая гречиха, дикая греча, пови-личная греча, птичій языкъ, Polygonum*
соп-

convolvulus. Господинъ *Палласъ* одобряетъ оную къ посѣву, для того что она больше сѣменъ приноситъ, нежели другіе роды, и еще то преимущество имѣетъ, что сѣмена на ней всѣвдругъ всхлѣваютъ, и пошому хорошо оную собирать.

Впрочемъ этотъ родъ гречихи составляетъ собственно сорную траву на пашняхъ; ея полосатый или лучше сказать коленчатый стволъ, съ своими сердцеобразными и острыми листьями, обвивается около другихъ растѣній. Цвѣточные колоски въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцѣ выходятъ изъ угла листового, т. е. гдѣ черешокъ листовый выходитъ изъ ствола. Сосудецъ цвѣточный бѣлый, разрѣзы онаго шупы, пыльной мѣшечекъ фиолетовой, а углы сѣменъ гладкіе.

Когда сію гречиху по намѣренію Г. *Палласа* сѣять, должно обсѣянное мѣсто ушыкать пружиками. Почему это предпріятіе не для степныхъ мѣстъ, или удобно только шѣмъ людямъ, у которыхъ земли мало, и пошому сѣвъ ихъ не обширенъ.

Прежде, нежели перейду къ описанію другихъ полевыхъ плодовъ, должно мнѣ упомянуть объ одномъ родѣ дѣланія крупы, которой для крестьянъ очень способенъ. Въ сокращеніи *Палласовыхъ* путешествій по разнымъ Россійскимъ областямъ, въ Части III, стр. 265. написано слѣдующее: Белширы и Койбалы пріугошворяютъ изъ Сибирской гречихи вкусную крупу безъ

печей и жернововъ шаковымъ образомъ : сырую гречиху всыпающъ въ деревянную кадочку, наливающъ водою, и довольно взмѣшивающъ, чѣмъ всѣ пустыя зерна всплыли, кошорыя потомъ сливающъ долой съ водою. Очищенную гречиху высыпающъ въ мѣшокъ, и оставляющъ въ ономъ часовъ на 10 и 12, отъ чего она нѣсколько разбухнетъ. Далѣе, подсушивающъ сію размокшую гречиху на желѣзныхъ сковородахъ на огнѣ, безпрестанно ворочая, пока зерна на зубахъ нѣсколько сдѣлаются хрупки; но не должно оныхъ совсѣмъ досушивать, ибо впрочемъ при толченіи въ деревянной ступѣ больше выдѣтъ изъ нихъ муки, нежели крупъ. Отъ поджариванія лузга отъ ядеръ такъ ошдѣлится, что легко будетъ ошскакивать подъ пестомъ, и сползая передуваніемъ въ рукахъ, или попрыкиваніемъ въ ночвахъ. Крупа получаетъ отъ сего прѣуголовленія нѣсколько прозрачный и желтый видъ, и вкусомъ сдѣлается прѣяшнѣе обыкновенныхъ крупъ. Тогда означенные Ташара варящъ изъ нее съ молокомъ кашу. —

Наши крестьяне, вмѣсто поджариванія на сковородахъ, могутъ поразмоченную шаковымъ образомъ гречиху сушишь въ печахъ по вынужѣннѣ хлѣбовъ, послававъ скаптеръ или веретѣе, а потомъ ошалкивать въ обыкновенныхъ ступахъ. Если же нужно сдѣлать на скорую руку не много крупъ, могутъ они шаковымъ же об-
ра-

разомъ поджаривашъ гречиху въ сковородахъ на томъ же огнѣ, на кошоромъ себѣ бѣшь варяшъ.

М. Маисъ.

Турецкая пшеничка, кукуруза, початки, называютъ шокъ-маисъ въ Россіи, инако же *Турецкое жито, Италіянской хлѣбъ*; у Линнея *Frumentum Indicum, Mays, Zea*. Эшотъ родъ хлѣба, полученный въ Европу изъ Америки, и множесвенно сѣемый въ Испаніи, Франціи, Италіи, Эласѣ и Пфальцѣ, издавна знакомъ въ нашихъ мѣстнахъ, но служилъ, такъ сказать, лишь забавою въ нашихъ огородахъ, безъ дальняго объ немъ вниманія и покушенія сѣять оный въ полѣ.

Бобылямъ, не имѣющимъ подъ собою земли, опричь огорода и коноплянника, и кошорые не могутъ содержать впряжнаго скота, очень полезно сѣять эшотъ родъ хлѣба, къ чему не нужна ни соха, ни гумно, но только заступъ да мошыха, а со всѣмъ тѣмъ оной урожается плодовиѣ всѣхъ извѣстныхъ родовъ хлѣба. Есть также опадшія сѣмейства средняго состоянія, вдовы и сироты, у кошорыхъ осталася еще по крайней мѣрѣ домъ съ огородомъ, или гдѣ нибудь уголокъ въ удаленіи отъ свѣта. Для таковыхъ, когда они ручную работу отправляютъ стыдятся, полезно занявшись сѣвомъ Турецкой пшенички, дабы могли они получишь изъ оной муку въ

часть

часть своего ежедневнаго хлѣба и прочихъ приправъ.

Сѣмена хлѣба сего бывають отчасти желшы , часью же красны, или песпры; выходящъ почашки, въ кошорыхъ одни только красныя сѣмена, а другія, въ коихъ одни только желшыя. Иногда же выходящъ почашки пѣгіе изъ желтыхъ сѣ красными зернами, иногда между оными синеващія, и шакже оливковаго цвѣшу, но всего болѣе песпрыхъ изъ красныхъ сѣ желшыми. Большою часью выходящъ зерна въ почашкахъ того же цвѣшу, какого были сѣмена. При посѣвѣ сего хлѣба лучше держашъ желшыхъ сѣменъ; ибо мукѣ изъ нихъ выходитъ видомъ лучше, нежели изъ красныхъ и песпрыхъ. *Кальмъ* полагаешъ два главныхъ рода маису, а именно, крупной и малой. Послѣдній называется и *трехмѣсячный маисъ*, пошому что въ три мѣсяца и слишкомъ отъ посѣву входитъ въ жипницу. Крупной въ опечесивъ своемъ доспигаешъ 18 фушовъ, малый же рѣдко свыше 4 фушовъ росту.

Маисъ содержищъ предъ обыкновенными нашими хлѣбными родами то преимущество, что выдерживаетъ мочливоспъ и засуху, кои у насъ въ Европѣ временемъ неурожай и дороговизну производящъ. А какъ маиса и морозы не повреждающъ (*), пошому что онъ высѣвается въ концѣ

(*) Въ прошедшую 1789 года зиму нечаянно въ одномъ углу моего огорода осталось на корняхъ нѣсколько по-

цѣ Апрѣля и началъ Мая, по сѣющіе маисъ многимъ количесвомъ всегда имѣющъ въ рукахъ средство меньше чувствовашъ неурожай обыкновенныхъ нашихъ хлѣбовъ.

Добрая средственная не слишкомъ связанная земля, содержащая въ себѣ больше песку, нежели глины, также черноземъ, кажущаясь бытъ для маису способнѣйшими.

Есть разные способы къ посѣву маиса какъ въ опчиствѣ его, такъ и въ, которые Хозяину должно вѣдать для испытанія, который выйдетъ удобнѣе по свойству и положенію его пашенъ.

Утверждающъ, что маисъ пребудетъ столькожъ мало тучной, какъ и унавоженной земли, но толькобъ была она не слишкомъ поща. (Сообразно собственнымъ моимъ опытамъ, маисъ въ огородахъ на свѣже унавоженныхъ мѣстахъ всегда росъ лучше и въ зернахъ изобильнѣе, нежели на другихъ.) Во время засухи и жаркой погоды кушны маису на песчаной худощавой зе-

початковъ маисовыхъ, въ которыхъ послѣ зимы найдены мною зерна не токмо годныя къ посѣву, но и безъ всякаго поврежденія къ употребленію въ пищу. Извѣстно впрочемъ, какова жестока была сія зима; однакожъ сіе не составляешъ еще неоспоримаго опыта, могутъ ли зерна пролежать зиму въ землѣ безвредны; ибо початки сіи были подвержены всѣмъ вліяніямъ холода на поверхности земли, но были и защищаемы своими толстыми лузгами и кожами, ихъ плотно покрывающими.

землѣ удаются лучше, чѣмъ на унавоженныхъ пашняхъ. Въ Америкѣ довольствуются, на каждой холмикъ, назначенный къ посѣву маису, вывезть не много навозу, а по сему конечно и на обширную онымъ засаждаемую пашню навозу потребно мало. (Нѣкопорые Американцы кладутъ малыхъ мершвыхъ рыбокъ въ землю между маиса вмѣсто навозу. Ни одному еще Европейцу не входило въ голову раздроблять падалище чешвероногихъ, и по кусочку подкладывать подъ маисомъ, яко самый лучший навозъ безъ всякаго сомнѣнія). Въ Америкѣ оставляютъ пашни, на которыхъ маисъ садишь, до самаго сѣву невспаханными, что на песчаныхъ поляхъ и у насъ, но не на швердыхъ, бышь можешь; ибо послѣднія довольно умягчить не можно, развъ только можно удовлетворишь сему послѣ окапываніемъ земли около кустовъ маиса, посредствомъ крюка или мошкы.

Обыкновенно сажаютъ по 3, 4 и по 5 зеренъ въ одно мѣсто, для того что нѣкопорыя изъ нихъ могутъ згнить, или сѣдены бышь пшицами и мышами. Мѣста сїи должны разстоять между собою по крайней мѣрѣ на 14 вершковъ.

Когда пашня будетъ вспахана и проскорожена, пропахиваютъ обыкновенно вдоль и поперегъ борозды въ шаковомъ разстояніи между собою, какъ требуетъ маисъ (14 вершковъ), крестъ на крестъ, что бы произошли клѣшки или холмики;

мики; въ оныхъ сажаютъ маисъ на вершокъ глубиною въ землю.

Другіе не производяшъ столькохъ околичностей, но сѣяльщику приказываютъ итти за плугомъ, и бросать зерна по бороздѣ такъ, чшобъ каждое ложилось разстояніемъ одно отъ другаго вершкахъ въ 2 или съ половиною. Пропахиваемая попомъ другая борозда закрываетъ прежнюю, въ копорую положены зерна. Пропахивая борозды узкія, нужно только борозда по бороздѣ засѣвать зернами. Когда растѣнія взойдутъ и выбѣгутъ вершковъ шести, должно часто между собою стоящія растѣнія выдергать, и оставишь оныя разстояніемъ одно отъ другаго на семь вершковъ. Попомъ должно каждой кустъ, какъ есть обыкновеніе съ бѣлою капустою, вокругъ обрыть, и землю со всѣхъ споронъ привалишь къ стволу.

Къ отвращенію мышей и пшцицъ, кои очень падки къ маисовымъ зернамъ, Американцы употребляютъ средство, а именно: они мочатъ самыя спѣлыя и полныя зерна съ вечера до утра въ холодной водѣ, въ которой прежде варены корни бѣлой чемерицы (*Verratum*, у Линнея; *Helleborus albus*, у Б.). Чемерица эта растетъ по лугамъ и на низкихъ влажныхъ мѣстахъ. Вода сія или отваръ зеренъ маисовыхъ не вредитъ, но учиняетъ, что пшцицы и звѣрки, сѣвшіе оныхъ, занемогаютъ, и тѣмъ отвращаютъ другихъ.

Слѣ-

Слѣдующій давно уже въ верхней Нѣ-
мецкой землѣ введенный образъ земледѣ-
лїя подѣ маисѣ заслуживаетъ подражаніе.
Берущъ учасокъ земли неугобженной,
выкапываютъ ямки, одна отъ другой раз-
стояніемъ вершковъ на 14 или на аршинъ
съ четвертью, кладутъ въ оныя по не-
многого навозу, кошорой за работникомъ
возитъ другой въ тѣлѣжкѣ, и бросаетъ въ
ямку опять по нѣскольку выкопанной зе-
мли, сажаютъ въ эту кучку по 3 маисо-
выхъ зерна, и зеренъ отъ 3 до 6 бѣлыхъ
бобовъ. вокругъ маисовыхъ, и засыпа-
ютъ землею. Въ 5 или шестую кучку при-
бавляютъ по одному тыквенному зерну.
Послѣ выходящія травы истребляются
вскапываніемъ мошкы, расшнїя маисо-
вы землею огребаются, приваливая оную
къ стволу со всѣхъ сторонъ, и это повто-
ряется всегда, какъ попотребуется нужда.
Таковымъ умнымъ воздѣланіемъ земля при-
носитъ широкую пользу: много навозу
сберегается, маисовы кусы служатъ вмѣ-
сто напериванія бобамъ, тыквы, коихъ
плеши шакъ разправлять должно, чшобъ
они около маису не обвивались, спелются
по землѣ, и занимая промежки, препят-
ствуютъ росши сорнымъ травамъ: Есть-
ли же кто копать не хочетъ, тогда по
вспаханной съ осени землѣ весною пропа-
хиваются борозды, и зерна маисовы съ бо-
бами сажаются посреди бороздъ, на вершокъ
глубиною, и вершковъ на 14 и аршинъ съ че-
твертью

какъ сѣять оную вмѣстѣ со льномъ. Можно оною обсѣвать по краямъ десятины въ округѣ льна, или перемѣшавъ сѣмена. Въ послѣднемъ случаѣ на четверикъ льянаго сѣмени кладется горчичныхъ зеренъ только полгартца, и вмѣстѣ высѣвается: горчица льну ни малаго препятствія не дѣлаетъ; и хошя она вѣшви свои въ стороны разпростираетъ, но не мѣшаетъ шѣмъ близъ стоящему льну ни мало, ибо вѣшви свои пропускаетъ между былокъ льяныхъ вверхъ. Еслили горчица при браніи льну еще не поспѣетъ, даюшъ оной доходить на мѣстѣ; попомъ выдержавъ, опвозяшъ домой, и вымолачиваюшъ подобно рѣпному сѣмени. Таковымъ образомъ издавна уже сѣюшъ горчицу для домашняго расхода въ приправы кушанья, и умолотъ зеренъ ея далеко превосходитъ приносимый рѣпнымъ сѣменемъ.

Подобно какъ зерна рапса или канувенника, далеко превосходяшъ рѣпное сѣмя въ выходѣ масла, такъ и горчичныя несравненно больше даюшъ масла, нежели изъ равной мѣры рѣпнаго сѣмени.

Оспающіеся жмыхи при битъе горчицы въ масло должно хранишъ за преизящное очистительное средство дойнымъ козовамъ и молодымъ шѣляшамъ зимою, къ замѣсу на расшворѣ оныхъ съ горячею водою короткаго корму (*). Въ особливости

Часть III. Отдѣл. 2. Л со-

(*) Короткой кормъ значить рѣзу, хоботъе, мякину и тому подобное.

составляющъ они лѣкарство овцамъ, когда есть подозрѣнiе, что паслись онѣ на паствѣ, содержащей вредныя травы. Въ этомъ случаѣ толкушъ жмыхи или разпирающъ мѣлко, и посыпающъ на даваемую овцамъ соль. Мука изъ сѣменъ крессъ-салату равное оказывающъ дѣйствiе.

Должно еще о горчичныхъ сѣменахъ упомянушъ въ пользу охотниковъ до кофе. Естли не много оныхъ смолотъ и сварить съ кофеемъ, бываетъ оной отъ того чистъ. Въ особливости же помогаютъ они цикорному кофе, сообщая оному нѣсколько горечи, дабы онъ получилъ не столько мягкiй вкусъ, и больше помогалъ желудку. Мнѣ знакомо изъ давнихъ лѣтъ одно сѣмейство, глава котораго подверженъ былъ обморокамъ, и потому имѣлъ опасность отъ паралича. По совѣту одного лѣкаря началъ онъ пить кофе слабой, съ горчицею смѣшанно свареной, и съ того времени отъ обмороковъ свободился. Врачебныя силы горчицы состоятъ главнѣйше въ томъ, что разбивающъ микроты въ крови и сгущенiю оныхъ препяшствуютъ.

Ж. Сафлоръ

Сафлоръ, которой и *дикимъ шафраномъ* или *подложнымъ*, (у Линнея *Carthamus fativus* или *tinctorius*), перешелъ къ намъ изъ Египта, и давно уже множественно сѣютъ его въ Эльзасѣ, на Рейнѣ и Тирингенѣ. Цвѣточные листки его употребляются красильниками, въ пользу которыхъ
про-

произведены разные удачные опыты господами *Бекманомъ* и *Пернеромъ*.

Въ деревенскомъ хозяйствѣ упошребляются цвѣточныя листки его къ приправѣ и подкрашиванію оными кушанья вмѣсто шафрану. Подмѣшивающъ же оныя въ настоящій дорогой шафранъ лавошники; но эшотъ обманъ можно узнать, вѣдая, что настоящій шафранъ долженъ имѣть шемноватый цвѣтъ, состоишь изъ шроякаго листка или на шрое раздѣляющихся волосковъ на одномъ черешкѣ; а сафлоровой листокъ раздѣляется на пяшero, и разрѣзы сіи имѣющъ меньше.

Думающъ впрочемъ, что цвѣты сафлоровы для красильнаго упошребленія нужно обирашь по утру съ росою; но оныя могутъ легко заплѣсневѣть и почернѣть, естли шотчасъ не будутъ разоссланы шонкимъ слоємъ въ прохладномъ мѣстѣ. Когда естъ солнечное сіяніе, нужно шолько разкинуть ихъ шонко на посланной простынѣ и засушить на солнцѣ. Однакожъ обираніе цвѣтовъ можетъ произходить въ всякое время дня; ибо найдено, что и въ полдни обираемыя цвѣтки не разтирающся въ пыль, когда шолько не упущено время и не засохли они сами собою, на корнѣ стоявъ. Должно по сему чаще наглядывать, и вынимать изъ цвѣточной чашечки шѣ перушки, кои имѣютъ алой цвѣтъ, а прочіе оставлять.

Естьли надобно сѣмена собирать на масло, въ ощищиваніи лисковъ должно поступать по послѣднему предписанію; для того что у сего рода цвѣтовъ пыльной мѣшечекъ всегда бываетъ сросшимся съ цвѣточнымъ перомъ, и какъ при обираниіи оныя вмѣстѣ вырываются, то послѣ не можетъ уже быть сѣменъ. Въ этомъ обстоятельствѣ цвѣтовъ обирать не должно, по крайней мѣрѣ до шѣхъ поръ, пока оныя въ чашечкѣ своей завянутъ, а сѣмена завяжутся уже и нѣсколько выроснутъ.

Когда сафлоръ посѣять на пашнѣ, хорошо прѣготовленной и очень сильно удобреной, цвѣты на немъ будутъ крупнѣе и цвѣтнѣе краскою, или получится больше и крупнѣйшихъ сѣменъ, естьли сѣвъ въ намѣреніи полученія оныхъ на масло. Сѣмена сафлоровы не очень терпятъ отъ весеннихъ морозовъ, высѣвать оныя должно сколько возможно ранѣе; почему должно пашню подъ нихъ прѣготовлять какъ подъ крупной ячмень. Весною при паханіи подъ сѣвъ пашня проскораживается однажды легко бороною, сѣмена разсѣваются, и послѣ того же бороною закрываются прилѣжнымъ заскораживаніемъ. Естьли же земля подъ сафлоръ вскапывается заступомъ, что для него еще лучше, тогда посѣянные сѣмена гладко утаптываются въ землю ногами, на каковой конецъ подвязываютъ подъ ноги дощечки. Сѣмена, за швердую свою лузгою, лежатъ нѣсколько

ко недѣль до всходу. Должно тщательнѣо сафлорѣ очищать полоніемъ, или по состоянію пашни обкапывать мошкѣю, также распѣнія, густѣо сѣящія, продергивать, чѣобѣ каждое сѣяло отъ другаго вершка на 3 и на пяшь.

По содержанію въ *Abhandlungen der Schwedischen Akademie*, В. XVII. С. 208, должно пашню подѣ него раздѣлять на гряды въ два аршина съ половиною шириною, по длинѣ каждой проводить по чѣтыре борозды въ полвершка или около вершка глубиною, сѣмена въ нихъ класть разсѣяніемъ отъ 3, 4 до 5 вершковъ, и засыпать землею; при чѣмъ напоминается, что сѣву сего поливать не должно, ибо оной не шокмо величайшую засуху сноситъ, но и лучше тогда урожаешься.

Сафлорѣ цвѣтеть въ Іюль и Августѣ, а сѣмена поспѣваютъ въ осень. Получается изъ оныхъ много и очень вкуснаго масла, кошорѣо употребляется и въ лампы.

Нѣсколько слишкомъ сказано то, чѣпо по предписанію *Рейхартѣу Garten- und Land-Schatz*, Theil IV. сушеные сафлоровы сѣволы могутъ сполькожѣ хорошо служить къ шопленію печей, какъ сосновыя дрова, и чѣпо жарѣ угольной продолжается отъ нихъ сушки; правда однако, что въ шопленіи оныя лучше соломы и жнивья.

3. *Черная капуста.*

Черная капуста (*Brassica Arvensis*) составляет родъ листовяной капусты, или синей капусты, которой сѣмена высѣваются весною. Въ первой годъ растѣнія, какъ скоро отроснутъ столько, что рукою захватить можно, влошь по землю срѣзываются, и оное всегда повторяется, какъ листы достигнутъ прежней величины, кои употребляются на поварнѣ, или въ кормъ скотинѣ. Таковымъ образомъ капуста эта оставляется зимовать, дабы весною пошла въ ростъ и сѣмена принесла. По созрѣніи оныхъ капуста выдергивается изъ корня, и далѣе поступается такъ, какъ съ рѣпнымъ сѣменемъ. Выбываемое изъ сѣменъ ея масло совершенно подобно рѣпному.

Подобно какъ *кочерыги* (иначе *хрябки*) синей капусты, кою и зеленою называютъ, осенью или въ слѣдующую весну выдергиваютъ, и сажаютъ въ особливомъ собственномъ для того выкапываемомъ ровкѣ, и сѣи высадки тогда цвѣтутъ и сѣмена приносятъ; равно и сѣи, и я не знаю, какое бы изъ масленосныхъ растѣній могло столько, какъ они, приносить сѣменъ. Всегда въ огородѣ обыщется уголокъ подъ шаковыя высадки, которыя впрочемъ надлежало бы выдергать и бросить, а оныя по означенному можно обратиться къ полученію великой пользы.

И. Солнечники.

Солнечникъ, подсолнечникъ, большой Индѣйской солнечный цвѣтъ, у Линнея Helianthus Annuus названный, по днесь служилъ большею частью лишь ко украшенію садовъ; но его сполько богатыя масломъ сѣмена дають сполько нѣжное, сладкое и вкусное масло, что оныя по сему множайшій посѣвъ заслуживають. Распѣнія сего многія опродія, а именно: съ цвѣтами сѣрогорючной или золото-желтой краски; также съ простыми и махровыми, или на иныхъ съ цвѣтами языкообразными; равномѣрно и сѣмена у нихъ бывають разнаго цвѣту, но масло изъ всѣхъ оныхъ выходитъ одинакое.

Сѣмена должно сѣять въ Мартѣ и Апрѣлѣ. Нужно для оныхъ назначить лишь гряду, освящаемую солнцемъ, и молодая распѣнія, когда оныя будутъ вершка въ три, разсадить. Далѣе пересадкою оныхъ медлить не должно, пошому что они ломаться могутъ и засыхать. Сволы, не пересаживаемые на другое мѣсто, растутъ толще и выше, разумѣя, что сидятъ они на доброй землѣ; ибо на землѣ неунавоженной сволы будутъ шонки, и принесутъ сѣменъ мало.

Свѣжими солнечниковыми листьями можно свиней кормить; но ощипывать оныя со стволѣвъ не прежде, какъ сѣмена поспѣють.

Повара также умѣютъ обращать въ пользу молодые солнечники: они берутъ сочные спволы, очищаютъ оныя, равно и мясо изъ цвѣточной чашки, и приготавливаютъ по подобію арпишниковъ.

Сѣмена солнечниковъ не въ одно время поспѣваютъ. Какъ скоро нѣсколько зеренъ въ цвѣточной рѣпицѣ созрѣютъ, нападаютъ на нихъ, oprичъ воробьевъ, многія птицы, и зерна сїи выбираютъ. Къ предваренію такового урону должно цвѣточные рѣпицы или чашки, кой часъ въ оныхъ нѣсколько зеренъ поспѣетъ, срѣзывать, привѣшивать въ застѣни въ сухомъ мѣстѣ, высушія зерна выбивать, и хранить въ мѣшкахъ такимъ образомъ, чшобъ не добрались до нихъ мыши.

Распѣнія солнечниковъ корней своихъ вдаль не проспираютъ, и оными имѣющими подобіе войлочной шкани только малое проспранство занимаютъ; почему на рыхлой землѣ можеть ихъ и умѣреннымъ вѣтромъ, а особливо дождемъ сопровождаемымъ, выворошить. По сему должно ихъ сажать либо въ зашитѣ отъ вѣтровъ, или привязывать къ палочкамъ, еспли сидятъ они врознь. А когда посажены они рядами, то съ обѣихъ сторонъ ряду вбивать колья, и къ онымъ привязывать тоненькія жердочки, и къ нимъ солнечники прикрѣплять.

І. М а к ъ.

Полнолистной огородной макъ, простой макъ (у Линнея *Rapaver somniferum*), заслуживаетъ одобреніе, яко отличное маслосное растѣніе: ибо масло изъ него безъ всякихъ приправокъ очень годно въ кушанье, да и посѣвъ онаго можно всюду производишь въ большомъ количествѣ, гдѣ шолько есть земля средспвенной доброты.

Въ сѣверной Нѣмецкой землѣ по нынѣ еще сѣютъ одинъ шолько макъ, и главнѣйше къ употребленію въ кушанье и пироги. Варяшъ отчасти и праву его вмѣсто капусты весною. Для масла же большею частію сѣютъ макъ въ южной Нѣмецкой землѣ, гдѣ въ этомъ намѣреніи и называютъ его *эльмагенъ*, ш. е. *масленной макъ*.

Можно макъ сѣять и на самой очень навозной и хорошо ухаанной средспвенной землѣ; но урожай его бываетъ лучше, еспли земля подъ него употреблена будешъ лучшей доброты, и она по причинѣ, что коренья его идушъ глубоко въ землю, будешъ вскопана засшупомъ. Когда же пашня подъ макъ будешъ шолько вспахана, то послѣ паханія подъ сѣвъ должно оную начисно выскородишь бороною. Разсѣянной по оному макъ заскораживается слегка бороною, на вскопанной же землѣ сѣмена загребаюшъ граблями. Чѣмъ мягче будешъ земля сѣя, каковъ на при-

мѣрь черноземъ, шѣмъ лучше уродится плодъ эшошъ.

Макъ сѣютъ очень рано, въ началѣ Апрѣля, а въ верхней Нѣмецкой землѣ еще въ Маршѣ, очень рѣдко, и сорныя травы изъ него выпалываютъ въ нашихъ мѣстахъ рукою, въ другихъ же мѣстахъ полоніе эшо производися какъ скоро макъ будетъ имѣть 4 лиспа, и шаковымъ образомъ посредствомъ мошыхи или крюка, чшобъ каждое растѣніе оспавалось одно отъ другаго на 3 или 4 вершка. Вычищаніе мошыхою, и кошорое всегда въ сухое время производимо бытъ должно, повторається чрезъ 4 недѣли, и еще когда нужна будетъ. Когда растѣнія сказаннымъ образомъ будутъ содержаны на просторѣ, получаютъ оныя шѣмъ больше крупными головицами усаженныхъ въшвей. Сего не бываетъ, естли макъ растетъ густо; въ этомъ случаѣ отъ тѣсношты и головицы на немъ бываютъ мѣльче.

Въ здѣшнихъ мѣстахъ макъ сѣютъ въ два время: ранній сѣвъ бываетъ въ Маршѣ и Апрѣлѣ, а поздній въ началѣ Мая мѣсяца. Оба сѣва обыкновенно выходяшъ хороши. Естли вскорѣ по посѣвѣ пойдутъ сильныя продолжительные дожди, сѣмена привлекаютъ къ себѣ много влаги, вздуваются, лопаются отъ шого и не всходятъ. А какъ здѣшнія пашни содержатъ очень рыхлой черноземъ, сѣютъ по оному макъ шакъ рѣдко, чшобъ растѣнія
на

на чешверть арш. между собою разстояли: производися это для того, чтобъ въ-шромъ оныхъ по рыхлости земли не ва-ляло; есшли же бы растѣнія стояли ме-жду собою просторнѣе, отъ множесва въшвей и головицъ сдѣлались бы шпжелѣе, и сильнымъ порывамъ въшровъ, получаю-щимъ отъ рѣдкаго стоянія растѣній сво-боду, меньше могли сопротивляться. По-ля здѣшнія открыты, и не имѣютъ за-щиты отъ въшровъ ни горами, ни возвы-шеніями.

Есть экономическіе писатели, кото-рые синій или черный макъ бѣлому пред-почитаютъ, и утверждаютъ, что онъ не шокмо больше сѣменъ носитъ, но и боль-ше масла даетъ (Reichhart L. und G. B. IV. S. 47). При семъ долженъ я напомнить, что это въ разсужденіи сѣменъ зависишь отъ выбору маковыхъ головицъ. Есшли взять головицы бѣлаго маку, кои съ наруж-ности совсѣмъ бѣлы, то сѣмена, изъ нихъ полученныя, въ урожаѣ принесутъ гораздо сѣменъ меньше, нежели синіе. Напротивъ шѣ головицы бѣлаго маку, которыя не бѣлы, но съ наружности сини, и лучше ви-домъ, всегда шрешью больше принесутъ урожаю, нежели отъ сѣменъ, въ бѣлыхъ головицахъ содержащихся. И такъ должно бѣлой макъ на сѣмена отбирать изъ си-нихъ головицъ; ибо оныя не шокмо уро-жай уравниютъ синему маку, но и къ упо-требленію въ пищу зерна ихъ лучше. Си-
нѣй

нѣй макъ въ приправахъ кушанью и пиро-
гамъ придаеиъ не хорошій видъ, хотя во
вкусъ и не имѣеиъ разношты. А поелику
у насъ лепешки съ макомъ въ нѣкошпо-
рыхъ обласняхъ, а особливо во дни Па-
схи и Пятидесятницы даже на столахъ сред-
ственнаго сосшоянїя людей, составляюиъ
родъ праздничнаго кушанья, и берешся къ
сему единственно бѣлой макъ, шо по рас-
ходу шаковому и сѣянъ его прибыльнѣе.

Когда макъ сѣянъ въ числѣ лѣшняго
сѣву, ш. е. въ паровомъ полѣ, прешерпѣ-
ваеиъ оной около времени своего послѣва-
нїя очень много оиъ воронъ, кои въ ма-
лые дни оный совсѣмъ опустошаюиъ;
есшлы же посѣянъ оной будеиъ въ яро-
вомъ полѣ между яровымъ хлѣбомъ, пше-
цы сїи до него почти не касаюиъся, или во
все не прогаюиъ. Причина шому сїя, что
вороны во все лѣшо держашся на паро-
вомъ клину, слѣдуюиъ при паханїи и двое-
нїи пару за сохою, для подбиранїя выво-
рачиваемыхъ на поверъхность червей и на-
сѣкомыхъ, коими питаюиъся. Есшлы же
на эшомъ полѣ найдутъ макъ, пользуиъ-
ся сосѣдсшвомъ онаго, и шѣмъ жаднѣе на
оной нападаюиъ, чѣмъ меньше бываеиъ
въ эшомъ полѣ паханїя, а особливо когда
во время жашвы плугъ и соха гуляюиъ.
Они разклевываюиъ еще мягкїя головыцы
маку, когда еще сѣмя молочно, и въ не
многіе дни могуиъ опустошииъ большїе
загоны, макомъ обсѣянные. Сшавяиъ въ
оп-

отвращеніе сего чучелы или пугала, наподобіе человѣка, на маковищахъ, коихъ въшпромъ шашаетъ; въшакшъ также воронъ. Однакожъ со временемъ они къ чучеламъ привыкають, и оныхъ не бояшся; почему върнѣе ошгоняють ихъ отъ маковищъ слѣдующимъ образомъ:

Взяшъ горснъ пеньки или хлопьевъ льняныхъ или поческовъ, остающихся при разчесываніи льну на пряжу, перевертѣшь оныя въ шолсшья ниченки, коими обтянушь вокругъ маку, привязывая концы къ крайнимъ маковицамъ; и чтобъ ниши сїи слабо висѣли, а не вышянулись. Естьли же загонъ великъ, то и по срединѣ въ разныхъ мѣстахъ прошянушь таковыя же ниченки. Вороны чрезмѣрно бояшся таковыхъ ниченокъ, а особливо когда въ разныхъ мѣстахъ будутъ прицѣплены хохолки изъ поческовъ, кои въшпромъ взвѣиваетъ. Послѣ воробья нѣтъ пищицы столько къ силкамъ оспорожной, какъ ворона; она весьма опасается нападать на макъ, таковымъ образомъ опушанной, щипая ниченки за поспавленные силки; равно какъ и воробьи не трогаютъ тѣхъ вишенныхъ деревъ, кои въ 3 или больше яруса опушаны будутъ синими нитками, и кои отъ зелени листовъ и зрѣлыхъ плодовъ очень опличаются.

Когда выберать макъ не доспѣлой, не шокмо оной очень ссыхается, но и вкусъ получаетъ отчаспи горькой, частью же
пра-

справяной, что нѣсколько и маслу сообщается. Можно по наружности головицъ усмотрѣть, когда маковыя зерна къ зрѣлости приближаются, а именно: начнутъ онѣ изъ бѣлаго и изъ зеленаго цвѣту переходить въ бѣлой, фѣолешовой и желтой. До таковой перемѣны должно макъ щипать совсѣмъ еще неспѣлымъ.

Макъ собираютъ двояко. Первымъ образомъ, зашвердѣвшія и засохшія головицы сламываютъ въ Августѣ со сѣбелей руками, собираютъ въ мѣшки, потомъ въ прохладномъ мѣстѣ разкладываютъ, и въ способное время вытрясаютъ. Второго образу жатва маку состоитъ въ томъ, что маковицы съ корнемъ изъ земли вытаскиваютъ, соломенными веревками связываютъ въ умѣренныя связки, и такъ домой свозятъ (*). Тамъ снимая съ возу, по связкѣ кладутъ на колодку, и топоромъ головицы обрубивъ, будылки маковыя съ корнями развязавъ, бросаютъ на скопныхъ дворахъ въ навозъ, къ умноженію онаго, или въ безлѣсныхъ мѣстахъ оставляютъ связки къ употребленію въ топливо. Обрубленныя головицы, просушиваютъ въ сараѣ, и потомъ вытрясаютъ. По первому образу собиранія маку остаются еще недоспѣлыя головицы на полѣ, пока доспѣютъ и засохнутъ;
по

(*) Разумѣется глухой макъ, а не тотъ, котораго головицы швертамы.

по другому же способу въ одинъ разъ снимаются спѣлыя и недозрѣлыя головки вдругъ, отъ чего производитъ поврежденіе въ доброшѣ вкуса макового. Напрошивъ работа за макомъ вдругъ оканчивается, и въ одинъ разъ снимаются съ маковища и спелые и головки. Поелику крашчайшій пушъ длинному долженъ быть безъ сомнѣнія предпочитаемъ, то въ послѣднемъ случаѣ должно недозрѣлыя головки отбирать и связывать въ особливый связки; и если не лѣзя уже оставить незрѣлыхъ головокъ доспѣшь на полѣ, то онѣя досушивъ дома, макъ изъ нихъ выпрясать особливо и употребить въ кормъ пѣвчихъ пшичекъ, въ клешкахъ сидящихъ.

Нѣкошорые Хозяева сломанные маковыя головки для поспѣшности обмолачиваютъ на гумнѣ; однакожъ поступка сего я не одобряю; ибо, что выигрывается во времени при молотѣбѣ, опять пропадаетъ въ медленности вычищанія зеренъ. Теряется же при семъ очень много зеренъ; лузга головокъ цепями раздробляется въ мѣлкѣя часпицы, и къ онѣмъ много зеренъ прилипаетъ. Почему выпрясаніе маку молоченію онаго должно быть далеко предпочитаемо, хотя бы сборъ зеренъ припомъ и не шакоемъ много былъ.

Основательно то, что собираніемъ маку съ поля поздать не должно, опчасти по тому, что маковище должно очищать для другаго дѣла, часью же что

на

на ономъ скоро заводяшся крысы и мыши, кои макъ поѣдають. Когда же работниковъ за соспоющею жатвенною порою къ собиранію маку употребить будетъ не можно, должно опрягать на сію работу сипарухъ, или нанимать шаковыхъ, и кои за самую дешевую плату оную очень хорошо исправить могутъ. Можно присоединить къ нимъ и робятокъ, кои также подъ присмотромъ ихъ работу эту очень порядочно отправляютъ.

Въ нѣкоторыя годы выходятъ нѣкоторыя головки бѣлаго маку не свѣтло-бѣлыя, но смугло-бѣлыя, или какъ бы вялыя. Зерна изъ шаковыхъ должно вытрясать въ особливую посуду и опредѣлять для стола домовыхъ служителей. Зерна сіи имѣють не шокмо правянистой вкусъ, копорымъ и доброта хорошаго масла повреждается, но и скорѣе въ оныхъ заводяшся черви. Есѣли сіи зерна попадутъ въ прочей макъ, заводяшся и въ ономъ червячки, сообщающіе зернамъ горьковатый вкусъ.

Выпрясенный макъ ночвами, на открытомъ воздухѣ, гдѣ вѣтръ провѣваетъ, до шѣхъ поръ спалывается, пока весь соръ отъ него отдѣлится, и не останется никакой пыли между зеренъ. Потомъ высыпаятъ его въ амбаръ на полу, въ копоромъ нѣтъ скважинъ, тонкимъ слоемъ, почасу переворачивають, и на послѣдокъ въ мѣшкахъ, есѣли оной очень
сухъ

сухѣ, въ бочкахъ сохраняющѣ. Соляныя бочки къ сему не годящяся, потому что удерживающѣ въ себѣ нѣчто соляной влажнѣсти, отъ чего макъ плѣсневѣетъ, горкнѣетъ, и поѣданію отъ червей подверженъ бывающѣ. У кого маку не слишкомъ много, рассыпающѣ оной тонкимъ слоемъ по чистымъ корытамъ и ночвамъ, и до тѣхъ поръ почасту взмѣшивающѣ, пока готовъ будетъ къ ссыпанію въ бочку.

Макъ на сѣмена лучше хранить, не выпрясая въ *лучшихъ синеватаго цвѣту головицахъ*. Избирающѣ къ сему самыя крупныя, у оныхъ нѣсколько сѣбелей, которыми связывающѣ въ пучки, и вѣшавъ на сѣбну къ потолку до весны, когда оныя выпрясающѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть обыкновеніе сѣять между макомъ морковь, копорая на вскапываемой засѣвомъ землѣ хорошо удастся: макъ выдергивающѣ еще въ Августѣ, и моркови останетъ еще 3 недѣль росши. Разумѣетъ само по себѣ, что сего сѣву производить не можно тамъ, гдѣ изпрѣбленіе сорныхъ травъ производится вскапываніемъ мошкы. Таковымъ же образомъ съ выгодою сѣющѣ съ макомъ сочевицу, копорая однако обыкновенно ранѣе маку поспѣвающѣ, и потому прежде выдергиваема быть должна руками.

Изъ всѣхъ Имперскихъ земель поднесъ множествениѣе на бишье масла сѣющѣ маку въ Швабіи и Баденѣ, и

Часть III. Отдѣл. 2. М въ

въ оныхъ странахъ, равно какъ въ Эльзасѣ и Пфальцѣ, гдѣ шакже много маслосносныхъ растѣній сѣютъ, употребляютъ оное на приправу кушанья. Во Франціи же обыкновенно мѣшаютъ маковое масло съ Прованскимъ, и продаютъ за послѣднее, для того что за великимъ расходомъ сего бываетъ не достаточно. Въ Пфальцѣ изъ давнихъ временъ есть обыкновеніе въ часть маку, на бишье масла опредѣляемую, четвертую долю мѣлко изрубленныхъ Борсдорфскихъ яблокъ подмѣшивая, выгнеша въ холодномъ прессѣ. Масло получаетъ отъ того пріятный вкусъ, которымъ можешь спорить съ лучшимъ Прованскимъ масломъ, когда нѣсколько времени постоитъ и опляжешь. Оное въ приправѣ кушанья спорѣ деревяннаго масла, потому что жирнѣе. Когда часть сего масла опята будетъ холоднымъ выбиваніемъ, остальной жмыхъ добивается поджаривъ. Послѣднее это масло употребляютъ къ сженію въ ночникахъ.

Когда посѣвъ и хожденіе за макомъ произведены будущъ по вышеозначенному предписанію, и зерна будутъ совершенно спѣлы то изъ полуосмины или Берлинскаго шефеля легко отъ 11 до 12 массъ (въ ведрѣ Рос. почти 11 массъ) масла, больше и меньше. Не рѣдко случается, что живописцы покупаютъ маковое масло дорого цѣною, по великому употребленію ими онаго для масляныхъ красокъ, для

по-

того что сїи на ономъ скорѣе сохнушѣ, и не такъ удобно желкнушѣ.

Въ странахъ, гдѣ маковыя похлебки составляютъ обыкновенную пищу народу, могутъ остающіеся при выбиваніи масла жмыхи съ выгодною для шаковыхъ похлебокъ употребляемы быть; для того что приготоуовленіе изъ нихъ кушанья самое скорое: ибо нужно только, разпереть жмыхъ на горячей водѣ, и сполько сколько для обѣда довольно. Проспаго народу дѣши дѣяшъ жмыхи сїи вмѣсто лакомства. Въ странахъ же, гдѣ употребленіе маковыхъ суповъ не обычайно, жмыхи составляютъ здоровой и пишапельной кормъ для всякаго скоша, а особливо молодымъ агняшкамъ.

К. Дальнѣйшіе роды маслоносныхъ растѣній.

Есть еще многіе роды растѣній, изъ сѣменъ коихъ масло выбивать можно, какъшо конопля, ленъ (*), пыквы, табакъ и проч. о разводѣ коихъ въ своемъ мѣстѣ описано будетъ. Изъ пыковыхъ сѣменъ выходитъ столько нѣжное масло, что совершенно вкусомъ уподобляется миндальному, и за оное почтено быть можетъ. Сѣмена Азіатскаго или Турецкаго табаку также даютъ сполькожъ хорошо горящее и вкусное масло, а особливо когда оное

М 2

пре-

(*) О коноплѣ описаніе смотри пятой Часті сего сочиненія во второй главѣ ошдѣленіе 25); а о ленѣ въ той же главѣ ошдѣленіе 24).

прежде употребленія подварено будетъ. Г. Профес. *Боровски* по своимъ собственнымъ опытамъ извѣщаетъ о пользѣ сѣменъ сего табаку слѣдующее: Сѣмена сїи дають свѣтлое, чистое, преизрядное масло, прїятнаго запаху и вкусу, но о вредности употребленія коего должно утвердить опытами, потому что табакъ надлежитъ въ классъ наркотическихъ растѣній; почему и въ сѣменахъ его можетъ быть участіе опаснаго сего свойства; хотя съ другой стороны извѣстно, что въ другихъ выбиваемыхъ маслахъ, какъ-то маковомъ, горькоминдальномъ и горчичномъ свойства растѣній оныхъ не содержишя. — Для фабричнаго и хозяйственнаго расхода масло это неподобно, какъ-то испыталъ я оное въ мыловаренїи, которое вышло масляно, не твердо, очень мылко, и можетъ быть очень полезно къ мытью, а особливо очищенію волны, а по сему свойству очень выгодно для фабрикъ. Съ пошашемъ и известіемъ мыло это выходитъ нѣсколько зеленоватымъ; напрошивъ со щолокомъ изъ воды и извести совершенно употребляется бѣлому Французскому мылу. Помянутый Г. *Боровски* увѣдомляетъ еще, что сѣменъ сихъ можно собирать множество; у него засѣено было сѣменнымъ табакомъ земли 2 угра 53 квадратныхъ рушъ и 12 квадратныхъ фушовъ, щияшая во 180 квадратныхъ рушъ угра (въ Россійской десятинѣ шаковыхъ угръ безъ ма-
ла

ла три); собралъ онъ съ сего мѣста 3 чешверши съ половиною сѣменъ и въ каждомъ чешверикѣ въсу было по 32 фунта. Далѣе говоришь онъ, что изъ каждого чешверика выходило масла фунтовъ по 5, по 6 и больше, елики только въ бѣлье неисправности не случилось. Сравни съ симъ сочиненіе сего IX. Часть, въ должностяхъ Хозяйки, гдѣ также объ этомъ маслѣ упоминается. Сообщается же здѣсь наставленіе о выбиваніи масла изъ слѣдующихъ древесныхъ плодовъ:

1) *Грецкіе орѣхи*. Малая область Дофинская, и въ оной Маркизство Боюмское выславляетъ таковое множество масла изъ грецкихъ орѣховъ, что почти невѣроятно кажется. Вкусъ сего масла, пока оно еще свѣже, превосходитъ лучшее деревянное масло. Изъ пуда сихъ орѣховъ нерѣдко получаютъ болѣе половины вѣсомъ масла.

2) *Лѣсные орѣхи*. Масло сихъ орѣховъ также изъ лучшихъ нашихъ маселъ, и далеко превосходитъ деревянное масло сладостію и пріятностію. При выгнетаніи выходитъ масла въ половину вѣсомъ прошиву орѣховъ.

3) *Липовые орѣшки*. Плодъ липовый даетъ очень здоровое и предъ всеми другими родами чрезвычайно вкусное масло. Изъ лозги вылущенные ядра даютъ прошиву себя по крайней мѣрѣ въ половину вѣсомъ прекраснаго чистаго масла: оно

отливаетъ въ желшину лимоннаго цвѣту, и кто онаго разъ ошвѣдаетъ, шотъ будешъ презираешъ лучшее Прованское масло.

4) *Буковые орѣхи*. Плодъ краснаго буку даетъ также изобильно вкуснаго масла, но оное не можешъ долго сстоять, не получивъ оспроты. Оное имѣетъ въ себѣ какъ бы шумство производящее свойство; почему не всякъ онаго можетъ употреблять шаковоежъ количесво, какъ другихъ маслъ, безъ подмѣси. Обстоятельное о выбиваніи сихъ маслъ смотри во второй половинѣ сего сочиненія Частъ IX, глава V, съ ошдѣленія 12) по букву Б.

Но какъ по выше упомянутому, кромѣ описанныхъ маслоносныхъ растѣній, коихъ посѣвъ заведенъ отчаспи больше, отчаспи меньше, могутъ многія къ выбиванію масла употреблены бытъ, одобряю я изъ шаковыхъ преимущественно впрочемъ ненавидимую у насъ траву сурепицу.

Земледѣльцы подъ *сурепицею* (*Federich*) разумѣютъ два растѣнія, кои въ разсужденіи времени своего цвѣтенія, въ видѣ листовъ и сѣменъ довольно между собою сходствуютъ, однакожъ между собою различны, но только въ разныхъ поляхъ шотъ и другой родъ между собою больше или меньше смѣшанно растутъ. Одно изъ сихъ растѣній есть *настоящая*, а другое *подложная* (*) *сурепица*. У Бошаниковъ разли-

(*) По просторѣчію *незаправская*.

различаются оныя подѣ слѣдующими названіями:

а) *Настоящая сурепица, пашенная рѣдка*, *Rhaphanus Rhaphanistrum*, у Линнея. Растѣніе это, кромѣ спручковъ своихъ, всюду при осязаніи мохнато и шершаво, пускаетъ волокнистый корень, имѣющій врѣзку въ себѣ почти до половины углубленную, листья на рѣпу сходившіе, коихъ ушки охватываютъ спволъ попеременно, съ врѣзкою и разной величины; послѣдній бываетъ самый крупный и яйцеобразенъ. Спволъ по добрѣ земли можетъ вырастать вышиною до двухъ фушовъ или около 14 вершковъ, и раздѣляется на нѣсколько вѣтвей. Стебель и вѣтви снабжены рѣдкими листочками съ врѣзкою, а къ верху цѣльнымъ и только одинъ разрѣзъ имѣющимъ листомъ, на концѣ же цвѣточнымъ колоскомъ. Цвѣты развертываются медленно, колосокъ отъ часу длиннѣетъ, и видимы бываютъ на одномъ спручкѣ какъ завязавшіеся спручки, такъ разцвѣтшіе и еще не развертывавшіеся цвѣтки. Листки цвѣтовъ бываютъ либо желты, или бѣлы, прочерчены синеващою жилкою. Послѣ цвѣту производящіе шонкѣ, закрюченные и какъ бы рожкомъ оканчивающіеся спручки состоятъ изъ четырехъ и шести различныхъ усуповъ или коленцовъ, и въ каждомъ таковомъ опдѣлѣ лежитъ по одному кругловатому сѣмечку. Таковымъ

М 4

обра-

образомъ кажется, что каждой спручокъ состоишъ изъ многихъ вмѣстѣ составленыхъ; также и лузга спручковъ состоишъ не изъ двухъ кожищъ, и по длинѣ своей не раскалывается.

Когда расшѣніе сурепицы либо само собою на пашнѣ засохнешъ, или скошенная обще съ яровымъ хлѣбомъ на рядахъ отъ солнца высушишся, потомъ спрыснута будешъ дождемъ, и опяшъ высохнешъ, спручки отъ стеблей ошпадаюшъ, и оспаюшся лежащими на пашнѣ. Еслили то случишся, пашня онымъ будешъ обсыяна лѣшъ на десять или больше, такъ что хощя бы и не сѣено было на оной яроваго хлѣба, сурепица всегда будешъ росши. Спручки сїи очень шверды, и пошому могушъ многіе годы въ землѣ лежашъ или на поверхности оной, пока размякнушъ, и сѣмена изъ нихъ продраться могушъ. Когда же сѣмена этой сурепицы собирать на масло, должно спручки сїи разослать на шокъ шонкимъ слоемъ, и какъ высохнушъ, выбивашъ изъ нихъ сѣмена цѣпами. Въ нѣкопорохъ мѣстахъ Нѣмецкой земли называюшъ это расшѣніе *Knoten-Federich*, ш. е. *узлистая сурепица*; пошому что сѣменные содержища въ спручкахъ подобно узламъ на шуркѣ одно за другимъ слѣдушъ. При молодѣбѣ яроваго хлѣба, пошому что прикрываетъ ихъ солома, не всякой спручокъ бываетъ цѣломъ раздробленъ, и по-

пошому спручковъ сихъ много оспаеся въ яровыхъ зернахъ, кои однако ошъ сѣменнаго хлѣба очень удобно ошдѣлишь можно, наливая сѣменной ячмень или овесъ въ кадкѣ водою. Спручки всплывающъ на поверхность, и славливаюшся рукою или щѣдилкою.

6) *Не настоящая или подложная сурепица, пашенная горчица съ многоугловатыми коленчатыми гладкими стручьями, полевая горчица, Sinapis arvensis, у Линнея.* Расшѣнїе это надлежитъ къ горчичному роду; опличающъ оное ошъ насіюющей сурепицы посредствомъ цвѣточныхъ листовъ, кои всѣ одинакой желтой краски; шакже и коленчатый его спручокъ не раздѣленъ на дѣйствишельныя коленца. Около 14 вершковъ вышиною растущій шароховатой въ осязанїи спволъ его раздѣляется на вѣшви, попеременно расшущія, и снабженъ шакже попеременно сидящими, почти сплошнo къ спволу приросшими, яйцеобразными, иногда сердечкомъ, шупыми, кругловатыми, съ круглою вырѣзкою, рѣдко цѣльными, и нѣсколько моховатыми листьями. Спволъ и вѣшви оканчивающся длинными рухлыми цвѣшными колосками. Цвѣшки совсѣмъ желты. Спручокъ больше гладокъ, нежели мшисѣ, коленчатъ, и длиннѣе своего двуугольнаго, роговатаго нако-нечника или продолженія спручка. Продолговатый двух - шелущный спручокъ раз-

верзается очень скоро, и сѣмена изъ него разсыпаются по полю, когда засохнешь. Малѣйшій дождь принуждаетъ его разверзаться.

Сѣмена обѣихъ шеперь описанныхъ сурепицъ совершенно сходствуютъ къ рѣпному сѣмени какъ въ добротѣ, такъ и количествѣ выходящаго изъ нихъ масла.

Въ нѣкоторыя годы бываетъ множество сурепицы въ ячменѣ и овсѣ, и сѣмена ея вмѣстѣ вымолачиваются съ сими хлѣбами. Можно ошдѣлить оныя въ шаковой грохотъ просѣвая, въ сѣйки бы кошараго шолько сурепичныя зерна проскакивали. Таковымъ средствомъ ошъ каждого чешверика ячменю или овса можно иногда ошдѣлить больше гарница сурепичныхъ сѣменъ къ выбиванію масла. Въ нѣкошорыхъ мѣстахъ Нѣмецкой земли благо-разумные крестьяне эшо очень знаютъ, и сурепичное масло употребляютъ въ смѣсь съ дегтемъ, для соспавленія доброй коломази, также и къ сженію въ ночникахъ.

Во второй половинѣ сего сочиненія, IX Часъ Гл. V буква Б, приложено наставленіе, какимъ образомъ приближившуюся къ зрѣлости сурепицу изъ яроваго хлѣба выдергивать, когда оной будетъ больше самаго хлѣба. Складываютъ оную пошомъ въ кучу, чтобъ въ ней разгорячилась, и зерна бы доспѣли, какъ о шомъ прежде о рѣпномъ сѣмени говорено было; одна-
кожъ

кожѣ при семѣ должно разсуждать, не превзойдешъ ли вредѣ въ пошашиваніи хлѣба пользу, получаемую отъ сурепичнаго сѣмени; по крайности, выдергиваніе сурепицы должно такъ быть производимо, чтобѣ выдергивающіе поочередно шли прямыми дорожками, а не збродомъ, и идущій бы, по одному слѣду спуская, выдергивалъ сурепицу во первыхъ съ права, потомъ съ лѣва. Въ Лифляндіи употребляютъ къ сему длинныя и легкія скамейки, кои въ хлѣбѣ спавяшъ, и съ оныхъ сурепицу или иныя сорныя травы выдергивающъ. Входяшъ на нихъ къ тому опредѣленнымъ ребяшка, и ставъ на колѣна, или легши бокомъ, сурепицу выдергивающъ. Таковымъ образомъ ячмень оспанешся безъ поврежденія, и только подъ ножками скамеекъ не много подавишся.

А. о выгнестаніи масла.

Можно въ доброшѣ и количествѣ масла очень много потерять, когда съ выгнестаніемъ онаго обходишся не по надлежащему. Не можно въ шѣхъ сѣранахъ, гдѣ начинающъ прилѣжашъ къ посѣву масленосныхъ растѣній, обѣщашъ себѣ надлежащаго успѣха, когда въ нихъ будешъ ошчасти не достаточествовать въ масляныхъ станахъ, частью же оныя будутъ такъ учреждены, что не все въ масляныхъ зернахъ находящееся масло будешъ выгнестася, а при томъ оное будешъ выходишъ

ходишь не таково, чтобы могло быть употреблено вмѣсто лучших иностранных масел, и тѣмъ вывозъ денегъ изъ государства за чужое масло былъ бы удержанъ. Въ разсужденіи сего каждый деревенскій Хозяинъ долженъ имѣть свободу заводить маслобойни и масляныя мѣльницы; ибо, когда бы построило оныя государство, и составило изъ него принужденіе, должно бы идти въ это тотчасъ препоною къ разпространенію изобрѣшеній: потому что, кто бы старался снать о размноженіи такового произведенія, онъ котораго бы прибыль долженъ былъ дѣлишь съ маслянниками. Не сдѣлано бы было помощи въ этомъ обстоятельствѣ и тѣмъ, еслибы закономъ постановлено было мѣльникамъ, по скольку должны они выбивать масла фунтами или мѣрою изъ четверти сѣменъ. Въ такомъ случаѣ Хозяинъ масляныхъ сѣменъ былъ бы подверженъ мѣльникову плутовству, которой всегда бы нашелъ что нибудь сказать противу доброты масляныхъ сѣменъ, дабы прикрыть обманъ свой. Главное можешь въ этомъ случаѣ сослаться въ томъ, что мѣльникъ никогда не дастъ Хозяину масла въ надлежащей добротѣ, или какъ говорится, настоящего товарнаго, и тѣмъ лишишь продавца многаго въ цѣнѣ масла; умалчивая о томъ, что жмыхи масляные составляютъ важную статью для скопководства, а изъ оныхъ мѣльники ошчаси могутъ уша-

ушайвать по нѣскольку, частью же подмѣшивать въ нихъ постороннихъ вещей къ дополненію еѣсу или величины жмыха. Далѣе, хощя правда и то, что государственный казна не выдаетъ денегъ на поспроеніе новыхъ мѣльницъ, а сыскиваются мѣльники къ поспроенію оныхъ на собственное иждивеніе, но выговаривающъ право, чтобы масла не били нигдѣ, кромѣ ихъ мѣльницъ; однако чрезъ это, какъ выше сказано, изобрѣшеніе и разпространеніе экономіи поощрено не будетъ. Кажется мнѣ, что и я замѣнилъ, что въ тѣхъ только Имперскихъ странахъ процвѣтаетъ посѣвъ рѣпного сѣмени, въ которыхъ нѣтъ откупныхъ казенныхъ маслобоенъ. Равномѣрно, какъ изъ самаго же сего общепоясельства выводиться должно, что въ тѣхъ мѣстахъ Нѣмецкой земли самая лучшая мука находится въ продажѣ, гдѣ мѣльницы вольныя, и самая негодная тамъ, гдѣ оныя на откупѣ съ исключительнымъ правомъ; ибо послѣднія въ правахъ своихъ удостовѣрены, и не имѣющъ нужды привлекашь себѣ удовольствореніями помольщиковъ. Гдѣ же есть старинныя откупныя мѣльницы, тамъ въ основаніи изъ правъ ихъ ничего не упадетъ, когда новыя мѣльницы мучяныя или масляныя заводятся; пошому что нынѣ число народу больше, нежели было тогда, какъ оныя поспроены, и оное будетъ съ часу на часъ прибавляться. Что же

же на сихъ спаринныхъ ошкупныхъ мѣльницахъ нынѣ болѣе бываетъ помолу, нежели за 50 лѣтъ предъ симъ, видимо по изъ произшедшаго послѣ того времени разводу каршофелей; ибо съ тѣхъ поръ, какъ проспой народъ сшалъ тѣснѣ каршофели, замѣняетъ по крайней мѣрѣ шесшую часть хлѣба, слѣдственно каждой поселянинъ мѣлетъ хлѣба на муку меньше, а мѣльницы сіи подрыву не шерпятъ.

АА. *Описаніе масляной мѣльницы.*

Не токмо Хозяинъ, желающій въ деревнѣ своей построить масляную мѣльницу, долженъ знать, какъ оную лучшимъ образомъ разположить; но и тѣмъ, кои на таковыхъ мѣльницахъ масло свое бить желаютъ, должно о хорошемъ усроеніи оныхъ имѣть поняшье, и такъ ли оныя сдѣланы, что все масло, содержащееся въ зернахъ, выбивать могутъ: ибо есть мѣльницы, на которыхъ изъ зеренъ почти цѣлая треть масла невыбитымъ остаётся, что происходитъ отъ непорядочнаго усроенія масляныхъ мѣльницъ. Сверхъ того маслобойники, имѣвъ у себя хорошую масляную мѣльницу, должны разумѣть, какъ выгоднѣе съ выгнетаніемъ масла обходиться должно. Между новѣйшими домоводства учителями *Экхартъ* подалъ намъ о таковыхъ мѣльницахъ лучшее наставленіе, главное содержаніе котораго состоитъ въ слѣдующемъ:

Ма-

Масляныя мѣльницы могутъ бытъ приводимы въ движеніе водою или лошадьми. Въ послѣднихъ бываетъ по два въ высокомъ ящикѣ поставленныхъ большихъ и тяжелыхъ жернова, кошорые на кругломъ изъ песчаного камня смазанномъ поду или поддонкѣ масляныя сѣмена обдираютъ, и приводятся въ движеніе ворохомъ, въ кошорой впрягаются лошади. Водяныя маслобойни приводятся въ движеніе водою, и опалкиваютъ сѣмена песками въ толстыхъ дубовыхъ ступахъ. Понеже дѣйствіе движимыхъ лошадьми мѣльницъ не таково, шо водяныя онымъ предпочитаются. Онѣ заслуживаютъ и по тому преимуществу, что водою движется большая гнешовая долбня, кошорою масло изъ жмыха лучше и легче выгнешася, а въ ручныхъ и лошадьми движимыхъ маслобойняхъ выбиваютъ масло люди, дѣйствуя руками.

При закладываніи водяной маслобойни должно прежде разсмотрѣть, не можетъ ли произойти недоспашку въ водѣ, дабы побольше въ шолчѣ песковъ, и по крайней мѣрѣ десятъ или двенадцать подняло. Пескы должны бытъ изъ хорошаго молодого дубу или буковаго дерева; колода, въ кошорой ступа дѣлается, изъ толстаго дубоваго дерева брушеного и гладко оскобленного. Эша колода, кошорая болѣе всего вытерпливать должна, бываетъ въ доброй аршинъ толщиною, и по крайней

ней мѣрѣ въ три или четыре сажени длиною, при чемъ спроущій плошникъ долженъ шпателью понуждаемъ бышь, чпобѣ ямы спупныя съ одной спороны, гдѣ поворачиваніе сѣменъ производишь, прилѣжно выемкою окачивалъ, дабы, когда песъ къ другой споронѣ прямо упадушь и сѣмена разполкушь, съ выкаченной другой спороны оныя шопчасъ къ другой споронѣ сами собою насыпались. Есшьли же ямы спупныя со всѣхъ споронъ вынуты будушь прямо, а вода будетъ либо мала, либо велика, то сѣмена ко всѣмъ споронамъ шолько прижмутся, и песъ будетъ ударяшь лишь по пустому мѣсту. Чрезъ это произойдетъ напрасная попраша времени, половина сѣменъ останешся цѣлкомъ, и половина масла въ жмыхахъ; а мѣльники, бьющіе масло, обыкновенно извиняюшь себя говоря: сѣмена плохи.

Поелику въ описанныхъ шеперь ступныхъ ямахъ на днѣ кладушь желѣзные листы, подобно какъ въ бумажныхъ мѣльницахъ, также на песъ насыживающіяся желѣзныя бушматы или накопечники; совѣшую, чпобѣ оныя дѣлашь довольно толсты, и не изъ хрупкаго желѣза: впрочемъ принуждено будетъ безпрестанно чинить.

Такъ называемыя *проушины*, въ которыхъ песъ продешы, обще съ песами лучше всего дѣлашь изъ бѣлаго буку. Нѣтъ дерева, къ тому способнѣйшаго, какъ
сѣе;

сѣе, пошому что оно не разгорячается. Такъ называемыя *ладони*, коими песшы приподнимаетъ, дѣлаются изъ молодаго хаинъ-буку (кленъ равно служишъ), для того что иное дерево въ короткое время сширается. Великую сосшавишъ то погрѣшность, когда для шаковой малоспи, какова перемѣна ладоней, дѣйствиѣ толчеи ошпанавливать и не получаешь прибыли.

Сковорода, или *поддереваень*, должна бышь велика, сдѣлана изъ мѣди, и довольно глубока, чтобы сѣменамъ разшрашы не происходило. Не худо же на главномъ валу дѣлать малое колесо съ зубцами и насаживаешь оно шамъ, гдѣ песшы кончащя, которое приводило бы въ движеніе малой легонькой валикъ, на которомъ висяшъ при шакъ называемыхъ *стопрожка*, кои ошалкиваемыя сѣмена сами собою взворачивающъ, и къ чему самъ мѣльникъ времени имѣшь не можешъ. Когда сѣмена не взмѣшиваешь со шщаніемъ, будущъ оныя въ одномъ мѣстѣ слишкомъ сухи, въ другомъ слишкомъ влажны. Главное дѣло состоишъ въ томъ, чтобы съ самага начала примѣчаешь, по надлежащему ли маслбойникъ съ оными обходится: цѣлая четвершая доля масла можешъ ошпаться въ зернахъ, когда оныя не довольно будущъ смочены. Обыкновенная мѣра воды на полуосмину сѣменъ восемь мѣрокъ, коихъ въ ведрѣ Россійскомъ

Часть III. Отдѣл. 2. Н один-

одиннадцать, которая при толченіи большею частью изъ спунъ вылетаетъ паромъ, прочая же остаётся въ лузгѣ и жмыхѣ, по выгнѣшеніи всего масла.

Въ разсужденіи *жмыховъ* наблюдать должно, чѣмъ дѣлать оныя не больше кирпича и безъ чѣтверти въ вершокъ толщиною. Толщиною валяющіяся они обыкновенно въ три чѣтверти аршина, изъ какихъ толстыхъ жмыховъ не возможно масла начисто выгнестъ; напрошивъ изъ малыхъ жмыховъ оное легко выходитъ, да и въ работѣ припомъ оспановки не посѣдуетъ: лишь попотребно вмѣсто одного волосянаго мѣшка имѣть два. Оба оныя по длинѣ своей наполняются, кладутся рядомъ въ гнѣшовую ямку, накладывающіяся на нихъ доска и тотчасъ выпекается изъ нихъ масло, кой часъ клинъ большею долбнею будетъ загнанъ. Всего больше должно стараться учредить, чѣмъ маслостойникъ со щпаніемъ прѣуправлялъ свои *частыя* и *рѣдкія* волосяныя ситки, отъ чего вся выгода или убытокъ въ битье масла зависить. Когда сїи ситки будутъ толстошишны и рѣдки, масло будетъ выходить густо и мупно, отъ чего въ бочкѣ на цѣлую пядень опляжетъ подонковъ, почему никто такого масла покупать не будетъ, или только за половинную цѣну. Когда же, по Голландскому обычаю, ситки сїи дѣлаютъ шонки и часты, масло потечетъ такъ чисто и свѣтло, какъ виноград-

градное вино. Для сего маслобойникъ долженъ имѣть у себя всегда въ запасѣ дюжину шаковыхъ волосянокъ или сипокъ.

Количество масла изъ полуосмины рѣпного сѣмени, когда взявъ оное очень чистое, не можешь проспираешь выше 18 мѣрокъ или 36 фунтовъ; почему маслобойнику на каждую бочку масла въ 5 ведръ должно давать полшоры чепверши сѣменъ, Обыкновенная деревенская бочка въ верхней Саксоніи, Берлинскою мѣрою, содержишь въ себѣ 110 мѣрокъ, или 220 фунтовъ; въ исправности мѣры въ бочкахъ должно имѣть спараніе, чѣмобъ онъ покупателей не произошло жалобы. Понеже маслобойня день и ночь дѣйствуетъ, и при томъ работа безпрестанно и такъ проворно происходитъ, что одному человѣку больше 12 часовъ выдержавъ не можно, должно оному давать подростка въ помощники, копорой бы маспера чрезъ 12 часовъ смѣнялъ. Сѣмена мѣльнику еженедѣльно выдаются мѣрою на цѣлую недѣлю; прошиву оной долженъ онъ масло отдавать исправно бочками, кои, какъ скоро копорая наполнится, относясь въ амбаръ, дабы мѣспа въ мѣльницѣ не занимали. Лучшее время къ продажѣ масла тогда, какъ дни сдѣлаются коротки, а ночи длинны, т. е. около Филиповаго заговенья.

У кого есть свободныя деньги, не худо закупать тому рѣпное сѣмя тогда, какъ полуосминникъ онаго въ продажѣ не

свыше шалера, и запасшись онымъ года на два; для того что, какъ сказано, въ одинъ годъ четверть онаго бываетъ 4 шалера, въ другой же годъ, когда не хорошо уродится, возвышается до 50 шалеровъ; и такъ можно получить великіе барыши. Цѣна же масла учреждается по цѣнѣ рѣпнаго сѣмени, почему въ одинъ годъ бываетъ бочка онаго 12 шалеровъ, а въ другой по 20 и по 22 шалера.

Напоследокъ должно еще замѣтить, что всякое сполченное сѣмя (у маслостоловъ жмонки) должно на сковородѣ разгорячить, проворно накладывая въ мѣшки и подъ гнетъ класъ; для того что изъ горячихъ жмонокъ масло гораздо легче выходитъ. Кипитъ масло изъ плавы на другихъ, благоразумно поступить, когда уговорится не деньгами брать, но отдавать имъ изъ четверти отъ 30 до 36 фунтовъ масла, а жмыхи оставлять себѣ за пробой и употреблять оныя для своего скоповодства.

Примѣчанія.

- а) Изъ приведеннаго описанія можно легко усмотрѣть потребности доброй масляной мѣльницы. Сочинитель онаго намѣреніе свое главнѣйше относилъ до масла изъ рѣпнаго сѣмени, поелику оное въ Нѣмецкой землѣ большею частью въ ношники употребляется.
- б) Когда мы пожелаемъ наши домашнія масла, уподобляющіяся доброю лучшимъ

шимъ иносстраннымъ, или еще таковыя, кои бы въ доброшѣ оныя превзошли, какъ-то и похваляють нѣкоторыя изъ нашихъ Нѣмецкихъ произрастѣній, бишь на шѣхъ же мѣльницахъ, гдѣ выбивають простое наше масло, должно будетъ въ таковыхъ мѣльницахъ чтонибудь перемѣнить, дабы нѣжныя масла не приняли въ себя вкусу проспыхъ маслъ, прежде шутъ выгнѣтавшихся. Когда по сему, на примѣръ, бишо было рѣнное, или которое еще хуже, льняное масло, а непосредственно за онымъ бишь маковое масло; тогда маковое масло будетъ отъзываться вкусомъ и запахомъ своихъ предшественниковъ. Къ избѣжанію, чѣмобъ новое масло не разилось, пошому что деревянные песты всегда въ себя часть масла втяги-вають, которая неминуемо плѣсневѣетъ; то полезнѣе употреблять къ обдиранію сѣменъ жернова, подобные мучнымъ, но чѣмобъ были оныя не изъ песчаного камня, въ которой масло равно какъ въ дерево впитывается и получаетъ испорченной запахъ. Голландцы очень хорошо поступаютъ, употребляя къ таковымъ жерновамъ Липпихской мраморъ. *Экхарту* можетъ быть это было не извѣстно, пошому что похваляетъ Голландцовъ только за доброшу ихъ волосяныхъ ситокъ при бишь масла. Они скупають масляныя сѣмена въ превели-

комъ множествѣ въ южной Франціи, какъ-
шо въ Бурдо, Рошелѣ, Нантѣ и Дюн-
кирхенѣ. Не взирая на то, что они пра-
шашъ иждивеніе за провозъ, масло про-
даютъ дешевле, нежели во Франціи: ибо
въ послѣдней искусства маслостойнаго да-
леко еще противу Голландцовъ не раз-
умѣютъ. Господинъ *Георги* въ примѣча-
ніяхъ путешествія своего по Россіи го-
воритъ, что въ Ярославлѣ на масляныхъ
мѣльницахъ дѣлается *подъ*, липой изъ
чугуна, на которомъ ходитъ дѣйстви-
емъ воды подобный обыкновенному жер-
нову чугунной жерновъ.

- в) Подогрѣваніе или поджариваніе сѣменъ
въ мѣдныхъ сковородахъ въ разсужде-
ніи масла, въ пищу упошребляемаго, я
очень ошсовѣшиваю. Масла принимаютъ
въ себя удобно частицы, очень вредныя
здоровью человѣческому.
- г) Всѣ въ пищу назначаемыя масла дол-
жно выгнѣпать холодныя, т. е. безъ
предшешаго поджариванія жмонокъ. Под-
жариваніе масляныхъ сѣменъ учиняетъ,
что масла не шакковы вкусны бываютъ,
и скоро горькнутъ. Должно въ этомъ
случаѣ поступать съ ними шакъ, какъ
произходитъ съ деревяннымъ масломъ.
Отъ перваго погнѣшенія выходитъ изъ
стану шакъ называемое *цѣльное* или
дѣвичье масло, которое самое лучшее,
чистое и прочиѣйшее. Отъ втораго за-
гнанія клину идетъ оное уже вку-
сомъ

сомъ хуже, и собирается въ особливую посуду. Ошъ шретьяго погнешенія выходишъ масло самое худшее и употребляемое въ ночники.

- д) Каждое масло не должно свѣжее прямо изъ сшану брашъ къ употребленію; надобно оному нѣсколько поспоять, чѣтобъ ошлегли подонки; пошомъ оное слишъ съ подонковъ ошпорожно въ другую посуду. Таковымъ образомъ посщупающъ въ жаркихъ сшранахъ съ деревяннымъ масломъ: когда выгнешенное деревянное масло посшопишъ нѣсколько времени въ кадкахъ, сливающъ оное въ другую посуду, ошъ чего учиняется оное свѣшлѣе и чище. Новыя масляныя кадки, въ кошорыя масло сливающъ, внушпри высмаливаются. Счишающъ, чѣто въ 30 дней ошъ масла ошлегаешъ всякая нечиспота и гуща, подонки составляющая. Храняшъ деревянное масло въ холодныхъ погребяхъ, а зимою бросающъ въ оное по нѣсколько поджареной соли, для штого оная подонки лучше ошдѣляешъ и осаживаешъ. А чѣтобъ пошомъ деревянное масло далѣе сохранилось не испортившись, берутъ по равной доли воску и масла въсомъ, разпускающъ на огнѣ, подмѣшивающъ въ эшо поджареной соли и анису, и сливающъ въ кадку съ масломъ. Мушное и нечистое масло выставляющъ на солнцѣ, или поуваривающъ на огнѣ, чѣтобъ очисти-

лось и поправилось. Льютъ также въ масло кипящей воды. Ежели масло тюрко, поступающъ таковымъ образомъ, или кладущъ въ оное чистыхъ квасцовъ. Когда же деревянное масло начнешъ очень воняшъ, берущъ мякишъ опъ ячменнаго хлѣба, сваливающъ оной съ солью, и бросающъ въ масло; поже производшъ цвѣтъ каменной дяшловины (Ede Stein-Alee), когда накласъ онаго въ масло; равномерно неспѣлыхъ оливокъ разположи безъ косточекъ кладущъ. Когда же масло начнешъ совсѣмъ поршиться и загнивашъ, берущъ горсть кишнецовой травы и опускающъ въ бочку, или сцѣживающъ масло въ свѣжую бочку. Смори Хозяйка, Часъ IX, глава VII.

- е) Когда употребляемое съ деревяннымъ масломъ обратишъ къ поступанію съ домашнимъ масломъ, гдѣ прилѣжашъ въ посѣвѣ рѣпнаго сѣмени, и масло изъ онаго намѣрено употреблять въ продажу только для ночниковъ, должно однако не пропускашъ того, что сказано выше о сливаніи масла въ кадки или бочки. Еще *Экхартъ* говорилъ объ этомъ въ свое время: оказываешъ себя всякаго свѣдѣнія въ торговлѣ лишеннымъ, и шерпшъ убытокъ тотъ, кщо выбитое масло рано изъ кадокъ разливаетъ по бочкамъ, и тотъ часъ продаетъ; пошому что изъ зеренъ при
бише

бишь масла всегда выгнѣшается нѣсколь-
ко водяности и гущи, кои въ короткое
время въ бочкѣ составляющъ осадокъ
подонковъ на два и на три пальца. Сии
подонки при возкѣ взбалшывающся, а
отъ шого вся бочка масла учиняется
мушна и густа, почему и цѣна оной
спадающъ двумя или тремя шалерами,
или еще отъ покупателей и въ счетъ
не пріемлется; и шакъ масло въ масло-
бойнѣ не должно разливать по бочкамъ,
но принявъ отъ масляника мѣроу, въ
шѣхъ кадкахъ ставишь въ амбарѣ, сли-
вашъ въ большой дщанѣ, въ которомъ
мѣроу бывающъ по 6 и 12 бочекъ, шакъ
оставишь оное стоящъ до Декабря, ко-
гда цѣны на масло бывающъ самыя вы-
сокія; сдѣлается шогда масло самое чи-
стое, которое разливъ въ мѣрные боч-
ки, яко лучший шоварѣ, можно на под-
хватъ продать за наличныя деньги.
Остающіеся въ дщанѣ подонки можно
употребить къ варенію черного мыла,
или въ смѣсь съ дегтемъ для коломази,
или продавать канапчикамъ.

ж) Гдѣ производятся большой сѣвъ льну,
и слѣдственно собирается много лья-
наго сѣмени, или дешево оное скупить
можно, полезно шамъ помышлять о
бишь изъ онаго масла, и о продажѣ сего
очень расходнаго шовару; но съ очища-
ніемъ онаго поступать шакъ, какъ вы-
ше говорено о рѣпномъ маслѣ; лья-

ному же сѣмени должно бысть не очень свѣжему. Старыя сѣмена даюшъ вдвое добраго масла, когда шолько довольно смачиваемы будущъ водою при толченіи жмонокъ, и порядочно наблюдено будещъ поджариваніе. Однако льняное сѣмя обдирашъ и выгнешашъ несравненно тяжеле, нежели рѣпное сѣмя; почему маслобойникамъ должно вразумишъ, чшобъ упоиребляли они къ сему больше времени, и вязкія сїи сѣмена въ спухахъ, послѣ шого какъ оныя смочены будущъ водою, болѣе перешалкивали, дабы масляныя часпицы изъ вязкихъ своихъ сосудовъ лучше опдѣлились, и при выгнешаніи вышекли. Должно имъ шщадительно наблюдать признакъ во время подогрѣванія, кошорымъ водяность въ парахъ выгоняешся. Всего болѣе должно понуждашъ масляниковъ имѣшъ шонкїе и частые волосяные мѣшки или сипки, въ кошорые кладушся жмонки къ выгнешанію. По сему смачиваніе водою, подогрѣваніе и волосяные мѣшки должно щипашъ, яко шри главныя вещи, въ недоспащкѣ чего, когда льняное сѣмя старо, едва половину находящагося въ немъ масла выжащъ можно. Въ спранѣ, имѣющей много фабрикъ, великой расходъ льняному маслу, шакъ чшо пудъ масла сего покупается рубли по два и слишкомъ.

Въ неплодоносныхъ земляхъ льняное масло соспавляетъ обыкновенную приправу кушанья простаго народа: бдящъ же оное за недоспашкомъ коровьяго масла и съ хлѣбомъ. Но какъ въ нѣкоторыя годы масло эшо бываетъ дороже коровьяго, тогда лучше покупать на расходъ коровье, а льняное продавать. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ умѣютъ простыя деревенскіе жители масло эшо во вкусъ поправлять и уравнивать рѣшному: спавяшъ оное на угольной умѣренной жарѣ, и положивъ кусокъ ржаного хлѣба подваривающъ; хлѣбъ всякую суровъ изъ масла въ себя втягиаетъ, и учиняетъ оное вкуснѣе. Тоже произходишъ, когда снявъ съ огня кипящее масло, вливъ въ него крѣпкаго уксусу, произшедшую отъ того пѣну счерпавъ, поставивъ опять на огонь, продолжавъ сниманіе пѣны, и потомъ устудивъ хранишъ къ употребленію въ холодномъ мѣстѣ. *Г. Роландъ де Платьеръ* говоритъ въ своемъ описаніи художествъ о набиваніи шерстяныхъ матерій, плисовъ и велверешовъ разными красками, изданномъ въ Парижѣ 1780 года, что масло для красокъ поправляется шѣмъ, когда вливъ оное на свѣжую негашеную извѣсть, гораздо взмѣшавъ, и потомъ слить; оное дѣлается отъ сего очень доброшно и чисто, какъ вода.

Извѣ-

Извѣстїе.

Подробное наставленіе о выбиваніи всякихъ маслѣ будещъ описано въ должностяхъ Хозяйки, во второй половинѣ сего сочиненія, Части IX, въ главѣ VII.

Г Л А В А V.

Луговое земледѣліе.

Поелику въ хозяйствованіи всеобщу о цѣнѣ сбору сѣннаго удостовѣренось, однакожъ во многихъ справахъ поднесъ еще довольствуются либо находящимися во владѣніи лугами, или имѣя оныя только заливные, не помышляя о поправленіи оныхъ, чѣмъ приносили оныя больше и лучшаго сѣна предъ прежнимъ. Въ нѣкоторыхъ справахъ въ этомъ обстоятельстве давно уже сдѣлали великіе успѣхи, не возбуждая однако тому соревнователей, или чѣмъ вошло это во всеобщее употребленіе. Но послѣдняго можно еще ожидать, когда не будетъ недостатку въ явственнахъ наставленіяхъ къ тому, чѣмъ получать съ луговъ столько прибытку, чѣмъ труды и издержки скоро и весьма избыточно наградились. Когда луга должно щипать неложно матерью пашенъ, безъ коихъ они ни настоящей жизни, ни силы имѣть не могутъ; то посмупающъ противуестественно,

КО-

когда желаютъ имѣть хорошихъ дѣпей безъ добрыхъ маперей. А въ этомъ случаѣ находимся всѣ мы, когда упражняемся только въ землепашествѣ, совсѣмъ не помышляя о луговомъ земледѣліи. *С.* §. 145.

А. Раздѣленіе луговъ.

Луга раздѣляются на шаковые, кои только однажды, и шаковые, кои два и три раза скашиваются; почему и называется лугъ однокосной, дву-косной и трех-косной.

Однокосные луга бывають отъ того, что права на оныхъ не слишкомъ распунлива, и будешь безполезный трудъ косить ихъ два раза, развѣ только весною и осенью не пасти на нихъ скопины.

Однокосные луга во многихъ мѣстахъ по старинному обычаю косятъ либо въ Іюль, дабы послѣ пасти на оныхъ скопины, или косятъ ихъ въ началѣ Сентября (либо подѣ исходѣ Августа), въ какомъ намѣреніи называютъ ихъ осенними лугами. Но шаковое употребленіе самое худое; пошому что большая часть правъ въ шаковое позднее осеннее время, а особливо когда не господствовала мокрая погода, бываетъ совсѣмъ безсочна. Можно это примѣнить, когда онѣ еще на корнѣ стоятъ, по цвѣту ихъ былинь, что оныя бывають либо бѣлы, или красновашы. Соспавляють онѣ пошому сѣно, не содержащее въ себѣ никакой пищи.

пательности, коимъ скошина крайне обманывается.

Двукосные и больше разъ скашиваемые луга, кои называются иначе отавными, въ Юнѣ косятся на сѣно, а въ Августѣ или Сентябрѣ снимають сѣ нихъ отаву.

Б. Различныя пошвы луговъ.

Траву и сѣно называютъ кислыми, когда распушъ на низменныхъ или болошистыхъ лугахъ. Возвышенная пошва, кошорой не доспашочесствуешь во влагѣ, приносишь травы мало или не очень годной къ употребленію; почему шѣ луга лучшіе, кои умѣренно влажны, и припомъ имѣють низменное положеніе. Естьли луга имѣють шакое положеніе, чшобъ близъ находящуюся воду безъ дальняго шруда и убышку къ наводненію оныхъ проводить можно было, то урожай травы на нихъ вдвое умножишь удобно.

Тучной черноземъ на низменныхъ лугахъ произращаетъ траву всего лучше; и когда оной отъ подмѣси глины нѣсколько окрѣпнешъ, остается больше отъ червей свободенъ, нежели рыхлая земля. Почему таковую пошву прочимъ предпочитать должно, ибо оная весеннюю воду не слишкомъ на себѣ задерживаетъ, а лѣтомъ не слишкомъ высыхаетъ.

Когда пошва будетъ совѣмъ глиниста, и пошму называется холодною, для того чшо влажностъ, отъ зимы остающуюся,

щуюся, долго въ себѣ удерживаетъ, права на оной вырастаетъ поздно, и почти чешырьмя недѣлями позднѣе, чѣмъ на вышеписанной. Хотя она лѣтомъ долѣе удерживаетъ въ себѣ влажность, но въ сухія лѣта отъ частыхъ и малыхъ дождей совсѣмъ не проникается. Влажность же, отъ умѣренныхъ дождей остающаяся, скоро извлекается солнцемъ, воздухомъ и вѣтромъ. Когда же засуха лѣпная будетъ велика и продолжительна, производя на оной шрешины и разсѣдины, что ростъ травы останавливаетъ; равно какъ и права на шаковыхъ пошвахъ бываетъ большею частью ядрена и жестка. Но нѣкоторыя изъ кормныхъ травъ растущъ на шаковой пошвѣ лучше, нежели луговья травы.

Если пошва камениста, не можетъ на оной трава расти густо, но за то бываетъ вкуснѣе и питательнѣе.

Пошва лугу, большую часть года подъ водою находящаяся, а при томъ когда вода сія стоитъ тихо, и слѣдственно мѣсто это учиняетъ болотистымъ, можетъ много приносить травы и сѣна; но какъ оныя, по вышесказанному, бываютъ кислы, грубы, и подобны осокъ, то и луга сего рода надлежитъ считать къ плохимъ; потому что за мягкимъ своимъ дномъ уборку сѣна дѣлаютъ очень затруднительною. Ибо, когда въ мочливые годы принуждено будетъ траву съ шаковыхъ луговъ сносить людямъ на рукахъ
сво-

своихъ, или возишь по бослошу на саняхъ, ничего не можешь быть мучительнѣе для человѣковъ и рабочихъ скошовъ. Когдажъ случится сухое лѣто, и можно будетъ ходишь по шаковымъ лугамъ не вязнувъ; но естли случится одинъ разъ туча съ сильнымъ дождемъ, то ни лошадь, ни телѣга по онымъ дѣйствовать не могутъ. Луга сего рода больше другихъ пребудуиъ поправленія, кошорое предпринимашь можно только коронѣ или Государю, и чему Фридрихъ Великій (Прусскій) собою примѣръ свѣшу подалъ.

В. *На лугахъ растуція травы и злаки.*

Каждый Хозяинъ долженъ главнѣйше примѣчаніе свое обращать на столько различныхъ травы и злаки (Gräser), растуція на лугахъ его: ибо не довольно ему еще того, чтооъ онъ только все, что на лугахъ его зеленѣется, понималъ, хорошо ли оно расшетъ, и къ шому способствовалъ. Онъ долженъ собственнѣо вѣдать, кошорые злаки и травы для скоша его ошчаспи здоровѣе, часшю же пишательнѣе. Когдажъ найдетъ между оными шаковыя, кои здоровью скошовъ его вредны, долженъ ихъ изшребляшь. Между собственнѣо шакъ называемыми злаками въ собственномъ смыслѣ нѣтъ ни одного на лугахъ его, кошорой былъ бы ядовитъ; но тѣмъ больше шаковыхъ между травъ, кои хотя бы въ маломъ количествѣ въ сѣнѣ находились, навлекутъ скошамъ его различ-

личныя болѣзни, и даже самую смернь. Ошѣ сего - шо по разнымъ мѣстамъ на многихъ дворахъ случается, что шѣляна на прим. почти всякой годѣ помирають, или и старыя скошины вдругъ занемогають и падають. Хотя поднесъ еще шаковое нещасіе не всякой годѣ случается, но бываетъ сильнѣе въ шаковые годы, въ кои особливое разположеніе погоды болѣе, нежели въ прочіе, выростанію ядовитыхъ шравъ способствуетъ: ибо извѣстное дѣло, что погоды всегда бываютъ способны къ произрастанію того или иного расшѣнія.

Я намѣренъ привесити въ примѣръ одну только вредную шраву, растущую на пашняхъ и лугахъ, и кошорая по нынѣ еще деревенскимъ жишелямъ не знакома довольно, или не щитається ошѣ нихъ опасною. Эшо собачья петрушка *Aethusa Cynapium*, у *Линнея*, растущая не шокмо по капустникамъ и повареннымъ огородамъ, но на многихъ поляхъ и лугахъ. Эшо расшѣніе не рѣдко въ поваренныхъ огородахъ обманывается и пріемлется за петрушку, къ кошорой оно очень сходно. Ошличіе ея состоитъ только въ лоскѣ, оказывающемся на нижней сторонѣ листовъ; почему и имѣетъ она званіе на Нѣмецкомъ языкѣ *Gleife*, что можно перевести *склизъ*. Въ нѣкошорые годы трава эша совсѣмъ ошѣ земли не опростаетъ, но въ другіе, когда въ первые весенніе мѣсяцы прочія шравы еще бываютъ шонки и низки, выросша-

ешѣ очень шолсѣпа, и вышиною отѣ шрехѣ до 6 вершковѣ; почему коса ее захвапываешѣ и попадаешѣ она вѣ сѣно. Пока еще я вѣ первые годы моего хозяйствованія примѣчаешѣ вредныя и здоровыя шравы на поляхѣ и лугахѣ не научился, но выучила меѣ эша шрава ошпорожниости вѣ рассужденіи моего полушрешьяго году жеребенка. Оной былѣ привязанѣ отѣ слуги на жнивѣ на возжахѣ кѣ колу, дабы не ходилѣ далѣе, сколько позволишѣ длина возжей. Какѣ лошадка сѣя дошоль кѣ уединенію была не привычна, почему билась, покушалась ошорвапшѣся и уйши, я случившисѣ на полѣ, подошелѣ кѣ ней, огладилѣ и усмиривѣ ее веселился, чшо она спала сѣ охотою ѣснѣ вокругѣ себя шраву. Однако вѣ эшой окружѣ между прочими шравами была по крайней мѣрѣ шестая доля собачей пепрушки, которую жеребенокѣ мой ѣлъ на ряду сѣ прочею шравою. Кѣ вечеру уже повѣсилѣ онѣ голову, захирѣлъ, не спалѣ ѣснѣ корму, и оказывалѣ сильныя корчи вѣ наружныхѣ частяхѣ шѣла. Это продолжалось нѣсколько дней сряду, и кончилось вздувшимися вѣ разныхѣ мѣстахѣ желваками вдоль реберѣ сѣ обоихѣ боковѣ. Когда оныя выросли, назрѣли и прорвались, вышекло изѣ нихѣ несказанно много шонкаго и очень вонючаго гною. Но желваки и прорываясь пошасту опять надувались; жеребенокѣ совѣмѣ не ѣлъ почши корму, имѣлъ шолько кожу да ко-
спи,

сти, и цѣлой годѣ хворалѣ, пока по долго-
временномѣ леченіи мало по малу опра-
вился, однакожѣ не дошелѣ того роспу,
каковаго бы долженѣ былѣ бысть безѣ сего
приключенія. Таковымѣ образомѣ не одно-
кратно вѣ скошахѣ производяшѣ смерш-
носныя болѣзни, коихѣ причины сельской
жипель искалѣ бы вѣ корму, когда бы вѣ-
далѣ о вредности той или иной шравы. Я
имѣлѣ случай не однократно узнавать,
что вѣ шѣхѣ мѣстахѣ, гдѣ луга продающѣ
и покупающѣ, закладывающѣ и оняшѣ вы-
купающѣ, и такѣ оныя переходяшѣ изѣ
рукѣ вѣ руки, вскорѣ вѣ шомѣ или иномѣ
дворѣ не могутѣ уже взвести ни лоша-
ки, ни коровки, ни овечки, и очередь сія
переходишѣ къ шому, которому шаковой
безпризорной лугѣ достанешся; для шого
что онѣ скошину свою начнетѣ кормить
единшвенно сѣ шого лугу сѣномѣ. Спа-
рымѣ скошамѣ шожѣ сѣно не рѣдко бы-
ваетѣ меньше вредно, когда шолько содер-
жатся они не на одномѣ ономѣ сряду,
какѣ молодые скошы, а будутѣ получаютѣ
сѣ перемежкою рѣзку и хабошье.

Хошя восбще не можно ожидать отѣ
каждаго поселянина, чтобѣ онѣ всѣ подо-
зрипельныя или явно вредныя шравы зналѣ
и различашѣ могѣ, однакожѣ бывающѣ та-
ковые искусныя пасшухи и овчары, кои
вѣ эшомѣ довольно свѣдуши, и къ поль-
зѣ домоводства могли бы больше научены
бышѣ, ешъли бы постарались о шомѣ.

Г. Показаніе и описаніе вредныхъ и истребленіе заслуживающихъ травъ на лугахъ и скотопасбищахъ.

Ничего сполько не желательнo, чѣтобъ государствo прилагало попеченіе познакомить своихъ поселянъ съ опасными правами, на ихъ лугахъ и пасбищахъ растущими. Я сообщу здѣсь желанія сіи съ предложеніями къ тому, въ надеждѣ той, что тамъ или въ иномъ мѣстѣ, когда не всѣ, то хотя часть оныхъ произведена будетъ въ дѣйство.

а) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по деревнямъ изъ кресшьянъ есть примѣчательныя Хозяева, кои довольно имѣютъ склонности къ ученію, знаютъ травы въ пользу собратій своихъ поселянъ. Можно онымъ дать свободу, чѣтобъ они всякія травы, которыхъ еще не знаютъ, въ то время какъ оныя цвѣтутъ, могли бы къ живущимъ въ ближнихъ городахъ Лекарямъ или Апшекарямъ, ибо оныя въ правахъ знаніе имѣютъ, отсылать или возить сами, и чѣтобъ оныя научали ихъ знанію силы и свойствъ травъ шѣхъ безденежно. Въ нѣкоторыхъ странахъ содержащаяся на жалованье такъ называемые уѣздные Физики, кои единственно къ тому опредѣляются, чѣтобъ любопытныхъ поселянъ научать правознанію. Однако оныя не рѣдко живутъ въ отдаленіи отъ деревень своей округи; почему полезно бы Апшекарей бли-

ближнихъ городовъ , Бошанику разумѣющихъ, за нѣкоторую плату изъ уѣздной казны обязывать, чѣмъ они вопрошающимъ поселянамъ изустное или письменное наставленіе сообщали.

- 6) Въ каждомъ уѣздѣ, по величинѣ онаго, должно имѣть двухъ или больше опредѣленныхъ паспуховъ, кои бы въ назначенное время отъ короны къ сему избранному Бошанику опдаваемы были къ наученію, узнавать вредныя или подозрительныя шравы. Гдѣ находишься Бошанической садъ, нужно, чѣмъ въ ономъ содержались всѣ въ нашей землѣ растущія вредныя растѣнія: это будетъ крашчайшій путь къ наученію отъ Бошанниковъ созываемыхъ паспуховъ разумѣть оныя. Таковыя наставленные и такъ названныя уѣздныя паспухи должны время отъ времени другихъ паспуховъ своего уѣзда научать тому же, или брать въ ученики мальчиковъ, кои опредѣляютъ себя въ должностъ паспуховъ. Могутъ же уѣздныя паспухи временно лѣпомъ по своему уѣзду обходить и примѣчать, гдѣ растутъ опасныя шравы, и оныя деревенскимъ жителямъ показывать. Можетъ быть въ нѣкоторыхъ странахъ удобно и это учредить, чѣмъ ученики егарей и лѣсовщиковъ единственно для познанія вредныхъ шравъ на короткое время Бошаническіе сады посѣщали; ибо оныя по своей должности

надзиранія за лѣсами по всѣмъ округамъ ходящъ, могутъ вредныя sprawy открывашъ, и деревенскимъ жишелямъ оныя показывашъ.

в) Въ нѣкоторыхъ земляхъ находящяся по большимъ городамъ такъ называемые Семинарисшы, изъ которыхъ назначающъ послѣ въ училищели школѣ по деревнямъ. Таковыхъ Семинарисшовъ должно понуждашъ къ посѣщенію Ботаническихъ садовъ, подъ наставленіемъ знающаго Ботаника, дабы они со временемъ могли учениковъ своихъ въ деревняхъ обучашъ тому же, и показывашъ, какія sprawy испребляшъ должно.

г) Когда на которомъ крестьянскомъ дворѣ того или другаго роду скопина больше, нежели въ другихъ дворахъ того мѣста, хвораетъ, или помираетъ, такъ можетъ это быть и въ разсужденіи цѣлыхъ селеній съ другими; то можно подозрѣвашъ, что луга и пасбища шому причиною. Въ таковомъ случаѣ должно начальству мѣста, когда нѣтъ особливыхъ къ шому учрежденій, призывать окружнаго Физика, и велѣшъ ему тѣ мѣста осматривашъ, не расшенъ ли въ оныхъ того или инаго роду опасныхъ травъ. Ошъ деревень должно ежегодно начальству подавашъ развѣ или больше вѣдомости о болѣзняхъ и надежѣ своихъ скотовъ съ подробнымъ описаніемъ, таковымъ образомъ удобнѣ могутъ изыски-

скиваться причины болѣзней и сред-
ства къ отвращенію оныхъ. Въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ случается, что гдѣ о
болѣзняхъ и частыхъ падежахъ на скопѣ
мало знавали, или вовсе оныхъ не бы-
вало, но перемѣна луговой пошвы, на
примѣръ: когда болошистые луга рвами
осушены будуще, или въ лѣсахъ разчи-
щены будуще новые сѣнокосы, можетъ
это расшѣнію дошоль не бывавшихъ вред-
ныхъ травъ столько споспѣшествовать,
что оныя умножатся, или изъ сосѣд-
ства занесены бытъ, и чрезъ то сѣно
обратится въ нездоровой кормъ. Най-
дуще тому примѣры въ нѣкоторыхъ
вредныхъ травахъ, къ описанію коихъ
вскорѣ я присуплю.

Когда же я шѣ травы, кои вредными
считашъ и истреблять должно, показы-
ваю, и обще съ признаками оныхъ научаю,
какъ оныя вѣрнѣе искоренять можно, пред-
пославляю я служащимъ къ тому сред-
ствомъ вспахиваніе луговъ и обсеваніе
оныхъ здоровыми и пишательными тра-
вами и родами хлѣбовъ; въ этомъ намѣ-
реніи опсылаю я чинателя къ вскорѣ имѣ-
ющему бытъ предложено хозяйственному
сему дѣйствию, и котораго часть описа-
на уже въ I Части сего сочиненія между
различными пашенными системами, ко-
торыя луга подвергаютъ обмѣну пашни. Но
главнѣйше помянутое наставленіе изъ при-
лагаемыхъ вѣрныхъ основаній будуще къ

О 4

по-

тому клониться, чтобъ лугъ обсѣвать однимъ родомъ травы, которое симъ преднапоминается, дабы разумѣли, когда будетъ иппи рѣчь объ испребленіи той или другой вредной травы, что оно посредствомъ обсѣванія сѣменами одной травы производить должно.

Есть многія вредныя травы, до которыхъ на лугахъ и пасбищахъ скопы не касаются; но оныя попадающъ въ сѣно, съ онымъ въ кормъ и поѣдаются; для того что вредныя оныя испаренія на корни въ зеленыхъ чувствительны, по засушеніи учиняются меньше слышны. Между тѣмъ травы тѣ и сухія не меньше содержатъ свой ядъ, а хощя бы нѣчто изъ онаго по засушеніи и теряли, но вредящъ однако скопу, естли множествомъ въ сѣнѣ случается. Съ большею частію вредныхъ скопамъ травъ тоже обстоятельство, какъ съ засушиваемыми въ Апшекахъ травами и кореньями, кои цѣлбодную свою силу и въ сухомъ состояніи оказываютъ, и только оныя долговременнаго лежанія теряютъ.

Врядъ ли впадеши на мысль Хозяину, чтобъ зеленые подозрительныя травы до созрѣнія на нихъ сѣменъ скашивали, и могли употребить въ кормъ, какъ объ нѣкоторыхъ изъ нихъ наставленіе приложено будетъ. Но лучшее употребленіе, которое оныя въ этомъ случаѣ учинить можешь, есть то, чтобъ таковыя
тра-

шравы обще съ другими съ ними подрѣ-
занными шравами вывозитъ на пашню,
разбрасывать по оной вмѣсто навозу и
запахивать; или опвозитъ ихъ въ навоз-
ную яму, чѣмъ оныя въ нихъ обще съ
другими вещесвами сопрѣвали, и служи-
ли къ умноженію навоза. Въ обоихъ слу-
чаяхъ хлѣбопашецъ получитъ отъ того
очень добрый навозъ. Когда скоситъ онъ
вредныя шравы прежде разцвѣтанія, или
въ ономъ, тогда сѣменами ихъ, коихъ
еще нѣтъ или не выспѣли, пашню свою
не засоритъ. Если въ эту пору про-
должается еще сѣвъ ярового хлѣба, когда
онъ нѣтъ шравы еще свѣжія и полныя соку
вмѣсто обыкновеннаго навозу употре-
бляетъ; тогда оныя, а особливо на су-
хихъ возвышенныхъ мѣстахъ, посѣянно-
му яровому хлѣбу опмѣнный ростъ со-
общатъ, и больше нежели лучшій овечій
и коровій навозъ то произвестъ можетъ.
Когда же земледѣлецъ скошенныя свѣжія
вредныя шравы привезетъ въ навозную
яму, и примѣшаетъ къ нимъ соломы,
или самаго плохаго шакъ называемаго на-
дворнаго навозу, получитъ изъ того равно-
мѣрно оплично добрый вегетабилическій
навозъ, копорый можно возитъ подъ
озимой хлѣбъ въ паровой клинъ. По по-
слѣднему способу всѣ ядовитыя и подо-
зришельныя растѣнія къ умноженію на-
воза могутъ съ пользою употребляемы
быть. Чѣмъ болѣе таковыя растѣнія

остроты въ себѣ содержатъ, тѣмъ лучшаго навозу отъ оныхъ ожидать должно. Я не рѣдко *евфорбію*, *ослиное молоко*, называемую *Efula* у Линнея, которая здѣсь множественно распахъ на пашняхъ, выходя на поле къ моимъ пашущимъ работникамъ въ Маѣ мѣсяцѣ, срывалъ, и нося подъ мышкою, ходя за сохою клалъ въ борозды подъ сѣвъ овса, и потомъ съ удивленіемъ усматривалъ, сколько ростъ овса на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ *евфорбія* была запахана, опличался.

Когда лугъ будетъ вспаханъ, другою правую обсеянъ, или обмѣнному земледѣлію подверженъ, однако и послѣ того появляющіяся ненавистныя травы сіи, должно тотчасъ съ самаго начала, пока они опять не размножились, къ истребленію оныхъ разпоряженіе сдѣлать. Оныя необходимо должны тѣмъ лучше въ глазахъ казаться, когда вспаханный лугъ будетъ только одною правую обсеянъ.

Упомяну бы до безконечности, когда бы истребленіе травъ сихъ производилъ образомъ обыкновеннаго полошья. При паханіи пахарь имѣетъ съ собою орудіе, кошорымъ прилипающую къ сошникамъ землю отколупываетъ. Оно состоитъ въ палкѣ, на кошорой насаженъ желѣзной наконечникъ лопаточкою. Когда желѣзко сего орудія остро, нужно оное только дать въ руки сларику, къ другимъ работамъ не способному, для сѣканія появляю-

вляющихся изъ земли вредныхъ травъ. Когда произойдетъ это нѣсколько разъ въ теплое время года, и когда травы въ лучшемъ соку около времени раздвѣпанія своего находяща, оныя мало по малу переведутся. Впредь къ упражненію сему назначеннаго человѣка буду я называть *луговщикъ*.

При слѣдующемъ теперь описаніи травъ, заслуживающихъ испребленіе, приложу я признаки оныхъ изъ Бошаники, а особливо изданной славнымъ Г. Докшоромъ *Бемеромъ* въ Випшенбергѣ, дабы сельскій жишель по недоспажку инаго наспавленія оныхъ признаковъ держаться могъ, и пошому научился познавать травы, подозрительными кажушіяся. Найдетъ онъ здѣсь хотя не всѣ, но шѣ изъ вредныхъ травъ, кои въ той или иной округѣ нижней Нѣмецкой земли бывающъ. Нѣкоторыя изъ нихъ всюду знакомы, какъ-то полосатая цикуша или болиголовъ, бѣлена и дурманъ, почему я объ оныхъ и не упоминаю, хотя ихъ всего тщательнѣе выдѣрживать должно, и бросающъ въ навозную яму; пошому что малыя играющія ребяшка не рѣдко себя оными оправляютъ.

А) *Хвощъ*, *Equisetum*; находимъ мы онаго шесть родовъ на нашихъ лугахъ и скоюпасбищахъ.

аа) *Суковатыми листьями снабженный хвощъ*, *лѣсной хвощъ*, *Equisetum sylva-*
va-

vatic у Линнея, растетъ по лѣснымъ лугамъ.

66) *Хвощъ, вырастающій купно съ голыми и листоватыми стеблями, у Нѣмцовъ Schachtel-Halm, Katzensteert, конскій хвостъ, рѣчной хвощъ, Equisetum fluviatile у Линнея. Самый высокорастущій изъ всѣхъ родовъ, бываетъ почти въ два аршина, и растетъ по краямъ рѣкъ и водяныхъ рвовъ. Своды онаго не издорожены, мягки, сначала блѣднозелены, наконецъ черны, и пропадаютъ безъ цвѣту.*

вв) *Сосенка, хвощъ пашенный, купно съ голыми и листоватыми стеблями растущій, Equisetum arvense у Лин. Предшедшій родъ хвощу не рѣдко съ симъ отъ простыхъ людей за одно шипается: оказывающа онъ весною на влажныхъ мѣстахъ, и въ разсужденіи двоякихъ голыхъ и съ листьями стеблей къ предшедшему сходству; листоватой стебель бываетъ вышиною вершковъ около семи, шероховатъ и при осязаніи острѣ, какъ пила; вершина состоитъ изъ немногихъ, обыкновенно только двенадцати листовъ, кои иногда на сучки раздѣляются.*

гг) *Угловатыми стволами растущій хвощъ, болотной хвощъ, Equisetum palustre у Линнея. Растетъ на мокрыхъ лугахъ; стволы его бываютъ*
толь-

только вершковъ въ семь, продорожены чешпырю или пшью глубокими бороздками, и сполькожъ возвышенныхъ угловъ имѣющъ; колѣнца на оныхъ черны, съ бѣловатымъ и какъ бы зубчатымъ закрайкомъ, изъ спвола выходящъ многіе отростки, и на каждомъ изъ нихъ бываетъ по цвѣточному колоску.

да) Гладкой, почти голой хвощъ, глинистой хвощъ, *Equisetum limosum* у Лин. Спволы его выше, толще и множайшимъ числомъ бороздокъ издорожены, нежели предшедшаго роду; почему Г. фонъ Галлеръ щипаетъ оной за отростокъ угловатаго хвощу.

ее) Острой, почти голой хвощъ, судомой, зимозеленой хвощъ, *Equisetum hyemale* у Линнея. Растетъ на лугахъ, около плошинъ и зеленыхъ береговъ, подъ ольхами и ивами. Спволъ его издороженъ шупыми бороздками, но не взирая на это, очень шершавъ, и въ осязаніи острѣе прочихъ родовъ. Нагалищи на колѣнцахъ стеблей коротки, и по краю означены черными шпочками, впрочемъ совсѣмъ не зубрены; напротивъ на отросткахъ, съ низу выходящихъ, нагалищи на коленцахъ обведены бахромочкою.

Хотя скошы охотно бѣдятъ всѣ роды хвощу, но оной имъ не здоровъ. Въ зеленомъ соепоянтіи приключаетъ онъ

онѣ имѣ жестокой поносѣ, беременной скотѣ не рѣдко отъ того выкидываетѣ, дойныя коровы шеряютѣ молоко, и зубы у рогагого скопа вообще отъ него портянся и начинаютѣ шатайтѣся. Когда же случитѣся оной засушенной въ сѣнѣ, производитѣ какѣ у рогагого скопа, такѣ и лошадей кровавую мочу; хотя въ разсужденіи послѣднихъ и противное сему утверждають. Четвертый родъ хвощу (бологнаго) имѣетѣ очень противный запахѣ, почему и сѣно, сѣ онымъ смѣшанное, какѣ рогагой скотѣ, такѣ лошади отвергають, и развѣ только отъ великаго голоду ѣдятѣ.

Трудно на старыхъ лугахъ и пасбищахъ хвощъ истребить: даже и на вспаханныхъ лугахъ отъ разрыванія сошникомъ кореньевъ его онѣ умножается. Сверхъ того корень его простирается на нѣсколько аршинъ въ землю, состоитѣ изъ многихъ отростковъ, и на каждомъ колѣнцѣ опускаетѣ побочную плеть. Черезъ посѣвъ разпаханныхъ луговъ хлѣбомъ, картофелемъ, стручковыми плодами и тому подобнымъ хвощъ заглушается, или чрезъ повторяемое паханіе земли подѣ сказанныя растенія большею частью истребляется.

Сколь-

Сколькожъ онаго на новыхъ лу-
гахъ появившя, долженъ луговщикъ
своею палочкою съ лопаточкою, ко-
гда хвощъ къ полному росту своему
приближися и въ полномъ соку бу-
дешъ, въ жаркіе полдневые часы его
по корень ссѣкашь; испребляеися
онъ отъ того, а особливо естли
случится сухая погода.

Б) Ранункули. Эшотъ обширный родъ пра-
вы господинъ *Линней* раздѣляетъ на
ранункули съ цѣльными, и ранункули
съ раздѣленными и составными листьями.

АА. Ранункули съ цѣльными листьями.

аа) *Лютикъ*, стелющійся *ранункуль*
съ ланцетообразными листьями, пѣя-
вичникъ, по Нѣмецки *Klein-Speerkraut*,
Brenn-Kraut, *Wasser-Hahnenfuß*, у *Лин-*
нея *Ranunculus flammula*. Распешъ по
глубокимъ холоднымъ болошамъ, гдѣ
мало другихъ распѣній находится, и
отъ паспуховъ признается по лан-
цетообразнымъ листьямъ своимъ. *Ба-*
ухинъ еще замѣшилъ объ немъ, что
паспухи и овчары отъ него скоповъ
своихъ удерживаютъ, и что внутрен-
нія помирающихъ отъ него скоповъ
оказываются воспаленными. Название
этой травы пѣявичникъ произхо-
дитъ отъ пѣявищъ, которыя въ гни-
лыхъ водахъ подъ этою правою дер-
жатся. У лошадей, обѣвшихъ этою
травой, находили испортившуюся пе-
чень

чень и въ оной много водяныхъ пузырьковъ и червей. Свѣжіе листы эшой травы можно употреблять вмѣстѣ обыкновеннаго нарывнаго пластыря. Растѣніе эшо по засушеніи въ сѣно хошя теряетъ большую часть своего летучаго остраго существа, однако хошя небольшое число оной попадетъ въ сѣно, приключаетъ скошамъ смертельные болѣзни. Луговщикъ долженъ траву эшу съ самаго Мая мѣсяца, съ кошораго она по самой Іюль цвѣсти начинаетъ, употреблять.

66) *Ползучій ранункуль съ узкими листьями, погнѣздо сидящими, Ranunculus reptans у Линнея.* Слабый его стебель спелется по землѣ. Чашечка его желтыхъ маленькихъ цвѣтовъ, прежде нежели свалился, загибается назадъ. Г. фонъ *Галлеръ* щипаетъ эшо растѣніе за опродіе перваго. Луговщикъ равномѣрно не долженъ онаго щадить.

ВВ) *Лютикъ, прямо растущій, съ ланцетообразными листьями, по Нѣмецки Langer Wasser-Hahnen-Fuß, Ranunculus lingua у Линнея.* Растетъ на низменныхъ мѣстахъ, а особливо около прудовъ и водяныхъ рововъ. Круглые прямо стоящіе, нѣсколько моховатые въ осязаніи, колѣнцами раздѣленные и вѣтками усаженные спволы его

его выросшающѣ около 14 вершковѣ, и носишѣ попеременно сидящѣ, колѣнца охватывающѣ яйцеобразно острые или ланцетообразныя съ слабыми вырѣзками лиспы съ верху моховатыя, на концахѣ же вѣтвей мохнатыя одинакѣ цвѣточныя черешки. Цвѣточные лиспы имѣютѣ велики, желты и лоснящѣся. Этошѣ родѣ ранункулѣ еще ядовитѣе перваго, почему луговщикѣ долженѣ оной сѣбѣ палкою своею прежде, нежели оной разцвѣтитѣ, и продолжатѣ это истребленѣ, когда въ томѣ же году опятѣ покажетѣся.

ББ. Ранункулы съ раздѣленными и составными лиспами.

аа) Многоцвѣтной желтой лютикѣ съ почкообразными кореньями и перстообразными лиспами на стволѣ, по Нѣмецки Gold-Hähnlein, золошой пѣтушокѣ, а обыкновеннѣ Gold-und Rother Butter-Blume, у Линнея Ranunculus auricomus. Расшитѣ множественно по низменнымѣ лѣсамѣ, такъ же на лугахѣ, разчищенныхѣ въ лѣсу: можно признашѣ его въ Мартѣ, гдѣ тепло, и въ Апрѣлѣ по состоящимѣ на концахѣ вѣтвей одиначнымѣ, иногда попарно сидящимѣ цвѣтамѣ, коихѣ чашечныя лиспы зелены, а къ краю желтоваты и мохнаты. Щипаютѣ расшитѣ это невреднымѣ, хотя

Часть III. Отдѣл. 2. П овцы

овцы онаго и не бдяшъ. Въ сѣно пра-
ва эша не годишся и должно оную
истребляшъ.

66) Многоцвѣтной желтой лютикѣ съ
разнообразными листьями и про-
долговатыми головками плода,
лягушечій перецъ, ядовитая пѣ-
тушья нога, Gift-Hahnen-Fuß, Waßer-
Erpich, Ranunculus sceleratus у Линнея,
находится всюду по болотамъ и углу-
бленнымъ мѣстамъ. Стоволъ у него
шолстъ, къ корню съ рубцами, пря-
мо стоящъ, около 14 вершковъ вы-
шиною, раздѣляется на вѣтви и угло-
вашъ. Всѣ листья на немъ гладки,
нижніе на длинныхъ стебелькахъ
полушарелкою, и раздѣляются на
три губы. Цвѣтешъ весною; цвѣ-
точная чашечка заворочена назадъ
и желтоваша; листья цвѣточные ма-
лы, бледножелты, и медвяная ихъ
ямочка обведена закрайкомъ. Распѣ-
ніе это свѣжее или въ зеленомъ
состояніи составляетъ опаснѣйшій
ядъ; сухое въ сѣнѣ, ешлы не въ
большемъ количествѣ, не вредно, а
ешлы будетъ онаго въ сѣнѣ много,
тогда опасно. Луговщикъ долженъ
оную всюду истребляшъ.

вв) Желвастой лютикѣ съ трехгуб-
ными листьями и назадъ заворочен-
ною цвѣтчною чашечкою, инако на-
зывается рѣпистая пѣтушья нога,
Enol.

knollichter = Wiesen = Hahnen = Fuß, у Линнея Ranunculus bulbosus. Корень его представляе́тъ малой почти круглой шарикъ, изъ котораго внизъ выходя́тъ толстыя жилочки. Прямостоя́щій ство́лъ его бываетъ вышиною вершковъ около семи, угловатъ, мохнатъ, съ вѣтвями и безъ оныхъ; цвѣточные листы у него желты, въ началъ съ зеленоватыми пятнушками, а къ краю иногда нѣсколько разворочены. Во всемъ растѣннiи содержи́тся много остропы, расте́тъ на теплыхъ сухихъ мѣстахъ, по садамъ, полямъ и лѣсамъ, цвѣте́тъ въ Маѣ и Юнѣ, также и позднѣе.

гг) Ползучй лютикъ, съ трегубными листьями и разширенною цвѣточною чашечкою, Kriechender = Hahnen = Fuß, у Линнея Ranunculus repens. Расте́тъ многожественно по перелѣскамъ, лѣсамъ и залежамъ, цвѣте́тъ съ Апрѣля до конца Юня, много сходственъ къ предшедшему роду; почему многіе Ботаники дума́ютъ, что сей онъ онаго выродился. Это также подозрительная шрава, коей равнобѣрно шерпѣшь не должно, хотя она для чело́вѣковъ и не вредною счита́ется.

дд) Прямо стоя́щій многоцвѣтны́й раникуль или лютикъ, съ круглыми цвѣточными черешками и трегубными листьями, Brennender Hahnen = Fuß,

Wannclein, Ranunculus acris у *Линнея*. Растетъ всюду по лугамъ, имѣетъ волокнистой корень, цвѣшетъ въ Маѣ и Іюнѣ, стволъ его бываетъ около 14 вершковъ, больше гладокъ, нежели косматъ, или волоски на немъ плотно къ стволу сидящъ, растетъ вилками, на вѣтви раздѣляясь; и снизу окружается бѣловатыми нагалищами корневыхъ листовъ. Желтые его лоснящіеся цвѣточныя листки оказываютъ на себѣ сзади зеленоватое пяташко, а чашечныя листки стоящъ разширенно, мохнаты, и раздѣляются по длинѣ черною полосю. Когда не голодъ принудитъ лошадей и рогатой скотъ въ недостаточной паствѣ все щипать безъ разбору, оставляющъ они посѣвъ всѣ прочія травы, одинъ только ѣстъ ранункуль. Надлежитъ оной, елико многешвенно въ сѣно попадетъ, къ весьма опаснымъ травамъ; луговщикъ не долженъ онаго щадить.

се) Прямостоящій многоцвѣтный лютикъ, съ трегубными листьями и мохнатыми нагалищами, knollichter Hahnen-Fuß, Groß Blü. Hahnen-Fuß, Ranunculus lanuginosus у *Линнея*. Растетъ на доброй влажной пошвѣ. Листы его сложены подобно какъ у предшедшихъ родовъ и бываютъ почасу съ пятнами; цвѣточныя черешки кругло-

гловапы, чашечные листки разширены, а цвѣшочные листки желшые лоснящіеся. Родъ эшотъ равномѣрно не можетъ быть безъ оспрошы, и хоща на сшарыхъ лугахъ можетъ бышь оспавляемъ, но на новыхъ ошнюдъ не терпимъ.

жж) *Прямостоящій многоцвѣтной лютикъ, съ колючими сѣменами и сложными листами, Acker-Schäpfen-Fuß, Ranunculus arvensis у Линнея.* Цвѣшочные листы его малы, блѣдножелшы. За цвѣшотомъ слѣдуютъ около осьми сѣмечекъ, кои на поверхности своей усажены короткими и швердыми спичками. Корень и сѣмена ѣдкости въ себѣ не имѣютъ, но листы и цвѣшты содержатъ оную въ сильномъ шепенѣ; почему луговщикъ долженъ шраву эшу по лугамъ и пашнямъ сыскивая ишреблять.

жж) *Бѣлой водяной лютикъ, водяная печеночная трава, Ranunculus aquatilis у Линнея.* Находится всюду по прудамъ и водянымъ рвамъ, цвѣшетъ съ Мая до Августа, и покрываетъ все мѣсто свое бѣлыми цвѣшточками. Не рѣдко цвѣшетъ онъ шпорично осенью. Трава и цвѣшты его ѣдки, почему ишкорененіе онаго нужно.

В) *Красномолочникъ, Завилецъ, Чистякъ большій, Чистотѣлъ, по Нѣмецки großes Schöll-Kraut, Schwalben-Kraut, ш. е. ла-*

стовичникъ, Gold-Wurz, у Линнея Chelidonium majus. Трава эша не требуетъ описанія своихъ признаковъ, ибо легко познаваема тѣмъ, что изъ оторваннаго мѣста въ каждой ея части изпекаетъ красноватой шафраннаго цвѣту сокъ. Трава эша, коея сокъ ѣдкаго вкусу, на лугахъ, гдѣ скошину пасутъ, расти не можетъ, но посѣданіи и частомъ поптаніи скоро переводится. Свѣжая она вредитъ рогатому скопу, когда смочена будетъ росю или дождемъ; но когда роса и дождевая мокрота сохнутъ, ѣдятъ оную коровы, естли оной не много, безъ примѣтнаго вреда. Гдѣ она на новыхъ лугахъ появившя, очень размножается и скоро ошъ множества выпадающихъ ея сѣменъ, кои рано лѣтомъ посѣваютъ; почему оную сѣкать должно еще до 24 Іюня.

Примѣчаніе Переводчиково.

Естли трава сія опасна для пищи скотамъ, но весьма нужная по цѣлебной своей силѣ: раны всякія заповоряетъ она чрезмѣрно скоро, естли припаривать ею свѣжею, или засыпать сушеною въ порошокъ; очищаетъ раны ѣдкія, и ничѣмъ такъ скоро не можно залечить садна у лошади. Тысячекрашныя опыты въ домѣ моемъ эшо подтвердили. Полезно всякому Хозяину сѣять оную въ пшенистомъ мѣстѣ и около заборовъ своего сада.

Ма-

Малая ластовичная трава, цынготная трава, денежникъ, по Нѣмцки kleine Schöll-Kraut, Scharbofs-Kraut, Pfaffen-Hötlein, Goldstern Blümlein, дикая ложечная трава Chelidonium minus, scrofularia minor, есть безвредное растѣніе, которая на доброй влажной землѣ въ самомъ началѣ весны пробивается. Гдѣ она разѣ заведется, почти испребишь ее не можно. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ пропадаетъ она по самой корень. Молодые листки ея кладушъ весною въ кушанье и салаты. Шишкованные ея корни внутри мучняны. Г. Гледитшъ сказываеши, что онѣ мололъ ихъ и нашелъ, что можно изъ нихъ дѣлать крупу, по высушеніи оныхъ очень крѣпко.

Г. *Простой луговой склизъ, Rhinanthus crista galli у Лин. Обыкновенное это растѣніе опчаси въ сѣнѣ бесполезно, частью же и за вредное щитаемо быть можетъ. Не знающіе еще этой травы могутъ имѣть въ нижеслѣдующемъ отличительные оной признаки. Стыволъ ея бываетъ съ нѣсколькими вѣтвями, узкими, длиноватыми, кругло-вырѣзанными, темно-зелеными, рядомъ другъ противъ друга сидящими листьями; а на концахъ съ желтыми цвѣтками. Цвѣточнаго листа верхняя губка короче нижней. Засохшія сѣменные головки гремятъ отъ находящихся въ нихъ зеренъ. На многихъ лугахъ составляетъ эта трава, которая высохнувъ совсѣмъ чернѣетъ, почти*

четвертую часѣь расшѣній. Естѣли оная послѣ вспаханія луговъ и обсѣянія оныхъ одною правою опяшъ появишя, должно оную во время цвѣту ея выдерживашъ.

Д) Собачья петрушка, кѣ садовой петрушкѣ сходящуюся склизъ, *Aethusa cynapium*, у Линнея. О расшѣнии эпомъ выше было упомянуто и сказано, что оную легко можно счесать за петрушку поваренную, опѣ которой опличается она только лосковашимъ низомъ лисновъ. Испребленіе оной съ луговымъ склизомъ одинаковое.

Е) Обыкновенная блошная трава, *Perfoliata maculosa* off, по Нѣмецки *das gemeine Blöth-Kraut*, *Kötschel*, *Pfersing-Kraut*. Расшѣнъ множественно на нѣкоторыхъ не слишкомъ низменныхъ лугахъ. Жиловащій ея корень опускаетъ красноватые, вѣшныя, коленчатые стебли, вышиною вершковъ въ семь и десяць, которые, равно какъ и вѣшви, по длинѣ усажены, ланцетно-образными, попеременно сидящими листьями и мохристыми подлищенными. На листьяхъ бываетъ иногда по одному черному или свинцоваго цвѣту пятнушку. Цвѣшетъ въ Іюнѣ и Іюль. Сѣмена ея едва примѣтно треугольны, но больше яйцеобразны, плоски и черноваты. Расшѣніе это для скоповъ подозрительно, когда еще молодо и растетъ бошѣя.

Водя-

Водяной перецъ, ѣдкая блошная трава, Waſer-pfeffer, Wurden-Kraut, brennender Röttig, Hydropiper, perficaria acris, пускаетъ изъ своего равнобѣрно волокнистаго корня много красноватыхъ, или желтозеленоватыхъ, вершковъ въ 7 и выше вѣтвистыхъ стволочъ. Длинные нѣжные цвѣточныя колоски оканчивающъ стволы и вѣтви. Цвѣточки на немъ пурпуровые, а сѣмена треугольныя, лоснящіяся и черноватые. Все растѣнїе имѣетъ сполько оспрой и ѣдкой вкусъ, что въ ошличенїе предшешїй родъ называющъ сладкою блошною правою, Perficaria mitis. Въ Россїи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называютъ оную чечуйная трава. Оба сїи растѣнїя размножаются ошъ сѣменъ, хотя и корень иногда чрезъ зиму живъ бываетъ и опроснаетъ.

Коротко-колосная блошная трава, остролистъ, Perficaria acida lungermanni, Polygonum amphibium у Линнея. Растетъ хотя собственно въ водѣ, такъ что листья ея на оной плаваютъ, а цвѣточные колоски изъ оной торчатъ, но находящся и на берегахъ; однакожь на сухомъ пуши бываетъ она въ жалкомъ состоянїи, растетъ прямо, и моховата въ осязанїи. Въ водѣ же напротивъ растетъ бодро и свѣжа, всюду гладка, и плаваетъ разпростерши свои себбли. Всѣ при рода эшой травы должно испреб-

лять, когда они на разпаханныхъ лугахъ вновь появляшся.

Ж) *Денежникъ, пашенная горчица, Hellerfraut, Klaffer, Leinichel, Thlaspi arvense.* Находяшъ эту негодную траву на нѣкоторыхъ лугахъ, а особливо на тѣхъ, кои подъ зиму были унавожены длиннымъ соломеннымъ навозомъ; также по лугамъ, на которые весной и осенью скошину гоняющъ, попадаетъ иногда во множествѣ, и кажется что сѣмена ея были въ соломѣ, или сѣдены скошиною въ другомъ мѣстѣ, и несваренные изъ желудка были извержены: ибо впрочемъ трава эта расшешъ только на пашенныхъ поляхъ, и ежегодно вырастаетъ отъ сѣменъ, очень рано поспѣвающихъ. Трава сія опускаетъ иногда вершковъ въ 14 вышиною углавшой стволъ, на которомъ попеременно очень плотно сидяшъ желтые или свѣшлозеленые, продолговатые, гладкіе листочки, края которыхъ иногда бывающъ безъ вырѣзокъ, но большею частію съ обширными, но мѣлкими вырѣзками. Стволъ опускаетъ нѣсколько побочныхъ вѣтвей, на концахъ которыхъ и самого ствола малые бѣлые цвѣточки сидяшъ какъ бы пучками. Они мало помалу разцвѣтающъ, и выпягивающъ подобіемъ колоска, на которомъ верхніе цвѣты еще цвѣтутъ иногда, между тѣмъ какъ на нижней части оказываются уже зрѣлые сѣ-

сѣменные спручки. Спручокъ этотъ бываетъ очень широкъ, но гнѣздо его почти половину онаго занимаетъ. Распѣніе сѣе хотя имѣетъ не сильной, но нѣсколько противный чесночный запахъ; овцы на пасвѣ онаго не бѣдятъ, а когда коровы зеленое или сушеное его сѣдятъ, молоко, масло и мясо оныхъ получаютъ отъ него непріятной вкусъ. На лугахъ, гдѣ шрава эта усилился, должно оную скашивать, прежде нежели завяжутся въ спручкахъ ея сѣмена, чтобъ ни одно спѣлое изъ нихъ на землю упасъ не могло. Если же допустишь сѣмена хотя до половины ихъ зрѣлости, удобны уже оныя по выпаденіи на землю всходить. Отъ такового рановременнаго выпаданія сихъ сѣменъ случается, что распѣніе это не рѣдко въ годъ два раза цвѣсти можешь.

- 3) *Пашенная мята* или *полевая мята*, *Mentha arvensis* у *Линнея*. Мы имѣемъ различные роды мяты, на прим. колоскообразную съ зелеными, гладкими листьями, кою называютъ *женская мята*, *Mentha viridis* у *Лин.* головистая мята съ длинными пыльными молодочками, *поточная мята*, кошорая инако называется *конская мята*, *Mentha aquatica* у *Лин.* кошорыя всѣ въ дѣйствіи своемъ очень между собою сходны и въ разныхъ мѣстахъ по полямъ и лугамъ множественно находятся. Искусные Хозяева утверждаютъ,

ждающѣ, что въ особливости первая па-
шенная мята, засушенная съ сѣномъ, при-
ключаетъ, что коровы, поѣвши оной, при-
ходящѣ въ жаръ, но рѣдко или вовсе
никогда не бывающѣ сѣбѣльны. Все расцвѣ-
ніе это космашо. Стебель его лежачъ
на землѣ разосплавшись и опускаетъ
много вѣтвей. Листы яйцеобразно оспро-
ваши, вызубрены подобіемъ пилы; цвѣ-
точные шишечки очень густо усажены,
першавы и гораздо меньше стоящихъ
близъ нихъ листовъ. Цвѣточные листы
синеваты, верхняя губка оныхъ съ глу-
бокимъ вырѣзомъ, и средній вѣзъ вни-
зу уже прочихъ. Запахъ отъ нее проши-
венъ. Сію мяту, по описаннымъ призна-
камъ, отъ прочихъ родовъ легко отли-
чаемую, должно стараться болѣе дру-
гихъ испреблять, хоша и прочихъ шер-
пѣть не должно: ибо всѣ онѣ вообще
обвиняются, что отъ нихъ молоко не
шворожится. Въ собственномъ названіи
мята, извѣстная у насъ подъ именемъ ку-
дрявой мяты, имѣетъ отеческомъ сво-
имъ Сибирь, и содержишся въ огородахъ
нашихъ за весьма пріятное нервы укрѣ-
пляющее и раздѣлятельное лѣкарство.

И) *Рябинка дикая, съ двойными перисты-
ми и разрѣзными листьями, Tanacetum
vulgare.* Растетъ у насъ множественно по
площинамъ, рвамъ и кустарникамъ, слу-
чается на нѣкоторыхъ не очень низмен-
ныхъ лугахъ, опускаетъ твердой, бо-
розд-

роздчатой въ аршинѣ съ четвертью и въ полшора аршина спволѣ. Цвѣты на ней бывають желшовашы, и сидящѣ въ чашечкѣ плотно другѣ съ другомъ; вкусѣ листовѣ ея чрезмѣрно горекѣ. Ушверждають, что шѣльныя коровы ошѣ нее, когда сѣдять оную въ сѣнѣ, выкидываютъ. Надобно думать, что коровы, на довольномѣ корму содержимыя, до оной не коснушя. Гдѣ одно сіе растѣніе заведется, тамѣ разпростирающійся корень ея множество вреда вокругѣ приключаетъ, обезсиливая и умерщвляя смѣжныя злаки и травы, почему луговщикѣ истреблять оную долженѣ.

- I). *Луговой базиликѣ, Binkel-Kraut, Mercurialis у Лин.* Растѣнія сего имѣемѣ мы два рода, растущее не на самыхѣ лугахѣ, но по закрайкамѣ оныхѣ, около плешней и рвовѣ. Съ шѣхѣ порѣ, какѣ начали у насѣ низменные луга и болота осушать рвами, и воду съ нихѣ спускають, оказались оба рода этой травы по нѣкоторымѣ мѣстамѣ на валахѣ около каналовѣ, произшедшихѣ ошѣ выкиданной при копаніи оныхѣ земли, и ошѣ добрыхѣ Хозяевѣ, кои землю изѣ шаковыхѣ валовѣ свозящѣ на низкія мѣста своихѣ луговѣ, по незнанію размножена, и попадаетъ въ сѣнѣ въ кормѣ скотинѣ.

Однолѣтней луговой базиликѣ, потовая трава, по Нѣмецки Schweiß-Melde, Wist-Melde, Speck-Melde, Wein-Garten-Grün, и проч.

проч. *Mercurialis annua* у *Линнея*. Находится почасту въ садахъ нашихъ въ числѣ сорныхъ травъ, также въ шенистыхъ мѣстахъ, по пустырямъ и развалинамъ старыхъ зданій, цвѣтешъ чрезъ нѣсколь-ко мѣсяцовъ лѣтомъ, размножается весьма и единственно опъ сѣменъ. Изъ корня, одно только лѣто продолжающа-гося, выходятъ гибкіе и на многія вѣтви раздѣленные стебли, на коихъ ли-сты сидяшъ рядомъ, гладкіе, яйцеобра-зные, по краямъ съ вырѣзомъ; на кон-цахъ стебля и вѣтвей выходятъ цвѣт-ки колосками.

Многолѣтней луговой базиликъ, *Cynocrambe*, *Mercurialis perennis* у *Линнея*. Трава эта, впрочемъ обыкновенно въ шенистыхъ мѣстахъ расущая, также подъ заборами и по рвамъ, цвѣтешъ въ Апрѣлѣ, имѣешъ прочной, ползучій, да-леко вокругъ себя разпростирающійся волокнистой корень, одинакой вѣтвями, не разпростирающійся низкой стебель, и большіе, длинноватые, моховатые листы. Цвѣточные колоски опускающъ равнобрно изъ угловъ другъ другу про-тивостоящіе листы. Есть примѣры, что бѣдные люди листы этой травы варили съ капустою, и пѣли себя отпра-вили. Латинское названіе оной значить мышьяковую траву. Луговскихъ дол-женъ потому какъ на старыхъ, такъ вновь разпаханныхъ лугахъ травъ сихъ не

не осшавляшь, и срѣзывать оныя до цвѣту или во время онаго, чшобѣ не могли принесть сѣменѣ и оныхѣ разсѣять.

К) *Ситникѣ, Жабикѣ*, *Iuncus* у *Лин.* Мы раздѣляемѣ ситникѣ на два главныхѣ рода: на имѣющій сшебель голый, и на шаковый, который имѣетѣ сшебель сѣ ли-спами. Послѣдняго роду ситнику, мно-жесшвенно на лугахѣ бывающаго, и сѣ сѣномѣ вѣ кормѣ скошинѣ попадающаго, естѣ одинѣ родѣ скошу вредный, пошому чшо приключаетѣ запорѣ, такѣ чшо продолженіе кормленія сѣномѣ, вѣ кошоромѣ онѣ естѣ, можешѣ наконецѣ ско-памѣ и смершѣ приключишѣ. У насѣ вѣ окрестности естѣ возвышенныя луга, на которыхѣ ситникѣ половину правы сосшавляетѣ. Именно эшо *волосистой ситникѣ*, или *волосистая лѣсная жабья трава*, *Iuncus pilosus* у *Линнея*. Лиспы у ней, какѣ у пырея, которыхѣ много изѣ корня выросшаетѣ, другіе же сидятѣ на сшеблѣ: они плоски, доволь-но широки и волосами усажены. Сшебель бываетѣ около аршина вышиною, изѣ кошораго и верхней части сучковѣ выходяшѣ многіе слабыя черешки, раз-дѣляющіеся на неравныя опроспки, и на послѣднихѣ бываетѣ по одному цвѣтку, иногда больше, но всѣ вообще представляющѣ плоскій хохолѣ; при цвѣшкахѣ сидятѣ малыя, бѣловашыя, сухія чешуйки, каковыя оказывающыяся и вѣ

въ шѣхъ мѣсахъ, гдѣ сучки раздѣлились, а на шѣхъ мѣсахъ, гдѣ цвѣточныя черешки производящъ, бываетъ по два неравныхъ лиска. Лисы у ней бывающъ иногда шире, иногда уже, а сѣбѣ выше и ниже, однакожъ обѣ одинъ родъ травы составляютъ. Луга, множественно этою травою поросшіе, должно подвергать обмѣнной пашнѣ, (что это значить, писано въ I Части, при описаніи различныхъ пашенныхъ системъ), дабы паханіемъ оную испребишь. Когда же нѣтъ къ сему ни склонности, ни способности, то сѣно такое задавая въ кормъ скотинѣ, давая коровамъ зелени, какъ-то капустныхъ листовъ, рѣпы и каршофелей, отъ чего ихъ очень слабишь. Если для коровъ готовишься кислая капуста, и она начнется въ задачу имъ итти послѣ Рождества, когда уже ни какой зелени не бываетъ, уничтожаетъ она вредное дѣйствіе сѣна, съ сѣнникомъ смѣшаннаго.

Л) Желтомахорочникъ, ястребинная трава, Hieracium у Линнея. По раздѣленію Ботаниковъ имѣемъ мы оной многіе роды, кои можеть быть не всегда особливые, но производящъ только отъ различія пошвъ земли. Между оными опишу я здѣсь только такъ называемую ползучую, одноцвѣтную ястребинную траву, инако мыши ушки назы-

твертью разстояніемъ по длинѣ, а въ такомъ же разстояніи и въ ширину пашни борозды пронаживаются. Можно съ выгодою послѣ перваго окопанія маисовыхъ кушовъ въ произшедшія отъ того углубленія въ промежкахъ высаживать свеклу. Свекла бѣлой и красной и Бургонской рѣпа очень полезно, когда съ поверхности ихъ корней землю сгребать, копорую при дальнѣйшемъ вскапываніи земли къ испребленію сорныхъ травъ всегда пригребаятъ къ сиволамъ маиса. Также и большая водяная рѣпа или шурнипсъ удаеися лучше, когда съ поверхности ея корни земля будетъ сребена. Можеть она по тому очень хорошо росши между маисомъ, но только не пересаженная изъ высадковъ, но сѣменами посаженная. Часть сихъ сѣменъ можно сажать вмѣстѣ съ маисомъ, дабы рѣпа въ пищу людямъ и скотинѣ поспѣла къ жатвѣ ржаной. По выкопаніи рѣпы, должно тотчасъ посадить на мѣста ея капустные высадки или росаду, съ коихъ вскорѣ листья обламываются въ лѣшній расходъ, а для вишня кочней можеть она на этомъ мѣстѣ оспаваться до зимы по снятіи маису.

Можно еще, у кого есть въ полѣ цѣлыя загоны земли твердой или нѣсколько связной, и есть намѣреніе оныя обрабатывать, поступать слѣдующимъ образомъ: вспахать землю подъ зиму высокими грядами, а весною начиспо проскородить.

Часть III. Отдѣл. 2. Ж. Есть

Есѣли земля рано опойдетъ, то въ исходѣ Марта или началѣ Апрѣля, оную еще пробороишь дважды, и еще разъ въ концѣ Апрѣля выравнишь бороною, и глуды всѣ раздобишь. Потомъ подблавъ борозды на полшора аршина между собою разстояніемъ, сѣяшь въ ведреной день. Разстоянія по бороздѣ между каждымъ сѣменнымъ зерномъ должно полагать отъ 5 до 9 вершковъ. Въ бороздѣ напыкаются палкою ямочки, и кладутся въ каждую по два зерна. Есѣли оба зерна взойдутъ; слабѣйшее выдергивается вонъ; гдѣ же не взойдетъ ни одно, сажается вновь. Когда расшѣнія выбѣгутъ вершка въ полшора или два, прорывають ихъ тамъ, гдѣ они споятъ часто. Къ отвращенію травъ сорныхъ пропахивають между бороздъ, пуская сошникъ очень мѣлко. Когда же спволы выроснутъ выше, пахутъ тогда глубже, и землю приворачивають съ обѣихъ сторонъ къ расшѣніямъ. Въ третій разъ пахутъ, когда травы негодныя вновь опроснутъ; а есѣли будутъ дожди, пахутъ и въ четвертой разъ. Кію пожелаетъ производить дѣйствіе это ручною работою, въ этомъ случаѣ прокапываютъ борозды только на 10 вершковъ между собою разстояніемъ. Въ половинѣ Іюня взрывають крюкомъ землю около расшѣній маисовыхъ, которая мало по малу сама собою сваливается къ корнямъ въ глубинѣ бороздъ стоящихъ расшѣній, оныя

оныя освѣжаетъ и укрѣпляетъ. Въ концѣ Іюля вскапываютъ землю въ послѣдній разъ, и пригребаютъ къ сѣволамъ маиса.

а) Хотя молодыя маисовыя растѣнія, отъ ночныхъ морозовъ поврежденныхъ, и опрыскиваютъ отъ корней, но отъ того слабѣютъ; почему полезнѣе сѣять оныя не очень рано. Однако на возвышенныхъ глинистыхъ, и пошому не очень къ плодородію способныхъ пашняхъ, лучше сѣвъ производишь ранѣе, въ исходѣ Апрѣля, дабы растѣнія до наступленія лѣтнихъ жаровъ росомъ укрѣпились; ибо тогда почашки меньше отъ солнечнаго жара шерпятъ, обще съ сѣвами бываютъ толще и лучшія зерна приносятъ. Лучше также на земляхъ помянутаго роду сѣмена сажаютъ не на возвышеніяхъ, отъ бороздъ клешками пропахиваемыхъ произходящихъ, но на равной землѣ, дабы корни довольно углубились, и тѣмъ лучше прошивостояли могущей случиться засухѣ. Напрошивъ на влажныхъ пашняхъ лучше сѣмена сажаютъ въ шаковыхъ возвышеніяхъ; ибо хотя маисъ продолжительную мочливость лучше, нежели наши обыкновенные роды хлѣба, выдерживаетъ, однакожъ отъ весьма излишней мокроты можетъ въ иные годы вредъ потерпѣть.

б) Дабы растѣнію маисному, сполько много зеренъ принесъ и усовершилъ

имѣющему, не было недоспѣлка въ по-
требныхъ къ тому земляныхъ сокахъ,
нужно необходимо землю очищать отъ
всякихъ шравъ, посредствомъ вскапы-
ванія крюкомъ или мошьюкою. Для са-
маго сего должно, по содержанію боль-
ше тучной земли, расшѣнія маисовы
сажать между собою въ довольноомъ раз-
стояніи, чѣмъ одно у другаго пиша-
нія не опшнмало.

в) Къ сему же самому намѣренію нужно
всѣ побочные опроски отъ главнаго
корневого ствола опрывать. Если
по упущенію, произойдутъ лишь сла-
бые початки, кои при томъ поздно по-
спѣютъ. Ощипанные опроски соспа-
вляють доброй кормъ скошинъ, либо
свѣжіе, или засушенные къ зимѣ, кои
дойнымъ коровамъ можно давать ока-
тивъ и разпаривъ варомъ.

г) Цвѣточный хохолокъ отъ початка оп-
дѣленъ, и составляетъ верхнюю часть
ствола. Если оной рано срѣзать, по-
чатки останутся безъ зеренъ; почему
онѣ хохолки, для умноженія скопскаго
корму, должно не прежде срѣзывать,
какъ уже цвѣшны на нихъ завянутъ,
а зерна въ початкахъ нѣсколько зашвер-
дѣютъ, и оболочка, съ наружности покрыва-
ющая початки, вздуется, и какъ бы
треснетъ. Но не должно срѣзывать
всѣхъ вдругъ; ибо есть еще неплодо-
но-

ношенныя почашки, кои позднѣе другихъ выросли. Оспавшіе почашки могутъ быть оплодошены, хотя бы одинъ цвѣточной хохолокъ оспоялъ отъ нихъ сажени на три. Если же обрѣзашъ хохолки очень поздно, вредно то почашкамъ. Вскорѣ по обрѣзаніи хохолоковъ, служащихъ въ кормъ, оципываютъ и всѣ лисы съ негодными и слабыми почашками, и отдающъ въ кормъ скопінъ. Отъ оципанія листовъ почашки прибавяшся, зерна въ нихъ учиняшся крупнѣе, и скорѣе выспѣваютъ. Обрѣзываніе хохолоковъ можешъ производимо быть въ концѣ Іюля и началѣ Августа.

д) Когда случашся большія грозы съ бурями, могутъ отъ нихъ рослые маисовые сѣвоны, почашками своими обремененные, особливо на рыхлой землѣ распуштіе, быть повалены, и корни ихъ обнажены. На шаковой землѣ расптніа маисовы при вскапываніи должно землею обсыпать у корней повыше, дабы не нужно было въ случаѣ, когда ихъ бурей повалешъ, опять поднимать и обсыпывать землею.

е) Въ концѣ Сентября можно прибирать маисъ. Опламываютъ тогда почашки съ кожаной ихъ оболочкою, вылупляютъ изъ оной, и обнаженные почашки кладутъ сушить на солнцѣ или на огнѣ

крытомъ мѣстѣ. Можно же оныя взнѣзывать на снурки, или связывать въ пуки, и такъ вѣшать къ засушиванію.

ж) Въ Италіи и Испаніи имѣютъ особливя машины къ ошдѣленію ошѣ початковъ зеренъ, коихъ молошьюкою ошбить не можно; а въ Америкѣ обиваютъ оныя въ деревянныхъ снупахъ деревянными песнами. Есѣли будутъ они шолчены умѣренно, сбивается припомъ и лузга съ зернѣ. Сперва размачиваютъ высушенныя зерна, или щѣблые початки съ зернами, немножко въ водѣ, чѣобъ по ошвогли; потомъ шолкутъ въ снупѣ. Песнѣ для сего привязывается къ шешу, укрѣпленному на перевѣсѣ въ сараѣ, подобно какъ щѣпникъ у щѣпа; чѣмъ работа шолченія весьма облегчается; шолкутъ симъ песномъ умѣренно, чѣобъ шолько сбить лузгу съ зернѣ. Послѣ лузгу спалываютъ ночвами, и такъ ошанушя зерна, ошѣ умѣренного шолченія раздробившіяся, подобіемъ крупы, но не въ муку разсыпавшіяся. (Могутъ къ сему служить обыкновенныя кресѣянскія ступы, въ которыхъ опалкиваютъ просо). Можно же ошдѣлить лузгу ошѣ зернѣ щелоченіемъ, наливая на нихъ обыкновеннаго зольнаго щелоку, которой лузгу стонитъ. Зерна потомъ ополаскиваются нѣсколько разъ въ чистой водѣ, ошѣ чего щелочнаго вкусу въ нихъ совѣмъ не будетъ. Таковымъ образомъ облу-

облупленные маисовы зерна составлять родъ гороху или крупъ.

- з) Естли желасмо зерна съ почашковъ ошдѣлишь безъ напряженія силъ своихъ, тогда ихъ соскабливаютъ, а именно: надъ кадкою привязываютъ поперекъ какое нибудь желѣзко, ребро имѣющее (острой дубовой брусокъ равно служитъ), и укрѣпляютъ оное твердо къ бокамъ кадки, насавляютъ почашокъ на ребро желѣзка и дергая къ себѣ, оскребаютъ тѣмъ зерна въ кадку. Толченіемъ же въ ступахъ много зеренъ повредить можно, равномерно и оскребаніемъ. Почему, кто хочетъ зерна сѣи сохранить на многіе годы въ бочкахъ, или плотныхъ ларяхъ подъ кровлю, или въ житницѣ не вредимы, должно къ сему оныя въ зимніе вечера обирашь съ почашковъ руками. Ошкрыто въ закромы маисовыхъ зеренъ сыпать не должно; ибо крысы и мыши до тѣхъ поръ будутъ прочія хлѣбныя зерна презирать, пока маисъ будетъ въ амбарѣ. У кого къ сбереженію маиса количество не великое, можетъ пошѣ всего лучше связавъ въ пучки цѣлыя почашки, привѣсиль на шнуркахъ къ пошолоку; оныя сохранятсѣ на многіе годы и звѣрки сѣи оныхъ не достанутъ. Сѣверные Американцы хранятъ почашки въ ящикахъ, содержащихъ въ длину 15 и 16 фушовъ, шириною во днѣ въ 5 и 6 фушовъ, и вверху въ кровлѣ въ 6

и 7 фушовъ, сдѣланныхъ изъ досокъ, въ полтора и два вершка толщиною, у которыхъ въ углахъ, гдѣ онѣ связаны, проверчены скважинки шаковыя, чшобъ зерна выпадашь не могли, а воздухъ бы свободно проходишь могъ. Сіи ящичи стоятъ на онкрышомъ воздухъ, подъ соломенною крышкою онъ дождя. Однакожь легко поняшь можно, что въ шаковые ящичи зеренъ, съ почашковъ оскребенныхъ, больше улечься можешъ.

и) Хлѣбъ, печеный изъ маисовыхъ зеренъ, сполькожь здоровъ, какъ и вкусенъ. Знамениныя Американцы не бдяшь инаго хлѣба, не взирая на то, что у нихъ пшеница и рожь шаковы же хороши, каковы шокмо у насъ бышь могущъ. Но мы находимъ, шакъ сказать, хлѣбъ изъ маису недоснашочнымъ, и на эшомъ концѣ мѣшаемъ маисную муку со пшеничною и ржаною, дабы она недоснашочнаго вкуса имѣшь не могла. *Пормантье* училъ въ Парижѣ, какъ слѣдующимъ образомъ печь хлѣбъ изъ одной маисной муки: размѣшиваешь муку изъ нее на самой горячей водѣ, пока сдѣлается тѣсто; въ эшомъ тѣстѣ выдавить ямку и наливъ пивныхъ дрождей, дашь киснуть. Когда тѣсто поднимешся или взойдетъ, разминаешь его, ш. е. валяшь въ холодной водѣ, и на глиняныхъ сковородахъ, подложивъ капустные листы, запекашь въ печи. *Манетти* въ сочиненіи о раз-
ныхъ

ныхъ родахъ хлѣба между прочимъ извѣщаешъ, что въ Веронезѣ пекутъ изъ маисной муки малыя лепешки съ разными приправами, *чалети* называемыя, и кои продающъ въ городахъ по улицамъ во всякое время. Такъ называемая *полента* Италіянцовъ, кошорая нынѣ и при дворахъ Государей нашла охотниковъ насебя, пригошовляется изъ маисной муки. Дѣлается изъ оной крушое тѣсто, разрѣзывается на четвероугольные куски, и поджаривается на сковородѣ въ маслѣ. Это печеніе можно въ Неаполѣ найши у всѣхъ пирожниковъ;носятъ оное по улицамъ, и опъ всѣхъ Италіянцовъ найдено сполькожъ вкуснымъ, какъ и здоровымъ. Но кажешся, что для полентовъ, поелику оныя въ маслѣ поджаривающся, пошребенъ желудокъ не слабой.

- і) По опытамъ въ Нѣмецкой землѣ до нынѣ шомъ хлѣбъ на сполѣ особъ срсдственнаго состоянія имѣлъ больше одобренія, въ кошоромъ на одну часть маисной муки положено двѣ части пшеничной или ржаной муки. Хлѣбъ эшомъ полезенъ опъ шугаго живота, ибо содержитъ всегда ушробу опшверзшу. Муку маисную для онаго разваривающъ, какъ кашу размазню, и на эшомъ замѣшивающъ пшеничную или ржаную муку. Полосмины пополамъ маисной муки со ржаною для служняго спола лучше, нежели

два четверика съ половиною чистой ржаной муки. Простые деревенскіе жишели варяшъ и пыквы, въ которыхъ нагнѣшено пѣспа изъ маисной муки.

к) Пріуготовляюшъ изъ этой муки добрую кашицу и супы. Американцы и Англичане приготавливаюшъ изъ маисной муки нѣкоторой родъ скорбила или шлокна, которое возятъ съ собою въ дальнихъ путешествіяхъ, дабы на всякомъ мѣстѣ имѣть на скорую руку кушанье.

л) Пріуготовляюшъ доброй супъ, когда маисовы зерна въ сипуѣ или иготѣ budúшъ ошолчены, лузга съ нихъ сбита, а самыя ядра разшолчены въ крупную крупу, и нѣсколько времени поварены въ каштрюлѣ; потомъ положено будешъ мяса, и еще нѣсколько уварено. Супъ этотъ подобенъ бываетъ гороховому, какъ и вообще зерна сіи могушъ служить вмѣсто бѣлаго гороху. Ежели супъ этотъ выдешъ густъ, подбавишъ преснаго молока, и еще взогрѣшъ на огнѣ.

м) Такъ называемое *крѣпительное кушанье* приготавливается изъ маису въ Америкѣ таковымъ образомъ: выколупленные изъ початковъ зерна поджариваются въ горячемъ пескѣ или пеплѣ, или въ печи по вынущіи хлѣбовъ. Дикіе, не имѣющіе печей, выкапываютъ ямку въ пескѣ или на огнищѣ, всыпаютъ въ оную зерна, засыпаютъ пескомъ или золою, разкладываютъ надъ оною огонь, и такъ под-
жа-

жариваютъ. Поджаренныя зерна толкутъ по вышеписанному въ деревянныхъ спупахъ въ ядреную крупу, послѣ спалываютъ отскочившую лузгу; крупу эту перемѣшиваютъ съ сахаромъ, и въ мѣшечкѣ или inomъ чемъ берутъ съ собою въ дорогу. Путешествующій дикой проголодавшись, кладетъ горсть сего, шакъ сказать, шолокна, разбалшываетъ на водѣ и ѣстъ. Другіе сбиваютъ съ зеренъ лузгу щелокомъ, высушиваютъ, и эшоу родъ крупы варятъ дорогою по подобію кашицы, съ прибавкою сала. Простой народъ въ Америкѣ ѣстъ муку изъ сушеныхъ маисовыхъ зеренъ, также и самыя зерна размочивъ въ водѣ, безъ всякаго варенія. Въ Европѣ и крестьянину шакое кушанье не очень понравилось. Впрочемъ Американцы жарятъ еще сырыя початки маисовы на угляхъ, или варятъ въ коровьемъ маслѣ съ солью зерна сорныя, и считаютъ за вкусное блюдо. Италіянцамъ и Испанцамъ также понравилось эшо Американское кушанье.

н) Но каковую пріятную ясшву для спола людей средшвеннаго состоянія составляетъ маисная крупа, во вкусъ манныхъ сѣменъ, и какъ оная готовится, о томъ писано будетъ во второй половинѣ сего сочиненія, въ Часпи IX, во второй главѣ, въ окончаніи оной. Писано же въ шрешей Часпи

des Wittenb. Bechenbl. S. 13, что изъ маису пригошворяемыя среднія и мѣлкїя крупы въ мясной похлебкѣ шаковой хорошій вкусъ имѣють, что оныя легко можно счесать за сѣно.

о) Можно же варить доброе пиво и гнать вино обыкновеннымъ образомъ изъ маисныхъ зеренъ. Но шолько роженіе изъ нихъ солоду продолжительно, и должно давать оному пророснуть до шѣхъ поръ, какъ корешки, зернами выпускаемые, зеленѣть начнутъ. Сверхъ того зерна въ сложеніи должно почасту, и есѣли можно, ежедневно споласкивать водою, и шѣмъ препенсывать нечистотѣ.

п) Выше сказано, что маисовы лисы какъ свѣжіе, такъ и сушеные составляють очень доброй кормъ коровамъ. Лошади также охотнѣе ѣдятъ оныя, нежели обыкновенное сѣно. Но сушеные лисы питають лошадей больше, когда ихъ крошить въ рѣзку, и пересыпать лузгою или мукою маисовыхъ зеренъ. Въ нашихъ мѣстахъ для сего свѣжаго и сухаго корму коровамъ и лошадямъ начали маисъ въ полѣ сѣять, и единственно шолько для листовъ, кои по оборваніи ояшь опростають, есѣли заблаговременно будущъ ошипаны. Но пашня подъ маисъ, для листовъ однихъ, а не для полученія зеренъ сѣемый, должна бытъ лучшая, и подкрѣплена

до-

довольнымъ навозомъ, чѣмъ не обезсилѣла.

- р) Молодые спволы маисовыхъ распѣній, прежде вымешанія на себѣ почашковъ, содержащъ въ шрубкахъ между колѣнцовъ очень сладкую воду, изъ которой въ Америкѣ и Италіи вываривали сыропъ и сахаръ, не уступающій получаемому изъ сахарныхъ тростей. Но понеже Господинъ *Маргграфъ* изъ разныхъ домашнихъ распѣній сахаръ извлекалъ, и нашелъ, что трудъ и изживеніе, къ тому потребныя, дороже становящаяся покупка обыкновеннаго сахару, а пошому въ разсужденіи маиснаго сахару вычислилъ, что прибыльнѣе спволы онаго оставлять приносить зерна, нежели срѣзывать ихъ на сахаръ. Однако прошиву сего Г. фонъ *Юсти* напоминалъ, что это можешь быть такъ лишь въ разсужденіи маису, на песчаной почвѣ земли растущаго; но для извлеченія сахару совѣшуетъ маисъ сѣять на болошисныхъ, влажныхъ и шучныхъ пашняхъ, на каковыхъ оной мало почашковъ приносить, но сильно распешъ въ спволы и листы, а въ такомъ состояніи употребляется настоящему сахарному тростнику, и въ колѣнцахъ своихъ содержитъ больше соку.
- с) Въ Америкѣ дикіе употребляютъ сухіе маисовые спволы вмѣсто колосьевъ, къ обгораживанію мѣстъ и покрыванію своихъ

ихъ шалашей, каковыя кровли безъ сомнѣ-
нiя прочнѣ здѣшнихъ нашихъ соломен-
ныхъ. Поелику же у насъ недоспапокъ
въ лѣсахъ спановишся опчасу чувствви-
тельнѣ, то и въ эшомъ намѣренiи раз-
водъ маису полезенъ; для того что тол-
стые его стволы по спасканiи въ ку-
чу и засушенiи на ошкрышомъ воздухѣ,
могутъ нѣсколько лѣтъ лежать безъ
поврежденiя, и очень хорошо служить
вмѣсто дровъ.

ш) Напослѣдокъ похваляющъ въ маисѣ и
то, что зерна его въ кормленiи скота
всѣхъ другихъ родовъ зерна превосхо-
дять. Лошади ѣдятъ маисовы зерна
очень охотно; но по смолотiи въ муку
хруско, въ пересыпкѣ мѣра ихъ больше
доставляетъ питанiя, нежели вдвое
столько овса. Господинъ *Кальмъ* пи-
шетъ, что маисъ очень полезенъ для
худыхъ лошадей, которыхъ наскоро
ошкормить пожелаешь; но овесъ полез-
нѣе для лошадей верховыхъ въ дорогѣ.
Онъ же одобряетъ маисовы опруби и
муку къ ошкармливанiю воловъ и коровъ.
Внутренний стержень почашковъ маисо-
выхъ, по обколупанiи зеренъ, соспа-
вляетъ еще добрый кормъ воламъ.

Овцы также охочи до маисовыхъ зе-
ренъ, а свиньямъ составляетъ они
лучшiй кормъ; ибо свиньи не токмо опъ
того жирны опѣдающа, но подобно
ошкармливаемымъ оными воламъ полу-
чаютъ

чающѣ мягкое, бѣлое, жирное и вкусное мясо. Въ Неаполишанской свинѣ обыкновенно вѣсомъ бываетъ 12 пудъ съ половиною, а опкармливають оныхъ по два мѣсяца маисомъ. Но маисъ должно давать рогатому скопу, такъ овцамъ и свиньямъ, разполокши.

Крупнымъ домовымъ птицамъ даютъ маисовы зерна цѣломъ, а мѣлкимъ разполокши. Оныя отъ корму сего жирѣютъ и дѣлаются вкусны. Во Франціи уважаются каплуны Бресскіе. Въ нихъ бываетъ вѣсомъ фунтовъ по 12, а опкармливають оныхъ единственно маисомъ. Я для опыту опкармливалъ маисомъ индѣйскихъ пѣшуховъ: оныя не шокмо въ короткое время опмѣнно опжирѣли, но получили мясо и жиръ такъ бѣлы и вкусны, какъ въ лучшихъ разкормленныхъ пулардахъ бываетъ. Нынѣшнею весною у шрехъ моихъ сосѣдей вывелись въ одно время молодые куры, изъ кошорыхъ одинъ кормилъ ихъ мѣлко разшолченными зернами маисовыми, прочіе же оба упошребляли къ шому опчасши гречишную кашу, часшью же просо. Чрезъ 8 недѣль первыя, вскормленныя маисомъ, почти шрешью выросли прочихъ больше, не взирая на то, что и за оными былъ добрый присмотръ. Тотъ Хозяинъ, у кого были въ запасѣ маисовы почашки, нарочно для молодыхъ индѣекъ въ жишницѣ связками привѣшен-

шенныя, сдѣлалъ въ доскѣ скважину, поменьше толщины почашковъ, и въ сную всовывая почашки, зерна съ нихъ обтиралъ. Къ раздробленію же сихъ зеренъ упошреблялъ вѣшхую кофейную мѣльницу, привинтивъ оную къ стѣнѣ надъ ящикомъ, въ копорой сыпались перемоланныя крупинки. Онъ въ короткое время безъ труда смололъ полчетверика маисовыхъ зеренъ. По перемолотіи оныя составили мѣлкую крупу, которую мѣшалъ онъ имъ въ кормъ съ рубленою зеленью, какъ-то кропивою, полынемъ, наконецъ съ капустными листьями, салатомъ и тому подобнымъ. Старымъ индѣйкамъ насѣдкамъ давалъ онъ ежедневно по двѣ горсти маисовыхъ зеренъ цѣлкомъ, остъ чего онъ вода цыплятъ, еще много яицъ нанесли къ упошребленію въ пищу. Эпотъ Хозяинъ обладеживалъ меня, что индѣйскихъ куръ заводъ у него за нѣсколько лѣтъ уже поправился, съ шѣхъ поръ, какъ началъ онъ ихъ кормить маисомъ.

Н. Просо.

Мы имѣемъ просякое просо, бѣлое, желтое и черное, *Panicum miliacium* у Линнея, *Semine albo, luteo et nigro*. Бѣлое просо по созрѣніи хопя изъ кистей своихъ больше выпекаетъ, нежели другіе онаго роды, однако у насъ при великомъ онаго сѣвѣ по шому предпочитается, что каждой крестьянинъ имѣетъ у себя въ домѣ спугу,

пу, а оное скорѣе и легче опалкивается, нежели желтое и черное, пошому что лузга его меньше къ ядру прираснаетъ. Гдѣ больше сѣюшъ желтаго проса, которое и краснымъ называющъ, возятъ оное во пшено опалкивать на мѣльницы, имѣющія шолчеи, и кромѣ супалковъ, принуждены бывающъ за передѣлъ мѣльнику плашину денеги, или давати лопашку (мѣра) изъ пшена. Черное просо, которое называющъ и космашымъ, шакъ какъ красное, именуемое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кисшиснымъ, шруднѣе опалкивается, почему и оное, у кого въ большемъ количествѣ, на мѣльницу же возитъ принуждено бываетъ. Но эшотъ родъ проса предъ обѣими предшесшими имѣетъ то преимущество, что ншшцы въ полѣ меньше на оное нападающъ. Впрочемъ вкусъ всѣхъ шврехъ родовъ между собою не различествуетъ, кромѣ штого, что пшено изъ бѣлаго проса мягче, или больше разваривается; но пшено изъ двухъ прочихъ родовъ въ варенье не шакъ разпускается, однакожъ не швердо остаетъ, что многимъ больше нравится. Но бѣлаго проса пшено должно бытъ въ цѣльныхъ зернахъ, и по легкомъ ошолченіи переполанное. Поелику лузга на немъ мягче, нежели на желтомъ и черномъ просѣ; што при неосшорожномъ опалкиваніи много зеренъ раздробляется, и даже въ муку превращается. И ешшли ошпанетъ въ нихъ подсѣвочная мука, будетъ шаковое

пишено не сполько вкусно. Естѣли же по ошолченіи и сполоніи оное просѣяшъ, тогда выдетъ самое чистое.

На тучной землѣ просо не шаково хорошо родится, какъ на легкой песчаной пашнѣ, или суглинкѣ. Оное за нѣсколько вѣковъ перешло къ намъ изъ Индіи, и по сихъ поръ еще ошчизны своей не забываетъ, что вообще съ маисомъ больше пребываетъ жару и теплоты, но шѣмъ меньше холоду сносить можетъ. Оное морозомъ легко побиваетъ; почему въ сѣверныхъ странахъ и не сѣютъ оное до половины Мая.

Гдѣ пашни по обыкновенному раздѣляются на три клѣина, шамъ сѣютъ просо ошчаспи въ яровомъ клѣину, часшью же въ паровомъ; почему жнивье подъ него вспахиваютъ взметомъ еще съ осени, весною же двоятъ и скородятъ. Въ нѣкопрыхъ мѣстахъ сѣютъ оное, вспахавъ по свѣжимъ бороздамъ; въ другихъ же, какъ-то и у насъ (въ верхней Саксоніи), землю подъ просо вскапываютъ засшупомъ. Послѣднее приноситъ здѣсь шроякую выгоду: 1) по вскопанной землѣ просо урожается вдвое и шрое лучше, нежели по самому лучшему вспаханію; 2) на вскопанной пашнѣ выходитъ несравненно меньше сорныхъ шравъ, нежели на паханной, чрезъ что облегчается полоніе, такъ что едва только четшвершая доля времени и людей послѣ засшупа къ тому употребляется; 3)

Вско-

вскопанная земля послѣ проса приноситъ самую тяжеловѣсную и чистую рожь, да и послѣ ржи къ дальнѣйшимъ сѣвамъ оказывается безъ унавоживанія еще хлѣбородною. Гдѣ случатся ляды, ш. е. разчисли изъ лѣсовъ, или залежи, и земля не слишкомъ шучна, шамъ въ первой разѣ засѣваютъ оныя просомъ, и можно навѣрное ожидать добраго урожая.

Что писалъ я прежде о гречихѣ, что она на холодной пошвѣ земли лучше урожаешся, нежели на теплой, это должно въ разсужденіи проса приниматьъ на оборотъ. Оное лучше любишь теплую землю, нежели холодную.

Экхартъ пишетъ: просо есть нужнѣйшій плодъ, каковой шокмо Хозяинъ въ Нѣмецкой землѣ сѣять можетъ. — Чпожъ земледѣльцы мало у насъ прилежають къ посѣву онаго, конечно происходитъ отъ незнаія доброты сего плода, а не меньше того носящееся въ народѣ мнѣніе виною того; ибо ни о какомъ хлѣбѣ нѣтъ столько шуму, что оной подверженъ частымъ неурожаямъ, головнѣ, разхищенію отъ птицъ, выпаданію, пусдозерницѣ, и тому подобному, отъ чего будто бы есть таинственныя средства; а это суевѣріе и отвращаетъ многихъ отъ посѣву онаго. — Средства же къ посѣву плода сего ниже слѣдующія:

Когда взявъ самага сѣлаго, тяжеловѣснаго, одноцвѣтнаго и въ сухомъ

мѣспѣ содержаннаго проса гарнцовѣ 6 или чешверикѣ, и смѣшавъ съ 7 чешвериками самой мягко перепершой земли, а потомъ высѣявъ весною на мѣрѣ земли въ 25920 квадратныхъ фушовъ, или безъ мала на двухъ десятинахъ, рыхлой мягкой земли, по свѣжей вспашкѣ, и щцательнѣ заборонишь; взойдетъ оное все равно, а особливо есѣли вскорѣ попомъ дождь случится, ни одно зерно не загложнетъ въ землѣ, и не будетъ въ немъ двоякаго всходу. Пашня сѣя должна бытъ во вторѣ разѣ по унавоженіи обсеваема, на копорѣ въ первой сѣвѣ табакъ посаженъ былъ, копорымъ земля весьма отъ сорныхъ травъ очищается, чрезъ это просо освобождено будетъ отъ многаго выпалыванія, и можетъ принести 50-кратный и споричный плодъ. Первѣйшая уловка и главное наблюденіе за нимъ во время жатвы. —

Къ этой *Экхартовой* теоріи долженъ я лишь сѣе напомнать, что здѣсь посѣвъ по его предписанію проса между прочимъ имѣетъ цѣль предмѣтъ, что въ пашню освободишь отъ сорныхъ травъ, къ удобнѣйшему посѣву слѣдующихъ попомъ хлѣбовъ; однако у насъ послѣ табаку проса не сѣютъ, а пшеницу или рожь. Правда, что этотъ *Экхартовъ* образъ земледѣлія способенъ въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ землю не заступомъ вскапываютъ, но плугомъ или сохою обрабатываютъ.

Просо

Просо есть расшѣніе, которое отъ излишняго унавоживанія, подобно другимъ хлѣбамъ, валяшся или полегашъ не можешъ, развѣ только очень часто будетъ посѣяно, отъ чего оное на доброй сильно угобженной землѣ хотя очень высоко вырастаетъ, но бываетъ понкобыло, и пошому отъ сильнаго дождя и вѣпру валяшся должно.

Въ здѣшнемъ мѣстѣ по свѣжему и многому унавоженію просо разсѣваюшъ рѣдко, чшобъ оное большекушилось, или много побочныхъ опраслей оппускало. Оное получаетъ отъ сего шолсшую солому, какъ шросшникъ, и легко сопротивляется сильнымъ дождямъ. На возвышенныхъ горячихъ супескахъ подъ просо возимъ мы свиной навозъ, кошорой очень охлаждаетъ въ иныя же мѣста коровій навозъ, и шопчасъ свѣжій закапываемъ въ землю. Ештли земля не слишкомъ уже влажна, сѣву до шѣхъ поръ не оплагаюшъ, пока вся десятина вскопана будетъ, но по участкамъ, сколько вскопано, сѣюшъ, и сѣмена загребаюшъ граблями, пока солнцемъ шо мѣспечко не осушило, а шѣмъ всходъ проса очень ускоряется. Еще шого лучше сѣяшъ подъ росу, ш. е. надъ вечеръ разсѣяшъ, а пошпру сѣ росою загрешъ.

Въ мѣстахъ, гдѣ проса сѣюшъ много, очень знаюшъ искусство оное сѣяшъ, и сѣменъ сѣ пескомъ не мѣшаюшъ, что однако для неискусныхъ нужно; но разсѣваюшъ

вають одни зерна шремя перстами, большимъ, указательнымъ и среднимъ. Если же кто такимъ образомъ разсѣвать просо не навиченъ, лучше сѣять рѣдко, нежели часто. Хотя часто разсѣянное просо и не поляжетъ, но если въ землѣ нѣтъ довольныхъ силъ, ничего пшнаго изъ него не выдеетъ, лишь тонкія и корешкія кисти, мало зеренъ содержащія, и при томъ большею частью пустыхъ. Когда въ случившемся густомъ пересѣвѣ, т. е. въ частомъ посѣвѣ, положишься на будущее прополоніе, составляешь по вещь пшудную, рѣдко по надлежащему исполняемую, дабы можно было шѣмъ погрѣшность густаго сѣва исправить.

То многихъ мѣсцахъ есть обыкновение между просомъ макъ сѣять. Подражать сему не должно, потому что ко времени посѣванія проса можетъ изъ него зерна выбивать вѣтромъ, ударяя объ жесткія маковые сѣбли и головки, такъ что лучшія зерна пропадутъ. По нуждѣ можетъ это производимо быть около межниковъ десятины, но сѣять шутъ макъ одинъ, а не съ просомъ мѣшая. Однако около межниковъ лучше вмѣсто маку сѣять тыквы; ибо оныя обыкновенно шутъ очень хорошо урожаются и по межникамъ разстилаются. Нужно лишь плести тыквенныя заблаговременно опводишь, чтобъ шли оныя не въ просо, но вдоль межниковъ, или на оныя.

Въ

Въ здѣшнихъ мѣстахъ сѣютъ между просомъ морковь, кошорая оному не препятствуешь. Мнѣ кажется этотъ способъ очень хорошъ; потому что какъ подъ просо землю копають заступомъ и полуютъ, морковь на таковой пашнѣ очень хорошо уродится, и по жатвѣ проса, можетъ еще нѣсколько на томъ мѣстѣ оставаясь расти. Нѣкоторые скудные люди сѣютъ съ выгодою и сочевицу между просомъ; она обвивается около будылокъ просяныхъ, и приноситъ очень много стручьевъ. Но во время жатвы должно косить просяныя подъ верхъ будылокъ срѣзывать и собирать особливо. Пономъ просяная солома обще съ сочевицею скашивается рядами и сушится. Еслили погода будетъ не надежна, связать сочевицу съ просяною соломою, и на гумнѣ обмолачивають, а пономъ разстилають солому просушивать на открытомъ мѣстѣ; ибо для просяной соломы пошребно по крайней мѣрѣ чрезъ 8 дней хорошее солнечное сіяніе, и при томъ переворачиваніе, чтобъ она въ кормъ скотинѣ довольно высохла.

О просѣ говорятъ, что оное въ половину уже хорошо уродилось, когда хорошо взошло. Еслили же случится сильной дождь, пока еще сѣмена въ землѣ лежатъ, и землю сильно уколошишь, такъ что нѣжной ростокъ сѣмени изъ оной прорахъся не можетъ, должно способство-

вашь сему провѣшриваніемъ, т. е. просораживаніемъ легкою бороною.

Когда же просо хорошо взошло, и случашся попомъ многіе дожди, это не очень для него полезно. Земледѣльцы къ тому имѣютъ пословицу: какъ просу въ уши дождь польешь, работа, трудъ весь пропадетъ. Не хорошее же предзнаменованіе когда просо опъ продолжишельной мочливости и холоду начнетъ желѣть или красѣть; должно послѣдовать очень теплой погодѣ, чѣобъ оное опъ этой болѣзни излѣчилось.

Просо должно полоть два раза. Въ первый разъ происходитъ это, когда оное на вершокъ только опъ земли опростешь. Сего перваго полонія не должно вдаль опкладывашь; ибо когда тѣмъ опоздаешь, просо съ трудомъ оправляется, но останется слабо и больно. На долго между просомъ опшавленныя сорныя травы опнимаютъ у него силу; въ просѣ больше, нежели въ другихъ хлѣбахъ это примѣнно, что слабая жизнь или возрастъ слѣдуетъ въ немъ послѣ слабого дѣнства. Второе полоніе производится нѣсколько недѣль спустя послѣ перваго. Въ точности времени къ тому назначить не можно, а зависить оно опъ погоды, каково просо и травы опростаютъ. Но не должно и въ этомъ опздать; ибо просо прежде, нежели чаешь, высоко выросшаетъ, при чемъ онаго по обыкновенному образу полоть уже

уже не можно. У земледѣльцовъ есѣ на
эшо пословица: когда услышишь просо
звукъ косы, пойдетъ въ прямой ростъ въ
тѣ часы, ш. е. просо обыкновенно скоро
опростетъ въ то время, когда пахарь
опбиваетъ косу къ подкашиванію ржи. Есѣ-
ли не успѣшо будетъ произвести выпалы-
ванія, пока просо еще не опросло вы-
соко, тогда выпалыватели должны уже сор-
ныя травы выдергивать, сходя въ на ногахъ,
а не сидѣвъ или на колѣнахъ припадъ,
опасаясь тѣмъ поломать стволы проса.
Эшо наблюдается и въ томъ случаѣ, ко-
гда просо опъ тучности земли бошѣтъ,
и растетъ толстобѣло; тогда полоніе ра-
но поушру и въ дождливые дни вредно;
но какъ солнцемъ обогрѣтъ, стволы и
подростъ просяная тогда окрѣпнушъ,
можно полоть безъ опасенія.

Въ иныхъ мѣстахъ проса въ другой разъ
не полютъ. Зависитъ эшо опъ того, когда
правъ опростетъ мало, или вовсе не
окажется; ибо пижаніе, позволяемое по-
лучать правамъ, опѣмлетъ у проса.
Есѣли же не осшавляшъ правъ между про-
са, тогда заплашишь оное за эшотъ шрудъ
лучшимъ умолопомъ.

Я всегда съ удовольствіемъ смотрю
на то, гдѣ лѣтомъ вижу выполненныя изъ
проса травы засушиваемыя на полѣ, и
прибираемыя послѣ въ запасъ зимняго кор-
му. Поелику травы сѣи бывають выдер-
нуты въ полномъ соку, то дойныя коро-

вы и шѣлята, отъ машерей опнятыя, получають отъ разпарки оныхъ очень питательной обварной кормъ.

Просо не можешь до шѣхъ поръ на корнѣ спояшь, пока во всѣхъ кисняхъ всѣ зерна выпѣютъ. Между шѣмъ прежде созрѣвшія зерна отъ малѣйшаго колебанія въ воздухѣ выпадаютъ. Если же послѣдуешь сильный вѣтръ, можешь и посредственно спѣлыя зерна выбить. По ссму приступаютъ къ сжинанію проса, когда большая часть кисей не имѣютъ зеленого цвѣта.

Когда во время поспѣванія проса, какъ тогда почасту случается, произойдутъ на нѣсколько дней бури, земледѣлецъ тотчасъ берется за косу, дабы хотя половину проса своего спасти. Безъ опасности же отъ бурь просо обыкновенно поджигаютъ на горсти, дни чрезъ два осторожно переворачиваютъ руками на другой бокъ, чѣмъ совершенно просохло, и связываютъ въ снопы надъ разостланными просынями или веревьями, дабы высыпавшіяся при этомъ зерна не пропадали. Накладывая на шѣлеги просо, сперва разпилаются въ оныхъ простыни или веревья съ собранными зернами, а на нихъ кладутъ снопы; съ этою предосторожностію свозятъ въ гумно прямо на шокъ, и тотчасъ молошатъ.

Поелику погода къ сушенію на рядахъ лежащаго сжахаго проса не можешь быть

довольно благонадежна, и когда пойдешъ много дождя, зерна не шокмо очень выпадающъ, но напослѣдокъ совсѣмъ почернѣющъ, и въ продажѣ будущъ не шоварны: въ разсужденіи сего къ прибиранію проса большею частію упошребляю я *Экхартомъ* предписанное средство, которое онъ, какъ выше упомянуто, первѣйшею уловкою въ воздѣланіи проса называетъ. Вотъ въ чемъ состоитъ оное по его собственному описанію:

Къ сжинанію проса потребна осторожность и благоразуміе, потому что оное совсѣмъ иныя имѣетъ въ себѣ свойства, нежели всѣ другіе полевые плоды. Рѣдко можно найти десятину проса, на которой бы оное росло не двумя всходами, для того что когда большая часть зеренъ по посѣвѣ уже взошла, и состоитъ въ красивыхъ трубочкахъ, прочія глубже попавшія въ землю зерна чрезъ 5 и 8 дней производятъ новыя растенія. (Побочные отростки отъ главнаго корня иногда очень поздно отростаютъ и производятъ, что близъ главныхъ поспѣвшихъ кистей видимы бывающъ позднихъ отростковъ больше или меньше въ созрѣніи оставшія кисти.) — Понеже я лѣтъ за 30 къ посѣву сего хлѣба особое прилѣжаніе имѣю, и обще съ табакомъ предпочелъ всѣмъ другимъ, легко потому заключить, что я во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ много хлѣба сего сѣютъ, обращалъ прилѣжное внима-
ніе

нїе на шѣ правила, кои мнѣ казались полезнѣйшими. Припомѣ замѣшилъ я главнѣйше, что когда на самой доброй, мягкой и рыхлой землѣ, во второй разъ по унавоженїи обсеваемой, просо будетъ посеяно, состоявшее въ самыхъ спѣлыхъ, тяжелыхъ и желтыхъ сѣменахъ, и по посѣвѣ достигнетъ своей спѣлости, раздѣляющія всѣ кисти онаго на 5 разборовъ зрѣлости: 2 кисти оныхъ бывають желто-зеленоваты, двѣ больше зелены, нежели желты, а пятая часть совсѣмъ зеленыхъ, однакожъ снизу на ладонь опѣ земли спволы у нихъ желты и заблеклы: тогда ни мало не медливъ должно просо сжинашь, пошчасъ домой возишь и молотишь; ибо плодъ эшотъ впрочемъ, когда сжатый одну ночь на горстяхъ или въ рядахъ пролежишь, а особливо естли случится дождь и пошомъ солнце, то зерна всѣ изъ кистей выпадутъ. Естли же просо держашъ въ копнахъ или склавъ въ адоньи, когда въ ономъ много находишь зеленыхъ спволоу и кистей, сполько разгорячишь, что заплѣсневѣетъ, сдѣлается запло и черно, и къ употребленїю не годно. (Но сего приключенїя совсѣмъ нѣтъ причины опасаться, когда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ просомъ поступаютъ по ниже-слѣдующему *Хагедорнову* предписанїю: Нѣкоторые избѣгая затрудненїя въ срѣзыванїи спѣлыхъ кистей на выборъ, избирають крапчайшїй пушь, и подкашивають

ютъ все просо сряду, когда только на загонѣ большая часъ кистей будетъ спѣлыхъ, свозяшъ оное пошчасъ въ гумно, и на шоку сложивъ въ кучи, даюшъ оному лежать, пока сполько разгорячится, чпо всунушая въ кучу рука едва терпѣшь можеть. Отъ сего недоспѣлыя зерна приходяшъ въ зрѣлость, и легко вымолачиваются. Есѣли же часъ проса не выпотѣеть и не довольно разгорячится, складываютъ оное опяшъ въ кучу и держашъ въ оныхъ, пока всѣ зерна будутъ чисто вымолачиваться. --- Но чпо сѣ потѣнїе въ кучахъ было бы равно не вредно просу бѣлому, какъ черному и желтому, нтого я за недоспапкомъ опышовъ ни подшверждашь, ни опшвергашь не могу). Сжатое просо пошчасъ свозяшъ въ гумно и не медливъ молошашъ, зерна ссыпаютъ въ амбаръ шонкимъ слоємъ, и до шѣхъ поръ ежедневно до нѣсколькo разъ ворочаютъ граблями, какъ совѣмъ высохнеть. Невзирая на шо, чпо просо было разныхъ разборовъ, а именно совѣмъ спѣлое, въ шри чешверши спѣлое и полуспѣлое, но при опалкиванїи на мѣльницѣ окажется, чпо пшено выдетъ во всѣхъ зернахъ равномѣрно желто и хорошо. —

Однакожъ оказывается въ просѣ, чпо зеленые или неспѣлыми въ гумно свезенныя зерна послѣ не дозрѣваютъ и остаются пусты, при толченїи разбиваются оныя въ мякину, есѣли не будутъ опдѣлены при вѣянїи на шоку. По сему лучше будетъ ;

дешъ, когда собрашь довольное число искусныхъ старухъ, и приказашъ онымъ всѣ спѣлыя кисти, срѣзывая острыми серпами или ножами, класъ въ мѣшки и оныя отвозишь на покъ къ обмолоченію. Но таковое срѣзываніе должно начинать не слишкомъ рановременно, чѣобы ходьбою не произвешъ многимъ кустамъ проса больше вреда, нежели пользы. Настоящая пора къ тому, когда три или четыре доли кистей поспѣетъ, а пятая или шестая доля еще не дойдетъ. Срѣзывающія просо старухи должны остерегаться, чѣобъ снимая кисти спѣлыя незрѣлыхъ не ломашь и не шопшашъ; понеже въ этомъ расположеніи производится просу вторая жатва; конечно составляетъ то больше работы, но шѣмъ меньше прашишь зеренъ.

Вымолоченное просо должно на поку подобно другому хлѣбу вѣять и очищать въ грохоты, а потомъ уже отвозишь въ жишницу къ сушенію. *Хагедорнъ* заключаетъ свое наставленіе о просѣ слѣдующими словами: просяная солома идетъ въ подстилку скотинѣ, и бросается въ навозъ къ умноженію онаго. — У насъ, въ здѣшнихъ мѣстахъ просяная солома больше уважается. Какъ скоро она будетъ вымолочена, отвозятъ оную въ поле на жнивье, разкладываютъ врознь, чрезъ нѣсколько дней переворачивающъ, и когда полежитъ дней 8 или недѣли двѣ,

и совершенно высохнешь, тогда связавъ оную, ошвозяшь на сохраненіе въ зимній кормъ коровамъ и воламъ. Рогашой скопъ бшъ просяную солому не шокмо сполькожъ охотно, какъ сѣно, но она и очень для онаго здорова. Но должно, чшобъ она и совершенно въ полъ высохла, ибо когда въ сараб заплѣсневѣшъ и получишь заплхосъ, скопина бшъ оную не будетъ. Прояная солома въ разсужденіи своихъ толстыхъ дровянистыхъ стволѡвъ сохнешъ очень не скоро, почему долго оную должно держать въ полъ. Ешъли же въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Хагедорнъ хозяйствовалъ, бросали просяную солому въ навозъ, то надобно думать по незнанію, что она лучший гуменный кормъ составляетъ, или дѣлали ее къ употребленію негодною, державъ оную столько долго въ пошѣющихъ кучахъ, при чемъ она разгорячаясь теряла свою силу.

Послѣ пшеницы ни одинъ изъ полевыхъ плодовъ столько не подверженъ головнѣ, какъ просо. Поступокъ земледѣльцовъ здѣшней округи, къ ошвращенію головни въ просѣ, подшверждаетъ выше приведенную при описаніи пшеницы теорію о головнѣ. Они сѣютъ просо не безъ разбору, или какъ бы-то ни случилось. Какъ же скоро эшо пренебрегутъ, получаютъ головни множество, какъ-то можно видѣть всюду, гдѣ только просо сѣяно неопшорными сѣменами. Къ приведенію се-
бя

бя въ безопасность отъ головни, ходящѣ кресъянки на просянище, выбирающѣ кисли самыя спѣлыя и крупныя, срѣзывающѣ оныя, связываютъ въ пучки и вѣшающѣ въ домахъ своихъ на стѣнѣ или на шестахъ въ безопасномъ мѣстѣ, и шакъ держатъ до наспупленія сѣву; тогда снимающѣ и вытирающѣ зерна руками. Слѣдствія отъ того бывающѣ сполькожъ благоуспѣшны, какъ сказано прежде о головнѣ во пшеницѣ. Въ самыхъ спѣлыхъ полныхъ и хорошо высушенныхъ сѣменахъ проса головни не бываетъ. Напрошивъ отъ сѣменъ, взяшихъ къ посѣву безъ разбору, всегда почти головня; для того что между оными бывающѣ зерна отчаспи неспѣлыя, легкія и неполныя, часпью же не таково хорошо высушенныя, какъ срѣзанныя въ кисняхъ своихъ въ добрую погоду, и въ пучкахъ привѣшенныхъ, чрезъ что они отъ всякой влажности должны оставаться свободными. Слѣдственно совершенно согласно это съ выше приведенною теорією о головнѣ. Гдѣ сѣвъ проса производится великъ, и по подобію кресъянъ кисьями онаго на сѣмена записи зашруднительно, тамъ можно при вѣяніи на шокъ отнимать на сѣмена отпрыскъ, оной въ житницѣ щательно высушивать, а потомъ привѣсить въ мѣшкахъ, дабы чрезъ то сѣмена содержаны были какъ возможно суше.

Прежде упомянулъ я, что у земледѣльцовъ находящіяся въ домахъ сипуны, въ которыхъ они между прочимъ и просо опалкиваютъ. Это производящъ не прежде, какъ пшено зандобишя для домашняго расходу и на продажу.

Къ опалкиванію проса избирающіяся способные люди, кошорые дни два бы сію работу выдержашъ могли. Когда къ каждой сипуѣ приспавленъ работникъ, то на 5 шаковыхъ работниковъ попребенъ шесшой, кошорой бы въ сипуны просо засыпалъ и вынималъ оное; эпотѣ же человекъ долженъ надсмащривашъ шого, чтообъ проса на каждую сипуу опдѣляшъ по равному числу, оное временно взмѣшивашъ, и поглядывашъ, довольно ли ополчено. Естѣли опалкиваніе производящъ въ сухое время, или въ морозѣ, дѣйствіе эшо производишъ легче. Въ дождливую или влажную погоду лузга на просѣ бываетъ волжка, и не такъ удобно опѣ зерна опдѣляется.

Просо бываетъ два раза подѣ песпомѣ: первой разѣ называется обламываніе лузги, при чемъ большая часъ оной оппадаетъ, и зерна бывающъ какъ бы вылучены. Работникъ, ко взмѣшиванію приспавленной, долженъ имѣшъ исправной глазомѣръ, дабы просо ни много, ни мало въ сипуѣ пробыть не могло. Въ одномъ случаѣ будешъ просо не ополчено, или продолжишя толченіе къ бесполезному упомленію дѣйствующаго песпомѣ, а въ другомъ можешъ

Часть III. Отдѣл. 2. И бышъ

быть перешолчено и раздробиться въ пыль; для чего засыпщикъ имѣетъ маленькое рѣшено, коимъ испытываетъ, дабы не ошибиться въ размѣрѣ ошалкиванія.

Ошолченное просо переходитъ въ рѣшено, или грохотъ, коюрой отъ обыкновенныхъ грохотовъ различается лишь тѣмъ, что въ проволочной его рѣшепкѣ скважины или ечейки сплещены тѣснѣе, и чтобъ зерна пшена проваливаться не могли. Просѣваніемъ лузга отъ пшена отдѣляется, и тогда очищенное отъ этой лузги пшено опять всыпается въ ступы, и до тѣхъ поръ толчется, пока ни одной лузгинки на зернѣ не останется. Если проса ошалкивается довольно количество, должно рабочимъ, производившимъ дѣйствіе два или три дни сряду, дать дни на два отдохновеніе (или смѣну), ибо впрочемъ они выдержавъ не могутъ: пошому что ноги, копорыми они приподнимаютъ, вступая въ пеплю, шестъ, къ которому на перевѣсѣ пестъ привязанъ, такъ заболитъ и онѣмѣютъ, что едва стоять и ходитъ на нихъ могутъ.

По вторичномъ ошолченіи проса, вышедшее изъ онаго пшено спалывается ночвами, или на чистомъ шоку перевѣвается, къ отдѣленію лузги. По окончаніи сего пшено высѣвается въ грохотъ. Проскакивающія въ ечейки грохота зерна называются дробное пшено; оспавляющіяся для домашняго расхода, и по высѣянтіи изъ нихъ пыли сославляють

юпѣ въ вареніи очень пріятную пищу. Таковымъ образомъ просо обращаешь въ купеческій товаръ, идущій за море въ Голландію и Англію, къ употребленію въ корабельной запасъ мореходцевъ со всякими иными крупами и горохомъ.

Есѣли гоповишся къ продажу пшено изъ бѣлаго проса, гдѣ между прочимъ бываешь на торгу желшое и красное, и по ошолченіи онаго во второй разъ не лѣзя будешь везши онаго скоро въ продажу, лучше оное держашъ съ лузгою не спалывая, чѣпобъ оное цвѣту своего не потеряло; ибо когда вычищенное бѣлое пшено долго полежишъ, не останешся таково цвѣшно, какъ сначала было. Незнающіе покупщики по шому бѣлое пшено бракующъ, и желшое съ краснымъ оному предпочиашъ, состоявъ въ ложномъ мнѣніи, будшо бы бѣлое пшено вкусомъ хуже.

Просыная лузга или суполки содержащъ въ себѣ много мучняныхъ часпицъ, ошолченныхъ ошъ проса; почему хранятся въ кадкахъ, яко очень цѣпашельной кормъ, въ замѣсъ коровамъ и свиньямъ. Одни сѣи суполки довольно уже плашашъ крестьянамъ, шолкушимъ просо въ домашнихъ ступахъ, за употреблемой ими къ шому шрудъ.

Поелику просо не всякой годъ урожаешся, шо сберегаемое ошъ дешевыхъ годовъ приносишъ хорошій доходъ. Есѣли будешь оное хорошо высушено, можешь оное въ бочкахъ и ларяхъ лежашъ до позд-

ныхъ лѣпъ безъ всякаго присмотру. Можно въ лѣтнее время въ ономъ, для того что оное очень холодитъ, беречь яица свѣжія, лимоны, копченое мясо, колбасы и вешчину, также и свѣжее мясо. *Манетти* извѣщаетъ, что въ Ломбардіи мѣшajúтъ пшеницу съ просомъ, и тогда хлѣбные черви ни мало до оной не касаются. Просо изъ пшеницы, когда будетъ надобно, можно очень легко ошдѣлить грохотомъ. Это не вредитъ ни бѣлизнѣ, ни внутренней добротѣ пшеничной муки, хотябъ нѣсколько зеренъ проса вмѣстѣ съ пшеницею были смолоты. *Плиній* повѣствуетъ, что въ его время пекали добрый и здоровый хлѣбъ изъ просяной муки.

АА. Боръ или жѣлкое просо.

Называютъ и початковое просо, потому что растетъ не кистями, но какъ бы початкомъ или круглымъ колоскомъ, по Нѣмцки *Kolbichte, Hirse, Feichgras, Fench, Fuchs-Schwanz* или *Fuchs-Stört; Panicum Germanicum, sine panicula minore*, у *Бавхинія* стр. 27. Этомъ хлѣбъ сѣютъ точно такъ, какъ обыкновенное просо; но оной на твердомъ суглинкѣ лучше урожаешь, нежели просо.

Пшено изъ бору варятъ въ кашахъ, и молочная каша изъ онаго, кажется, что вкуснѣе обыкновенной пшонной. Имѣетъ же боръ предъ просомъ и то преимущество, что пищицы меньше на оной нападаютъ; почему можно оной сѣять въ огородахъ

родахъ и близъ жила. Также и въпромъ оной не только выбиваетъ; зерна его въ початочкахъ или колоскахъ сидяшъ тверже, нежели просяныя въ своихъ киспяхъ.

Эшошъ слишкомъ пренебрегаемый хлѣбъ совѣшую я сѣять у насъ (въ Нѣмецкой землѣ) новопоселенцамъ, имѣющимъ у себя мало земли, и бѣднымъ людямъ средшвеннаго состоянiя, у которыхъ осмались только усадьба да огородъ. Оные съ малаго мѣспечка могутъ запасись пшеномъ симъ на цѣлой годъ про свой расходъ, пошому что оное ошъ одной горсти высѣву приноситъ полосмины. Боръ, подобно просу, не должно густо сѣять.

ББ. *Турское просо.*

Называется эшо просо инако *Арабское просо*, а у *Линнея* *Holcus forghum*. О семъ хлѣбѣ, учинившемся извѣстнымъ въ наши дни, долженъ я напоянушъ, не съ шѣмъ, чтобы подобно прочимъ родамъ описанныхъ хлѣбовъ одобряшъ оное къ посѣву, но только чтобы описать оное вкращѣ для читателей, которымъ оное не знакомо. Требуешъ хлѣбъ сей многого жару, и чтобы родился удачно, должно сѣять его рано на добромъ огородномъ черноземѣ прошиву полуденной спороны. Просо эшо землю очень изшощаетъ, пошому что ошпускаетъ шакѣ великѣ корни, что выдернушъ оные потребенъ не малой шрудъ, или помощь заступа. Вышиною растешъ оное локтей въ пять,

И з

спволъ

стволю бываетъ въ большой палецъ толщиною, и такъ твердъ, какъ проспникъ. На тяжелыхъ, холодныхъ и низко лежащихъ пашняхъ оное не урожается, или не выпѣваетъ. Урожай онаго несказанно великъ, и ошолченное изъ зеренъ его пшено очень долго не разваривается. Пшено это или крупу похваляющъ за ошмѣнно прѣшный вкусъ. Но поелику этошъ хлѣбъ въ разсужденіи изнощанія подъ нимъ пашни и свойства своего, что оное отъ малаго холоду много терпитъ, также что и хожденіе за нимъ многого труда требуетъ, ибо должно его часто опалывать и окапывать, то по днесъ еще мало сыскалось на оное охотниковъ къ посѣву.

О. Манна.

Манна или шваде или небесная роса, называется по-Нѣмецки Schwade, Manna, или Himmelsglanz, а у Линнея Fescua glutians. Очень не за долго сія по всякой справедливости называемая манна была въ Нѣмецкой землѣ не далѣе знакома, какъ около Марка Бранденбургскаго, гдѣ она равна, какъ въ Польшѣ и Пруссіи, собирается около 24 Іюня, дикораспускающая на низменныхъ влажныхъ лугахъ и по болошамъ.

Зерна плода сего всѣмъ вышеописаннымъ родамъ проса, даже самому пшену Сарацинскому, какъ въ разсужденіи лучшаго вкуса, такъ спорынѣ въ вареніи и пишательности, далеко должно предпочитать. Двумя гарницами этой манны можно

жно насыщенія больше произвеси, нежели получишь верикомъ пшена Сарацинскаго, и шестью гарнцами пшена просянаго. Полная горсть манны, въ молоко разваренной, можешь насытити двухъ человекъ. Баряишь оную въ супахъ и кашами, подобно пшену сарацинскому и крупамъ просяннымъ. Засыпающа оною мясныя похлебки, также и винной супъ вмѣсто саго. Въ послѣднемъ приготоуовленіи, а именно съ виномъ, равно и съ молокомъ, самымъ лакомцамъ лучше оная нравишся.

Съ тѣхъ поръ, какъ плодъ эшотъ отъ меня и другихъ выхваленъ былъ въ публичныхъ вѣдомостяхъ, начали употреблять оной въ Саксоніи и другихъ странахъ; но какъ на оной сдѣлалось больше охотниковъ, чрезъ что и прилѣжише сшали искашь и собирашь его, обратилось шо во вредъ сему растѣнію: ибо по обращеніи манны въ столько расходный товаръ начали собирашь оную, не допуская до зрѣлости. Продавцы манны срѣзываютъ оную такъ рановременно, что по ополченіи зеренъ крупа изъ нихъ не выходитъ, какъ должно бытъ, желтая, но сѣрая цвѣтомъ. Въ вареніи какъ видомъ, такъ вкусомъ не дозрѣлая манна выходитъ не хороша. Она не разваривается, и оснается шестка, не вкусна, и видомъ красновата и не пріятна, хотя бы на молоко одномъ варена была. Спѣлая же манна и невареная имѣетъ видъ желшой, а въ молоко свареная

бываетъ бѣла, какъ снѣгъ. Не достаеиъ же въ неспѣлой маниѣ того главнаго свойства, чѣмъ бытъ столько полезною для желудка нѣкоторыхъ особъ; ибо многимъ охотникамъ до молочнаго неспѣлая бываетъ она не здорова, приключая поносъ, и умножая кислоту въ желудкѣ. Сего отъ зрѣлой въ молоко вареной манны ни мало опасаться не должно. Она естественнао отверзаетъ утробу, предваряя запоръ, и не производитъ кислоты въ желудкѣ, или не умножаетъ, есѣли она уже естъ, что бываетъ однако у многихъ отъ молочнаго кушанья. Не должно ли это побудить насъ, досель у насъ только дикорастущій, шолко отличный плодъ, какова манна, разводитъ посѣвомъ?

Чшо этоиъ посѣвъ вещь возможная, въ этомъ и не эконоиъ сомнѣваться не можешъ, когда только помыслииъ, что мы начали разныя дикія травы сѣяти, есѣли только можемъ собрать сѣмена оныхъ. Лѣиъ за 30 знавалъ я одного челоѣка въ среинемъ Маркѣ Бранденбургскомъ, которой манну сѣю въ своемъ огородѣ сѣялъ, и получалъ оную въ возможной доброти для стола своего; ибо желудокъ его надлежалъ въ число пѣхъ, кои не могуиъ сносить никакого молочнаго, кромѣ каши изъ этой манны.

Посѣвъ оной чрезмѣрно легокъ: должно только въ дачахъ своихъ выбрать изменное мѣсто, оное вспахать, разсѣяиъ

япѣ спѣлая сѣмена манны, и слегка заскородить бороною. Лучшее время къ сѣву то, когда сѣмена около Иванова дни (24 Юня) поспѣютъ. Гдѣ есть каналы, въ которыхъ зимняя вода собирается, а къ лѣту высыхаетъ, и можно оныя вспахать, мѣсто таковое очень хорошо подѣ манну. Опѣ пошвы кислаго свойства (каковы болоты) не должно ни мало опасаться; ибо видимо, что дикая манна на таковыхъ мѣстахъ очень хорошо урожается. Когда многія другія травы на кислой землѣ не очень удобны въ кормъ скопу бываютъ, то трава манны составляетъ на оной сладкой кормъ, которымъ даже овцы не гнушаются. И такъ высевая манну къ полученію сѣменъ для поварни, пріобрѣтается при томъ добрый правяной кормъ скопу. Какъ скоро спѣлая сѣмена будущія сняты, можно траву подкосить. Еслили пошва земли не шоща, можно траву сію три раза въ годъ косить. Она опроснаетъ весною очень рано; почему надлежитъ въ число кормныхъ травъ, доставляющихъ первый зеленый кормъ. Скосивъ можно запустить оную къ ношенію сѣменъ; что можно даже послѣ второй косьбы учинить. Это шѣмъ лучше послѣдуетъ по желанію, когда мѣсто сіе въ надлежащую пору усыпать извѣстью, мергелемъ, гипсомъ, золою, или дробнымъ скопскимъ навесомъ. Еслили посѣву манны не можно будетъ произвести лѣшомъ, можно сѣ-

яшь подѣ исходѣ лѣша, пока еще низменныя мѣста не наводнились ошѣ осеннихъ дождей. Мокрота расшѣнію сему не вредитѣ, когда только сѣмена хорошо взойдутѣ и укореняшся. Каковымѣ же образомѣ сѣмена манны лѣшомѣ собирающся, выдѣлывающся или ошалкивающся, о томѣ смотри во второй половинѣ сего сочиненія подѣ заглавіемѣ *Хозяйка*, Часть IX, въ главѣ второй 7) подѣ словомѣ *манна*.

Прим. Переводч.

Не зная въ точности, растетѣ ли сѣя трава у насѣ въ Россіи, названіе манны и небесной росы принялъ я по переводу съ Нѣмецкаго языка; но желающіе ошѣискивать сѣю траву въ Россіи, должны взять прибѣжище къ описаніямѣ оной въ Ботаническихъ книгахъ, и приложеннымѣ въ оныхъ изображеніямѣ; ибо авторѣ описанія оной и ботаническихъ признаковѣ не приложилѣ.

Г Л А В А IV.

Маслоносныя растѣнія.

Сколько народы имѣютѣ склонности привыкать къ чужеземнымѣ произведеніямѣ, деньги свои безѣ нужды выдавать иноспращамѣ, и при томѣ не познавать собственныхъ столькожѣ добрыхъ произведе-

веденій, оное между прочимъ видимо надѣ маслами посѣпными или есеями, коихъ мы въ шаковомъ множествѣ и лучшей доброты можемъ получати на собственной землѣ, что выходящія за деревянное масло и ворвань изъ государства деньги не только были бы большею частью сбережены, но даже за собственное наше масло чрезъ продажу онаго иностранцамъ могли бы чужія деньги привлекать въ свое опречеснво.

Правда то, что хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на примѣръ въ Тирингенѣ, Магдебургѣ и Халберштадтѣ много рѣпнаго масла собирается, однако онаго далеко еще не достапочно къ снабженію онымъ соседственныхъ провинцій, умалчивая о томъ, чтобы учинить масла иностранныя ненужными. Дабы послѣднее случилось, должны всѣ Нѣмецкія наши провинціи обратить вниманіе на всѣ масленосныя растенія, даже и самыя шѣ, въ которыхъ хлѣбъ родится худо, т. е. гдѣ оной только самъ четверть противъ сѣмени приходится: ибо въ шаковыхъ бѣдныхъ къ хлѣбородію мѣстахъ есть еще пашни, къ посѣву случайныхъ плодовъ годныя, и кои въ удобность сію привести можно. Еслили кою-либо изъ сихъ плодовъ въ какомъ-либо мѣстѣ не удобенъ, можно взяться за другой: ибо выборъ эшотъ изъ множества родовъ производить можно.

Главная причина упущенія посѣва во многихъ странахъ помянутыхъ плодовъ

ка-

кажется бытъ сѣя, что деревенскіе жители отчасти мало къ тому поощрены или мало вразумлены, частью же что состоятъ въ великой недоспашокъ въ маслѣбныхъ мѣльницахъ. Правительству должно способствовать въ обоихъ сихъ недоспашкахъ, когда оное печется посредствомъ своихъ земледѣльцовъ пріобрѣсти себѣ новые источники къ доходамъ и благосостоянію.

1) Рѣпное сѣмя.

Хотя рѣпа и растѣніе, рѣпное сѣмя приносящее, много имѣютъ между собою сходства, и потому оба отъ новѣйшихъ Бошаниковъ причтены въ родъ капустъ, какъ - то и *Линней* назвалъ рѣпное сѣмя *brassica napus*, однакожъ онаго съ рѣпою смѣшивать не должно. Корневые листья его хотя во всемъ сходны къ рѣпнымъ, но совсѣмъ гладки; также и самый корень хотя уподобляется видомъ рѣпѣ, но несравненно длиннѣе, тонѣе и бываетъ желтоватъ или черноватъ. Рѣпу сѣютъ единственно для корней ея, а рѣпное сѣмя для однихъ только зеренъ. Отчизна послѣдняго собственно Англія, Голландія и Нидерланды, гдѣ находятъ оное распушимъ по песчанымъ морскимъ берегамъ.

Сего растѣнія имѣютъ *лѣтній* и *озимый* родъ, или *яровое* и *озимое* рѣпное сѣмя, которыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Нѣмецкой земли называютъ *ярина* и *озимъ*, чего по крайней мѣрѣ въ учебныхъ книгахъ дѣ-

дѣлать не должно, къ избѣжанію замѣшательства; ибо подѣ общимъ названіемъ ярины разумѣются всѣ роды хлѣбовъ, сѣемые не подѣ зиму, а чрезѣ озимь, также всѣ, кои сѣются подѣ зиму.

Не взирая на то, что сѣмена обоихъ родовъ въ основаніи между собою не различаются, и одно только время сѣву составляетъ эту разницу; однакожъ произведенные опыты въ посѣвѣ ярового рѣпнаго сѣмя осенью, а озимаго весною, очень были не удачны. Почему деревенскимъ жителямъ должно остерегаться въ выборѣ сѣменъ, чтобы не счестъ однихъ за другія, и съ убыткомъ не посѣять. Кто же хочетъ въ перемѣнѣ сѣменъ достигнуть намѣренія, долженъ производить сначала опыты малымъ дѣломъ, такъ какъ упомянуто прежде въ разсужденіи превращенія озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, а именно, чтобы уступать по нѣскольکو опыту обыкновеннаго времени сѣву, т. е. высѣвая сѣмена опчаспи ранѣе, опчаспи позднѣе, и тѣмъ мало по малу пріобучая сѣмена къ другимъ временамъ года. По сему, кто еще никогда не сѣвалъ рѣпнаго сѣмя, и выписываетъ оное изъ опдаленныхъ мѣстъ, долженъ точный родъ онаго назначать и не смѣшивать. Озимое рѣпное сѣмя зерномъ бываетъ крупнѣе ярового. Въ описаніи рѣпнаго сѣмя иногда сполько ошибаются, что оба рода между собою смѣшиваютъ.

А. Озимое рѣпное сѣмя.

Подъ озимое рѣпное сѣмя избираютьъ землю пшеничную, ш. е. таковую, на которой пшеница урожается. Пріуготовленіе земли подъ оное точно какъ подъ пшеницу, и чѣмъ лучше земля таковая будетъ унавожена, тѣмъ больше можно ожидать урожая онаго. По надлежащемъ пріуготовленіи пашни сѣмена разсѣваютьъ, проборонивъ землю, и послѣ оныя опять заскораживаютьъ.

Время къ посѣву онаго Сентябрь, при чемъ главное обстоятельство въ томъ, чшобъ узнать насѣющую мѣру къ высѣву сѣменъ. Если посѣять густо, а особливо на тучныхъ пашняхъ, растѣнія будутъ загнивать, желтѣть и принесуть пущозерницу. Когда же посѣять рѣдко, тогда въ просторныхъ промежкахъ между растѣніями рѣпнаго сѣмя оставлена будетъ свобода сорнымъ травамъ ко вреду посѣянаго, а при томъ и не столько плода снять можно, сколько бы исправный высѣвъ принесеть могъ.

Экхартъ полагаетъ на упро земли, мѣрою во 180 квадрашныхъ рушъ (ш. е. 25920 квадрашныхъ фушовъ или 529 кв. сажень Россійскихъ, или около полуторы чешверти десятины), только четыре гарнца сѣменъ (или на десятину 11 гарнцовъ съ небольшимъ), и присовокупляетъ къ тому слѣдующее: изъ десяти сѣяльщи-

щиковъ не рѣдко не выберется ни одного, коимъ бы умѣлъ рѣпное сѣмя совершенно правильно разсѣять; ибо какъ это круглое и малое сѣмя скользитъ между пальцевъ, то послѣ оказывающагося на пашнѣ мѣста, на которыхъ сѣмена легли вдесятеро гуще, нежели бы надлежало, и опять близъ оныхъ мѣста, на которыхъ ничего нѣтъ. Таковые люди своими опровергаемыми руками не могутъ двухъ разъ сряду равно разширять своихъ перстовъ, чтобы пашня всюду равно была обсеяна. А чтобы въ этомъ поступать исправнѣе, то послѣ опыта многихъ лѣтъ нашелъ я, что къ сему должно брать чепыре гарнца рѣпнаго сѣмя, и мѣшать съ 28 гарнцами самой сухой земли, чтобы мѣра сѣменъ вообще составила осмину. А какъ на показанномъ пространствѣ земли ржи высѣвается ровно осмина, то по смѣшаніи рѣпнаго сѣмя съ землею сѣяшель можешь дѣйствовать точно такъ, какъ бы разсѣвалъ рожь. Онъ исполняетъ по сему свой сѣвалень, захватываетъ изъ него полными горстями, какъ бы рожь, а чрезъ то не шокмо оной мѣры сѣменъ на помянутую мѣру земли достанетъ, но и сѣмена взойдутъ всюду равно. Это должно наблюдать и въ разсужденіи яроваго рѣпнаго сѣмя. —

а) За нѣсколько лѣтъ въ Австріи, по Императорскому именному повелѣнію, обнаружено

вано наставленіе къ посѣву рѣпнаго сѣ-
 мя, въ кошоромъ въ разсужденіи озимаго
 рѣпнаго сѣмя сказано слѣдующее: Сѣ-
 ютъ оное между 13 днемъ Августа и 28
 днемъ, избирая подъ него отчаспи самую
 добрую, отчаспи средственну добрую
 землю, кошорой должно пришши въ
 паровой клинъ. Оную по снятїи яро-
 ваго хлѣба въ Августѣ глубоко вспа-
 хашъ по жнивью, проскородипъ и оспа-
 вилъ шакъ лежатъ зиму. Весною па-
 спи на оной скошъ, дабы испребитъ
 всѣ отросшающїя сорныя травы. Предъ
 Ивановымъ днемъ (по нашему календа-
 рю приходилъ это число 13 Іюня) го-
 раздо унавозитъ, навозъ глубоко запа-
 хашъ, и оставилъ шакъ лежатъ по
 Ильинъ день или 20 Іюля; тогда еще
 вспахатъ, чѣобъ навозъ приподнятъ къ
 верху; послѣ того прежде 28 Августа
 опятъ навозъ запахивашъ, и по свѣ-
 жимъ бороздамъ разсѣвашъ рѣпное сѣмя,
 взявъ на одну мѣру онаго десятъ мѣръ
 мягко перешертой руками и нѣсколь-
 ко влажной земли, кошорую смѣшашъ
 съ онымъ, потомъ шцательно заско-
 родипъ. При послѣднемъ паханїи пашня
 раздѣляется на гряды, ш. е. пропахи-
 вающа по десятинѣ глубокїя борозды,
 чѣобъ весенняя вода свободно спекашъ
 могла; ибо рѣпное сѣмя, попавшее подъ
 лужу застоившейся воды, выпрѣваетъ.
 Яровое рѣпное сѣмя на средственной
 песча-

песчаной землѣ припши само-шесни-десяшо, а озимое само - 80 и больше.

б) Когда озимое рѣпное сѣмя посѣяшь рано, выбѣжитъ оно еще до зимы въ сшволь, и отъ шого зимою пропадетъ; естѣли же сѣяшь оно поздно, не успѣетъ укрѣпиться, и будетъ нѣжно къ выдержанію зимы. Должно знать свойство пашни, холодна или тепла она. На холодной пашнѣ должно сѣяшь нѣсколько ранѣе, а на теплой позднѣе. Въ гористыхъ мѣстахъ, гдѣ зима ранѣе наступаетъ, нежели на плоско-мѣстѣе, должно вообще ускорить до зимы.

в) Въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ состояло обыкновеніе весною выдергивать молодую сурепицу въ кормъ скотинѣ, и начнушь сѣяшь рѣпное сѣмя, опасно, чшобъ собирающія означенной кормъ женщины и ребяша по незнанію не повыдергали рѣпного сѣмя; ибо оба сіи распѣнія почвы одинакой видъ имѣютъ. Почему заблаговременно сѣющему рѣпное сѣмя должно обвѣспить объ эшомъ сосѣдей, и на загонахъ своихъ поставитъ обыкновенные запрещительные признаки. О семъ больше всего не должно забывать близъ городовъ, изъ которыхъ многіе за правами въ хлѣбныя поля ходятъ.

г) Пшцы поспѣвающему рѣпному сѣмени наносятъ великой вредъ, почему должно

приспавляшь ребяшокъ къ отгонянію оныхъ. Главнѣйшее нападеніе терпишъ оное отъ голубей, которыхъ въ то время на голубяшняхъ запирашь должно.

д) Къ снятію рѣпнаго сѣмя нѣшъ нужды дожидаться, чтобъ оное совсѣмъ на все высѣло. Лучшія сѣмена и множайшимъ количествомъ между шѣмъ выпадушъ и пропадушъ. Однакожъ не должно спѣшишь жатвою и очень рано, для того что отъ того зерна будутъ дробны, отчаси же пусты. Настоящая пора къ сниманію онаго, когда большая часть сѣменныхъ рожковъ пожелтѣетъ: это показываетъ, что зерна въ нихъ поспѣли.

е) Къ предваренію высыпанія зеренъ поспѣвшее рѣпное сѣмя рано упромъ съ росою осторожно сръзываютъ, сносятъ на одно мѣсто въ кучу, чтобъ отъ согрѣянія въ оной недоспѣвшія зерна дошли, и при молошѣбѣ лучше выпадали. Молошью производятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на пашнѣ, которую сглаживаютъ лопатками и ушолочиваютъ, или постилаютъ доски.

ж) Однакожъ гораздо лучше рѣпное сѣмя молошить не на полѣ, гдѣ земля бываетъ не довольно тверда, каковъ на примѣръ черноземъ, но въ гумнахъ на шокку. На большія хлѣбныя шѣлеги разостлашь веретья, и сверхъ оныхъ накладывать, чтобъ сѣмена при перевозкѣ не

не трапились. Въ гумнахъ также нѣкопорые складавають рѣнное сѣмя въ кучи, дабы по вышеупомянутому недозрѣвшія зерна отъ согрѣянiя дошли, получили вообще лучшiй видъ, и отъ цѣповъ лучше выбивались.

- з) Къ разгорачиванiю рѣннаго сѣмя и всѣхъ другихъ, круглое зерно имѣющихъ, или какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ говорится, къ потѣнiю оныхъ, покойный Ратсмейстеръ въ Эрфуртѣ Г. *Рейхартъ* подалъ первое и лучшее наставленiе. Главнѣйшее обстоятельство онаго состоитъ въ сѣмъ: срѣзавъ въ хорошую погоду былинны рѣннаго сѣмя близко къ землѣ, скласъ оныя подобiемъ сѣнной копны на шокъ, но такъ, чѣтобъ роговатыя сѣменные сѣручья пришлись въ средину кучи, а охвостые наружу. Кучу съ верьху прикрытъ старыми дверьми, досками и шому подобнымъ, и наложишь еще гнетъ изъ камней или деревянныхъ обрубковъ, чѣтобъ кучу хорошенько списнуть. Оспавишь такъ лежать дни 3 или 6, въ разсужденiи того, холодна или тепла погода; но однако оглядывать чрезъ 3 или 4 дни. Еслили внупри кучи такъ горячо, чѣто почти яйцо свариться можетъ, тогда отъ кучи начнетъ сильно вонять и дымишься, а сѣручья къ загниванiю приходишь; тогда время кучу изподоволь разворочать, а именно: выдергивать

нѣсколько горшею одну по другой изъ кучи, попрысать оныя надъ разоспаннымъ верешемъ, ударяя рукою по правѣ, отъ чего сѣмена сами собою выпадушъ. Однакожъ выбиванія сего не должно производить палкою, попому что зерна тогда бываюшъ еще очень мягки и могушъ бытъ разплющены. По равной причинѣ работа сія не производится въ обуви, но работникамъ должно бытъ въ однихъ чулкахъ или босымъ, чтобъ зерна не давили. Когда вышепомянутыхъ признаковъ еще нѣтъ, и слѣдственно поспѣніе не кончилось, накладываютъ доски и гнетъ опять на кучу, пока зерна дойдутъ. Не каждая шакже былина съ своими спручьями можетъ въ одно время съ прочими пропоспѣть; почему зеленые ошкладываютъ, и когда прочія выпрысаны будутъ, складываютъ ихъ обратно въ кучу, накладываютъ гнетъ, и держатъ, пока въ нихъ зерна дойдутъ. Выпрысенную праву, попому что она бываетъ очень влажна, разстилаютъ на току тонкимъ слоемъ, и ешлы шокъ въ сараѣ, отворяютъ двери и окна, чтобъ въпромъ оную продуло. По высохнутой соломы выбиваютъ изъ нее оставшія зерна кочережками деревянными, ударяя слегка.

и) Выпрысенныя сѣмена разсыпаютъ на верешяхъ тонкимъ слоемъ, въ прохладномъ мѣстѣ, въ застѣни отъ солнца.

Дол-

Должно оныя въ день по крайней мѣрѣ однажды переворачать: въ упущеніи сего ворочанія и разгребанія зерна пророснушъ, и тогда къ бишью масла сдѣлаются не способны.

ї) Высушенные шаковымъ образомъ сѣмена очищаютъ отъ пыли и сору. Очищеніе состоитъ въ вывѣваніи, спалываніи и просѣваніи въ грохотъ, гдѣ оной при гумнѣ содержишся.

к) По увѣренію помянутого Г. Рейхарта нѣтъ опасности, чѣмъ отъ шаковаго разгоряченія кучи могло загорѣться, хотябъ она складена была въ сараѣ или на пошолокѣ; но не должно просматривать вышесказанныхъ признаковъ пропѣвнїя кучи; ибо еслии только 5 или 6 часовъ лишнихъ оную передержишь, всѣ зерна пророснушъ и испорчашся.

л) Еслии шаковая куча будетъ складена въ полѣ, то отъ мѣстнаго дождя полезно оную прикрывать досками. Еще въ разсужденіи слѣдующаго пошомъ вымолачиванія зеренъ на полѣ должно припомнить, какъ для сего шокъ лучшимъ образомъ прѣуготовлять. Сглаженное лопатками мѣсто ушапшывается ногами, усыпается ячменною мякиною, еще ушапшывается и убивается цѣпами. Это должно производишь предъ самымъ вымолачиваніемъ зеренъ, а именно какъ скоро примѣчено будетъ, что

недоспѣлыя зерна въ кучѣ дошли, и погода продолжишя ясная. Есѣли шокъ сдѣлашь прежде, оной испрескается, и зеренъ много пропадетъ на немъ. Есѣли же шокъ будетъ сыръ, то при молошѣбѣ много зеренъ въ него вписнепся, и при шаковомъ обшояшельспѣвѣ лучше въ полъ молошѣбу не производишь.

м) Очень не хозяйственное дѣло оставлять срѣзанное рѣпное сѣмя лежащъ на полѣ дней 8 и 14, пока оное дождемъ смочишь. Дождь производитъ, что высохшіе предъ шѣмъ спручки лопаются, ошъ чего великая прапа зернамъ происходитъ. Справедливо, что много зеренъ въ соломѣ остаешя, есѣли вымолачиваніе оныхъ шончасъ по срѣзантіи производишя; но сушеніе сего распѣнїя на горспяхъ или на рядахъ потъ же ущербъ зернамъ приключаетъ. По сему складываніе въ кучу къ потѣнїю есѣ лучший къ сбереженію оныхъ способъ.

н) Когда сѣмена не высушены, должно оное произвести въ амбарѣ на полу, которой не имѣлъ бы шрешинъ. Въ шаковомъ намѣренїи насыпаются оныя сломъ пальца на полтора шолщины, и разгребаются въ первую недѣлю ежедневно дважды и шрижды, потомъ однажды, граблями, пока совершенно высохнутъ; послѣ шого вычищающя и хранящя до употребленїя.

о) Жатва рѣпнаго сѣмя случается въ концѣ Іюня, за долго до жатвы ржаной; почему есть довольно времени къ совершенію показанныхъ дѣйствій для полученія зеренъ его доброшными. Земледѣлецъ за рѣпное сѣмя получаетъ первыя деньги къ исправленію расходовъ, потребныхъ для жатвы, какъ-то бываетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть масляныя мѣльницы, и для оныхъ маслоносныя сѣмена собираютъ.

п) Что противу посѣву рѣпнаго сѣмя въ возраженіе сказать можно, состоитъ въ слѣдующемъ: 1) крестьянинъ занимая подъ оное землю, терпитъ уронъ въ соломѣ и гуменномъ корму; 2) оное опинаетъ у прочихъ пашенъ лучшій навозъ, служащій къ урожаю хлѣба. На это служишь въ отвѣтъ: 1) для чего въ мѣстахъ, гдѣ много льну сѣютъ, не дѣлаютъ такого возраженія? Рѣпнаго сѣмя солома, когда по вымолоченіи въ полѣ будетъ размешана и хорошо высушена, служишь въ подстилку и умноженіе навозу. Многократно у крестьянъ послѣ продолжительныхъ зимъ бываетъ недостатокъ въ подстилочной соломѣ; оную могутъ они имѣть въ соломѣ рѣпнаго сѣмя, пока новая жатва принесетъ имъ обыкновенную солому. Мякина, при молоченіи рѣпнаго сѣмя производящая, естьли только довольно бу-

дешъ высушена, въ рѣзкѣ съ хлѣбными соломами составляющъ сполькожъ хорошій кормъ рогатому скоту, какъ и всякая другая мякина. Есшлы же крестьянинъ про свой расходъ будетъ бишь изъ рѣпнаго сѣмя масло, получающъ жмыхи, соспавляющія очень питательной кормъ скошинъ въ пересыпку мѣсива. Гдѣ общизна полей и скопашны оупрѣшена, тамъ пашня, бывшая подъ рѣпнымъ сѣменемъ, можетъ въ томъ же году бытъ упошреблена подъ сѣвъ другихъ хлѣбовъ или кормныхъ травъ: ибо рѣпное сѣмя, поспѣвая къ половинѣ Юня или по крайней мѣрѣ къ концу, а пашня подъ нимъ очень умягчается, что нужно оную лишь однажды вспахать, и тошчасъ посѣять малой ячмень или горошекъ. Кому это не угодно, можетъ тошъ для корму скошинъ посѣять большую бѣлую рѣпу или шурниисъ. Когда и то не нужно, а надобно что нибудь служащее въ пищу человѣческую и при томъ скопинъ кормъ доспавляющее, предлагаю саженье бѣлки, кою въ этомъ намѣреніи должно поздно въ огородъ на малой грядкѣ посѣять, и разсаду сію высадить на пашнѣ, бывшей подъ рѣпнымъ сѣменемъ. Не должно опасаться, чтобъ это предложеніе писалъ я только отъ скуки, и составляло оное вещь неиспытанную. Въ нашей округѣ производился великой сѣвъ льну, которой сѣ-

сѣютъ косеши (родъ бобылей) на своихъ усадьбищахъ. Когда ленъ въ половинѣ Іюля будетъ выбранъ, имѣютъ шаковые люди въ запасъ брюквенную разсаду, кою за нѣсколько недѣль въ этомъ намѣреніи сѣютъ, и высаживающъ оную по вспаханному и гладко выскороженному льнищу. Корни брюквы онѣ того бывающъ несравненно больше, нежели онѣ разсады, высаживаемой въ обыкновенное время въ Маѣ мѣсяцѣ, да и въ вареніи бывающъ мягче. Этимъ сажденіемъ довольно испытано, что нѣсколько ранѣе посаженная брюквенная разсада еще и того меньше не опспанетъ, или ростомъ не дойдетъ, и надежды въ собраніи изобильнаго корму въ листьяхъ, стволахъ и корняхъ брюквенныхъ не обманетъ. На послѣдокъ осталось подать совѣтъ для тѣхъ мѣстъ, гдѣ въ поляхъ еще общизна и черезполосное владѣніе, чтобъ бывшую подъ рѣпнымъ сѣменемъ землю въ томъ же году обратиться къ полученію съ нее скотскаго корму. Надлежитъ съ общаго согласія владѣльцовъ выдѣлить, такъ какъ то случается всюду съ ошдѣлами подъ такъ называемой лѣпшій сѣвъ, особое мѣсто въ паровомъ клину подъ рѣпное сѣмя, и оное пасьбою скопа въ осень пощадить; или когда сего учинить не лѣзя, то между десятиной, которыя были подъ пшеницею, и какъ пшеничная жатва

бываетъ въ Августѣ, а скопину по жнивью пускаютъ въ концѣ сего мѣсяца или въ началѣ Сентября; то можно еще сѣять на томъ мѣстѣ, гдѣ снято рѣпное сѣмя, поздний горошковый кормъ: ибо когда горошекъ посѣять съ 20 Іюня, а оной поспѣваетъ въ 7 или 8 недѣль, можетъ и онъ по снятїи съ поля озимаго хлѣба снятъ быть. На зеленѣ скошенной и засушенной горошекъ составляеиъ сполькожъ питательное сѣно, какъ дяшловинное. Не мѣшаетъ, что не будетъ въ немъ спручевъ и зеренъ: сѣно тѣмъ сочнѣе будетъ, и намѣситъ эиотъ недостапокъ. Положимъ, что и не доспало бы времени подкошенкой горошекъ на мѣстѣ высушить, можно справу перевезти въ другое поле, гдѣ скопины не пускаютъ, и тамъ досушить. 2) Расходъ навозу на землю подъ сѣвъ рѣпнаго сѣмя бываетъ и при сѣвѣ льну, равно и всякихъ иныхъ плодовъ полевыхъ. Эиотъ же навозъ принесетъ пользу хлѣбамъ, кои впредъ шумъ будутъ сѣяны.

- р) Когда случишя, что рѣпное сѣмя долго простиитъ подъ водою, или песѣяно негодными сѣменами, а пошому пропадетъ, теряющя въ эиомъ случаѣ лишь одни сѣмена, что въ сравненїи съ другими хлѣбными сѣменами бездѣлицу составляетъ. Въ шаковомъ рѣдко бывающемъ случаѣ пашню вспахавъ, засѣять ячменемъ.

- с) На землѣ, бывшей подъ рѣпнымъ сѣменемъ, можно сажать и сѣять разные полевые плоды, какъ-то пшеницу, полбу, ячмень, каршофели и тому подобное, не имѣвъ нужды вновь унавоживать, для того что изобильно угобженная подъ рѣпное сѣмя пашня можетъ на многіе годы удерживать свою шучность.
- ш) Для пчеловодства въ странахъ, цвѣтами недоснапочныхъ, когда прошедшій годъ былъ не урожаенъ, и нужно пчеламъ, съ шрудносшю прозимовавшимъ, сдѣлать помощь, ничѣмъ оной сполько оказавъ не можно, какъ посѣвомъ рѣпнаго сѣмя и рапса или кользаха; понеже на обоихъ растѣніяхъ сихъ медомъ изобилующіе цвѣты бывають уже въ Маѣ, такъ что пчелы не токмо рано получаютъ провишаніе, но и очень ранніе рои опущипать могутъ. А по сему государству, имѣющему надобность въ размноженіи пчеловодства и пріобрѣшеніи множайшаго воску и меду, должно всячески поощрять къ посѣву обоихъ помянутыхъ маслосныхъ растѣній.
- у) Въ Англіи, гдѣ зимы бывають очень легкія, сѣють озимое рѣпное сѣмя въ кормъ скотинѣ зимою. Въ нашихъ мѣстахъ овцамъ сѣвомъ рѣпнаго сѣмя можно больше принести пользы, нежели посѣвомъ хлѣбовъ; пошому что онѣ въ лисахъ озимаго рѣпнаго сѣмя имѣють зимнее лѣкарство опѣ загнишя легкаго

го и печени; пошому что рѣнное сѣмя, какъ скоро отъ морозовъ земля окрѣпнѣтъ, можно овцами справливать, что корнямъ вреда не приключаетъ, и оныя весною вновь опускаютъ здоровыя растѣнія и плодъ принесутъ.

Ф) Еще заслуживаетъ озимое рѣнное сѣмя одобреніе, какъ права, годная въ салатъ. Въ началѣ весны, когда еще недоставокъ въ салахахъ, сѣемыхъ на открытомъ воздухѣ, листья сего рѣннаго сѣмя первый салатъ составляютъ. Оный прѣготовляется сырой и вареной, какъ обыкновенные салаты. Послѣ ключеваго крессу салатъ травы рѣннаго сѣмя должно считаться самымъ здоровѣйшимъ; ибо составляетъ, по свидѣтельству искуснѣйшихъ врачей, доброе кровоочистительное, и можешь загустѣвшіе соки отчаси разбить, частью же привести въ движеніе. Многимъ особамъ средственнаго состоянія свойственно то, что по прошествіи зимы, можешь быть отъ того, что они долго удерживались отъ наслажденія открытымъ воздухомъ и получили нечистоту въ крови, или загушеніе въ сокахъ, упасть въ ослабленіе и болѣзнь: таковымъ салатъ рѣннаго сѣмя можешь сослать прѣянное весеннее лѣкарство, и припомъ таковое, которое желудка не отягощаетъ въ разсужденіи нѣжныхъ своихъ листьевъ, и что всегда производятъ салаты, имѣющіе

ющіе листы жесткіе, въ особахъ съ слабыми желудками. Ключевой крессъ, сколько ни ешь великое лѣкарство, не всѣмъ людямъ правится; для того чпо шѣснишь желудокъ, и шрудно въ ономъ варится.

Б. Яровое рѣпное сѣмя.

Яровое рѣпное сѣмя сѣютъ на такихъ пашняхъ, кои были прежде подъ озимымъ рѣпнымъ сѣменемъ. Но можешь оное урожашь на доброй средспвенной землѣ. Въ обыкновенномъ раздѣленіи полей на три клена сіе маслoносное расцѣніе получаетъ свой удѣлъ въ паровомъ клену, и соспавляетъ лѣпнѣй сѣвъ. Можно пашню по снятіи послѣдняго хлѣба, естли пасва скоша позволишь, вспашешь взмешомъ, въ началѣ весны довольно унавозишь, и навозъ запахашь. Можно попомъ пашню, естли она не травяниста, оспавишь такъ лежаешь не скородивъ до насшупленія времени къ сѣву въ концѣ Апрѣля; послѣ оную разъ бороною проволочъ, сѣмена расцѣишь, и тогда порядочно заскородишь. Гдѣ же пашня травянистая, т. е. на копорой всякія травы скоро произрастають, должно пашню, когда впрочемъ она довольно мягка, послѣ того, какъ въ прошлое лѣто или осень была вспашана взмешомъ, въ концѣ Апрѣля унавозишь, навозъ запахашь, и проскородивъ однажды бороною, по свѣжимъ бороздамъ расцѣишь. Но гдѣ земля связна и очень шверда, тамъ
ну-

нужно шрократное или больше скороженіе. По снятіи яроваго рѣпнаго сѣмя жнивье онаго шотчасъ вспахиваешся взмешомъ, и навозъ изъ глубины приподнимаетъ къ верху; послѣ изъ Августа вспахиваешся глубже, и разсѣвается озимой хлѣбъ, какъ-то пшеница, полба или рожь. Эшотъ озимой хлѣбъ послѣ яроваго рѣпнаго сѣмя при доброй погодѣ шоткожъ хорошо и чисто выросшетъ, какъ бы сѣянъ былъ по льнищу или коноплянищу. Послѣ сѣву рѣпнаго сѣмя можешъ пашиа еще два года безъ унавоживанія вновь обсѣваема бытъ, однажды озимымъ хлѣбомъ и разъ яровымъ; ибо полагаюшъ, что яровое рѣпное сѣмя лишь четвертую часть силы навозу въ себя выпягиваетъ. Можно эшо яровое рѣпное сѣмя сѣять инымъ разпоряженіемъ, на ряду съ прочими другъ за другомъ слѣдующими плодами; но здѣсь описанный считаюшъ самымъ выгоднѣйшимъ.

а) Мѣра сѣменъ яроваго рѣпнаго сѣмя равна противъ мѣры озимаго, по предписанію Экхаршову; однакожъ во всѣхъ родахъ яровыхъ хлѣбовъ мѣра сѣменъ прошиву озимыхъ можешъ бытъ убавлена: пошому что въ посѣвѣ озимыхъ хлѣбовъ мѣру сѣменъ прибавляюшъ на опасности зимнія; въ яровомъ же рѣпномъ сѣмѣ шѣмъ больше, что сѣмена его озимаго рѣпнаго сѣмя дробнѣе. Ештли удася сѣвъ произвестъ шакъ, что скоро послѣ шого дождъ пойдетъ, и еще
нѣ-

нѣсколько дней продолжись, тогда яровое рѣпное сѣмя уродись очень хорошо. Продолжительная же въ послѣдствѣ засуха и жаръ плоду сему очень вредна.

б) Подъ сѣвъ всякихъ drobныхъ маслoносныхъ сѣменъ должно пашню очень мягко проскораживать, чшобъ не оспавалось швердыхъ глыбъ: ибо оныя мѣшаютъ всходу сѣменъ, и урожай отъ нихъ уменьшаютъ, поелику нужно, чшобъ растѣнїя всю землю укрыли.

в) Когда рѣпное сѣмя отпростѣтъ вершка въ три, выпалываютъ оное на правянистыхъ пашняхъ. Если же сѣе будетъ пропущено, отчасти урожай рѣпнаго сѣмя уменьшится, частью же окажется при молотбѣ много сѣменъ сорныхъ травъ, а пришомъ и пашня въ намѣренїи будущихъ на ней хлѣбныхъ сѣвовъ отъ размноженїя сорныхъ травъ заобложѣетъ.

г) Луи, отъ лѣшнихъ дождей произходящїя, не меньше приключаютъ вреда рѣпному сѣмю. Для сего пахатныя гряды должно къ срединѣ дѣлать возвышенїемъ (*), чшобъ лужи отъ сильныхъ дождей

(*) Гряды пахатныя должно разумѣть двояко: однѣ производятъ отъ пропахиванїя по десятинѣ глубокихъ водосточныхъ бороздъ; другїя же при запахиванїи разсѣянныхъ сѣменъ грядами, отъ перекладыванїя на сохѣ полицы, когда пахарь проходитъ по десятинѣ вдоль и обратно, шo на правой, шo лѣвой сошникѣ.

ждей на оныхъ не засаивались, но стекали бы въ водоводныя борозды и къ межникамъ.

- д) Когда случится сухая весна, очень не рѣдко нападають земляныя блохи, и рѣпное сѣмя яровое совсѣмъ сѣбдаютъ. Въ вышеприведенномъ Императорскомъ Австрійскомъ повелѣнїи о посѣвѣ рѣпнаго сѣмя сообщено прошиву оныхъ на-
савленїе, чѣмъ около всего загону отъ межниковъ, отдѣляя земли на двѣ гряды, обсѣвать оныя сѣрою горчицею, мѣшая оную съ 10 долями земли противъ мѣры сѣменъ, въ тожь время, когда высѣвается рѣпное сѣмя. Земляныя блохи нападають на одну горчицу, и оставляють рѣпное сѣмя въ покоѣ. Не рѣдко обвѣденная горчица опрыскивается, приноситъ сѣмена, и можетъ быть употреблена на бѣлье масла, или въ праву кушанья. — Если же горчица пропадетъ, должно мѣсто, подъ нею бывшее, вспахать или вскопать, и обсѣять какимъ нибудь яровымъ хлѣбомъ. Если бездождіе продолжится не много, блохи всходамъ поврежденїя не сдѣлають.
- е) Г. фонъ Юсти предлагаетъ прошиву земляныхъ блохъ, что съ начала Мая до конца Іюня мѣсяца можно разпорядить нѣсколько сѣвовъ, какъ-то обычно съ гречихою, дабы когда пропадетъ одинъ сѣвъ, могли бы остаться прочїя. Второе его же предложенїе къ избавленію отъ
земля-

земляныхъ блохъ, сѣять рѣпное сѣмя по Брабандскому обыкновенію. Избирающіеся шамъ огороды или пашни, близъ воды лежащія, чѣобы можно было по часпу оныя поливать. Когда молодыя расшѣнія шаковымъ поливаніемъ избавлены будуще, пересаживающіе оныя, подобно капустной разсадѣ, на оставляемыя къ тому особливия грядки, въ 4 вершкахъ между собою разстояніемъ. Это удобно дѣлать въ Нѣмецкой землѣ колоністамъ, у которыхъ земли и ручной работы мало.

ж) Опречь земляныхъ блохъ, еще другія роды насѣкомыхъ яровому рѣпному сѣмени вредящъ. Какъ шѣ бѣлые червячки, такъ и черныя лоснящіяся гусеницы, которыя пробѣдающъ скважины въ спручьяхъ, и нападаютъ во время теплой погоды съ перемѣжкою дождей. Называютъ сихъ насѣкомыхъ *дудочниками*, въ разсужденіи провершыванія ими скважинъ въ спручкахъ и сѣменахъ, пока оныя еще мягки.

з) Въ случаѣ, когда яровое рѣпное сѣмя пропадетъ, можно, есѣли по причинѣ позднаго времени шо не мѣшается, сѣять малой ячень, или сочевичной кормъ, или сажать разсаду брюквенную на шѣхъ мѣстахъ. Есѣли же обстоятельства не позволяютъ, пропадаютъ тогда лишь одни высѣянныя сѣмена и обрабатываніе земли. Посредствомъ перепашекъ прѣ

Часть III. Отдѣл. 2. К уго-

угошворяютъ землю лучшимъ образомъ къ будущему озимому сѣву; и такъ полезно сѣять это рѣпное сѣмя въ паровомъ клину, какъ лѣпнѣй сѣвъ.

и) Въ разсужденіи поспѣванія яроваго рѣпнаго сѣмени, должно наблюдать все то, что сказано объ озимомъ. Если посѣяно оное въ концѣ Апрѣля, и весна была больше мокра, нежели суха, скоро оное пойдетъ въ ростъ, и въ половинѣ Іюня уже поспѣетъ. Срѣзывающъ оное также пошпру сѣ росою, чтобы зеренъ не прашилось. Но чтобы сего послѣдняго намѣренія достигнуть тѣмъ лучше, выдергиваніе растѣній сѣ корнемъ предпочитается, ибо при ономъ зернамъ гораздо меньше попрашны происходитъ; а сѣе полезно наблюдать и сѣ озимымъ рѣпнымъ сѣменемъ, сѣ рапсомъ и тому подобными масленосными растѣніями. Работники при срѣзываніи оныхъ почасту обходящя очень неосторожно, либо нагибая верхи сѣ сѣменами къ низу, или имѣвъ не довольно острые серпы, оными больше рвутъ, нежели рѣжутъ, и тѣмъ зерна вытрясаютъ.

ѣ) На послѣдокъ должно припомнить въ разсужденіи запасенія будущихъ сѣменъ, чтобы оныя при вѣянтіи опниматы отъ чолушка или самыя тяжеловѣсныя; ибо рѣпное сѣмя бываетъ рѣдко удачно, когда сѣмена не хороши. Можно сѣмена

вы-

выписать изъ другихъ мѣстъ, и за-
благовременно испытывать оныя посѣ-
вомъ малаго дѣла въ саду или огородѣ.
Есѣли оныя взойдутъ хорошо и бодро,
таковыя брать къ посѣву. Это самое
нужно производить и съ озимымъ рѣ-
пнымъ сѣменемъ, также съ рапсомъ.

В. Рапсъ или колызатъ.

Рапсъ (который въ переводѣ Россій-
скомъ можетъ именованъ бытъ *капу-
стенникъ*) есѣ маслосное сѣмя, очень
сходное къ озимому рѣпному сѣмени, и
требуетъ подъ себя тучной хорошо уна-
воженной земли, съ равнообразнымъ прѣ-
угошовленіемъ. По ноямъ, ш. е. вновь
разпаханнымъ облогамъ, урожаеѣся онъ
лучше озимаго рѣпнаго сѣмени. Имѣетъ же
онъ предъ нимъ шо главное преимущесѣво,
что зиму лучше выдерживаетъ, и не
таковъ нѣженъ. Зерна его крупнѣе. Вре-
мя сѣву и мѣра сѣменъ одинаковы съ ози-
мымъ рѣпнымъ сѣменемъ.

а) Рапсъ (говоришъ Авторъ) еще не
сполько въ нашихъ мѣстахъ извѣстенъ,
сколько заслуживаетъ; однакожъ не есѣ
совсѣмъ новый плодъ въ Нѣмецкой зе-
млѣ, ибо зналъ его еще *Экхартъ*, самъ
сѣялъ и нашелъ вышеписанныя въ немъ
выгоды. Между новѣйшими домовод-
ства учителими Г. фонъ *Шейфельдъ* въ
Трахенау близъ Лейбцига не шокмо
знавалъ оное, но сѣвалъ и выхваляетъ.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ начинаютъ

рапсѣ называшъ кользашъ, подѣ каковымъ именемъ это маслосное растѣніе сѣюшъ въ Нидерландахъ, а особливо близъ Риселя.

б) Маслобойники утверждаютъ, что рапсѣ цѣлою трепью даетъ больше масла, нежели озимое рѣпное сѣмя; напрошивъ иные Хозяева утверждаютъ, что озимое рѣпное сѣмя умолотнѣе. По Экхартову опредѣленію долженъ масленикъ дать изъ полуосмины озимаго рѣпнаго сѣмени масла 36 и 38 фунтовъ, слѣдственно изъ четверти бочку во $146\frac{2}{3}$ фунтовъ. (По Россійскому сравненію около 3 ведръ Калужскихъ, содержащихъ по 50 фунтовъ).

в) Г. фонъ Шейфельдъ совѣтуетъ рапсѣ такъ рано сѣять, чтобъ можно было его до нѣскольکو разъ скосить въ кормъ скотинѣ, а потомъ оставить принести сѣмена. Рогатый скотъ ѣстъ оной охотно, и пошому имѣетъ очень питательный свѣжій кормъ. Также и снѣманіе травы съ корней рапса самое изобильнѣйшее, каковое шокмо можетъ приносить какое либо растѣніе. Говорено будетъ о сѣмъ пространнѣе въ главѣ о кормныхъ травахъ, въ началѣ четвертой Часпи.

АА. *Употребленіе и содержаніе масла изъ рѣпнаго сѣмени и рапса.*

Простому народу нужно къ освѣщенію себя въ ночники масло, къ чему рапсовое

и изъ рѣпнаго сѣмени, какъ въ свойствахъ своихъ совершенно между собою сходящіяся, преимущественно служащія. Гдѣ сего маслоснаго сѣмени въ полѣ еще не сѣютъ, всегда покупаютъ сало въ городахъ. Для сего земледѣльцамъ нужно съ плодомъ симъ познакомиться, дабы впредь избавившись выдачи денегъ на масло и сало. У насъ хотя въ тѣхъ округахъ, гдѣ много льну сѣютъ, крестьянинъ сжегъ въ ночникъ своею льняное масло домашнее, но копоть оную онаго крайнѣ вредна груди, и тяжело пахнетъ. Масло изъ рѣпнаго сѣмени не опасно здоровью, и для того должно въ этомъ намѣреніи постѣвъ онаго всюду вводить (*).

Крестьянинъ къ пріуготовленію себѣ коломази долженъ мѣшашъ какія нибудь жирности съ густымъ дегтемъ. Еслили будетъ у него рѣпное масло дома, не имѣетъ онъ нужды жирностей покупать, или опнимать оныя оу поваренныхъ своихъ пошребѣ. Имѣетъ онъ надобность

К 3

и

(*) Хотя въ Россіи конопляное масло и могло бы достаточествовать крестьянамъ для ночниковъ домашнее, но по странной привычкѣ къ старинѣ жгутъ они для освѣщенія по ночамъ лучину, отъ которой дымъ очень для глазъ вреденъ; хотя впрочемъ и отъ коноплянаго масла копоть не лучше сего дыму. Полезно поощрять крестьянъ къ постѣву иностранныхъ маслосныхъ растѣній, и научать употребленію изъ оныхъ масла; а особливо по тому, что въ безлѣсныхъ мѣстахъ покупка лучины дороже самаго масла.

и въ мылѣ. Масло изъ рѣпнаго сѣмени преимущественно къ тому полезно. Городскимъ жишелямъ также оное по сему предмету нужно (*), кромѣ употребленія онаго по другимъ городскимъ упражненіямъ, на прим. пріугошовленія волны къ пряжѣ, и проч.

На послѣдокъ даже и въ простыхъ хижинахъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ давно уже вѣдають, какъ масло изъ рѣпнаго сѣмени пріугошовлять въ пищу, а именно варивъ оное на умѣренномъ угольномъ жару, съ кускомъ кислаго хлѣба, чѣмъ суровъ и непріятноснъ изъ сего масла извлекается, а чрезъ то оное вкуснѣйшимъ учиняется.

Славный Аббапъ *Розьеръ* издалъ въ свѣпъ свое открытіе, опчаси какъ лучшимъ образомъ рѣпное сѣмя и рапсѣ сѣяль, часпью же пріугошовлять изъ нихъ масло, освобожденное отъ всякаго противнаго вкусу и запаху. Я включу здѣсь главнѣйшее изъ того: — Для кользату (рапса) земля лучшая та, кошорая годится подъ пшеницу. Распѣнія его на пашнѣ должны сидѣть между собою по крайней мѣрѣ въ 9 вершкахъ. Для чего сѣять оное не такъ, какъ хлѣбы, прямо въ землю, но сперва какъ разсаду на особливомъ мѣстѣ, и осенью уже должно высаживать на пашню, но при пересадкѣ корней не отры-

(•) Во всей Нѣмецкой землѣ ни одинъ Хозяинъ почти не покупаетъ про свой расходъ мыла. Какъ оное изъ домашнихъ вещей варить, показано будетъ въ IX части сего сочиненія въ главѣ V.

рывать. Спѣлыя сѣмена вычищать начисно отъ пыли посредствомъ просѣванія въ рѣшено, въ которое зерна бы не проскакивали. Чѣмъ чище будутъ сѣмена, тѣмъ меньше шануть привлечь къ себѣ влажности; тѣмъ меньше будутъ приходишь въ броженіе, и тѣмъ слаще и пріятнѣе выдесть изъ нихъ масло. Когда сѣмена несовершенно высѣются, не таковъ дадутъ выходъ масла. Если сѣмена въ печеніи полугодѣ не будутъ перебиты въ масло, вредно эшо; потому что флегма въ нихъ столько высохнетъ, что не можеть, какъ бы надлежало, совокупиться съ существеннымъ масломъ. При выбиваніи масла опнюдь не должно употреблять огня, но только нагревать лашки, зимою посредствомъ горячей воды. Масло, получаемое при послѣднемъ выгнетаніи посредствомъ поджариванія, скоро горькнетъ. Нужно жернова и гнеты, если оныя долго употребляемы не были, напередъ вычищать, и опнюдь не брать посуды, въ которой находилось прогорьклое масло. Запахъ и вкусъ масла будетъ пріятнѣе, когда свѣжія или уже засохшія сѣмена помочить въ прохладномъ мѣстѣ сушки полторы или двои въ обыкновенномъ зольномъ щолоку, пріугошовленномъ безъ огня слабою известною водою: одного фунта извести доспаточно на сдѣланіе 1000 фунтовъ известной воды, которой потребно 3 или 4 фунта къ выщелоченію золы. Вы-

щелоченныя зерна сполоскашь послѣ до нѣ-
 сколько разъ въ водѣ, и положишь въ са-
 мой слабой разтворѣ воды съ квасцами;
 послѣ высушишь зерна сѣи тщаельно
 къ выгнетанію изъ нихъ масла. *Чтобъ*
масло не прогорькало, которое произхо-
 дишь отъ того, что флегма изъ него оп-
 сядаетъ на дно, разпусти 2 часни ква-
 сцовъ и одну часть мѣлу на водѣ, какъ
 жидкую кашу, напой въ этомъ раз-
 творѣ грецкую губку, и опусти на дно
 посуды, въ которой содержишься масло.
 Губку эту обще съ дрожжами должно еже-
 годно изъ посуды вынимать, очищать, на-
 поять вновь таковымъ же разтворомъ,
 и класъ въ масло. Равномѣрно хорошо,
 естли въ масло класъ сахару, разшер-
 ши оной напередъ съ малою долею того
 же масла. Но естли масло уже про-
 торькло, то отъ сахару испортишся еще
 больше. Совсѣмъ прогорькляя масла по-
 правляють таковымъ образомъ: разогрѣшь
 масло слегка, влишь въ оное хлѣбнаго
 вина, тогда шеплош прибавишь, пока
 вино придетъ въ колеблющееся или дро-
 жащее движеніе, однакожъ не вскипая,
 тогда посуду нѣсколько поколыхать,
 слишь масло съ вина, и еще разъ повто-
 ришь то же дѣйствіе. Вино, къ сему упо-
 требленное, можно опяшь очистишь. —

Поелику въ концѣ этой главы бу-
 дущъ описаны многія средства къ попра-
 вленію масла, у насъ по разнымъ мѣ-
 стамъ

стамъ употребительныя, шо сѣе *Розьеро*во наставленіе, еще мало у насъ извѣстное, приложилъ якъ рѣпному сѣмени, опчасти для того, что въ ономъ упомянуто объ особливомъ обхожденіи съ онымъ, котораго одного въ большемъ количествѣ производишь не можно; часнью же въ особливости относишельно до рѣпнаго сѣмени, каковой нѣтъ въ другихъ маслодающихъ сѣменахъ, на примѣръ въ льняномъ, а именно, чтобъ не держать онаго больше полугоду, не перебивъ въ масло. Въ этомъ у насъ очень погрѣшающъ Хозяева, держашъ оное больше году, дабы опчасши продать подороже цѣною, часнью же что и самые маслобойники держашъ свой запасъ по столько и больше, не перебивая въ масло. Но сего одного общоупельства уже довольно, чтобъ рѣпное масло непосредственно послѣ самаго выбиія сдѣлалось мушно, горько, зловонно и не вкусно. Когда же масло въ предписанное время будетъ выбито, а потомъ въ хорошемъ порядкѣ будетъ сохранемо въ посудѣ, масло свободно будетъ отъ всякаго поврежденія, и можно выжидать продажу онаго до хорошихъ цѣнъ. Чѣмъ спарѣе таковое масло, тѣмъ свѣжѣе и въ продажу способнѣе.

ББ. *Выгоды отъ продажи масла.*

Сказано только теперь, что продажу выбиатаго рѣпнаго сѣмени, столькожъ выжидать можно, какъ и продажу непере-

битыхъ зеренъ. Но какъ въ иныхъ деревняхъ много рѣпнаго сѣмени урожаешь можешь, а особливо гдѣ великой оному сѣву, какъ въ вышеписанныхъ провинціяхъ, въ иныхъ деревняхъ вымолачивають онаго по 120 и по 180 чешвершей; то по крайней мѣрѣ больше шрешей доли можно получитьъ барыша отъ продажи масломъ, нежели зерномъ. Вотъ самое умѣренное къ шому изчисленіе.

Полная полуосмина рѣпнаго сѣмени полагается въ продажѣ полшора рубли. Изъ оной получается масла 18 квартъ (или около двухъ ведръ), полагая кварту по 12 коп. выдешъ на 2 рубли 16 копѣекъ. Далѣе 4 жмыха, по 36 коп. каждой; всего на 3 руб. 60 коп. изъ шого изключить за пробой 78 копѣекъ, останешся 2 руб. 82 коп. Но случается на рѣпное сѣмя дороговизна, и шогда кварта продается копѣекъ по 20 и по 30; выдешъ въ первомъ случаѣ за продажу масла 4 руб. 26 коп. а въ послѣднемъ 6 руб. 6 коп. Но мы останемся при самомъ умѣренномъ разположеніи; и такъ барышъ отъ продажи масломъ выдешъ слѣдующій.

Изъ полуосмины озимаго рѣп-

наго сѣмени выдешъ масла 18	руб.	коп.
квартъ, по 12 копѣекъ каж.	2	— 16
4 жмыха по 36 коп.	-	- 1 — 44
		<hr/>
		3 — 60

Поло-

Полосмины рѣпнаго сѣмени споишѣ 1	—	50
За пробой	- - -	78
		<hr/>
	2	28

Останется барыща отъ битья покупнаго рѣпнаго сѣмени 1 руб. 32 коп. у полуосмины; а у четверти 5 руб. 28 копѣекъ.

Однакожъ отъ маслобойниковъ на мѣльницахъ не можно ожидать, чшобъ они дали сколько и добраго масла изъ полуосмины, сколько выбишо онаго бытъ можешъ въ домашнемъ стану масляномъ. Тоже обшпояшельство и въ разсужденіи жмыховъ. А сего за бездѣлку щипать не можно; ибо жмыхъ положишь хопя по 20 копѣекъ, шо дорогого споишъ онъ для покормленія скошины. Можно въ мѣсивѣ и поилъ какъ старой, такъ и молодой скошины, совершать оными много дѣла. По сему Хозяину, принимающемуся за сѣвъ рѣпнаго сѣмени, совѣшную заводишь притомъ и собственную маслобойню. Простой земледѣлецъ можешъ имѣть къ битью масла ручной станъ, а господинъ мѣльницу водяную или приводимую въ движеніе лошадыми. О мѣльницахъ сихъ главнѣйшее описано будешъ въ концѣ этой главы.

Г. Восточно-Индѣйская масляная рѣдка.

Восточно-Индѣйская масляная рѣдка, или Китайское масляное сѣмя, *Rapbanus Chinenfis oleifer*, у Линнея, есть отродіе рѣдки, кошую Г. фонъ Экебергъ пер-

первой въ Швецію вывезъ, и нашель, что климатъ этой страны совсѣмъ сему маслосному растѣнію не противенъ. Онъ нашель далѣе, что растѣніе это весьма богато урожай сѣменъ приносиль, кои похваляель за выходъ масла, которой противу вѣсу сѣменъ до 50 проценсовъ просиращается, или что изъ сѣменъ выходиль противъ вѣсу ихъ на половину вѣсомъ масла. Масло изъ оныхъ, пока еще свѣже, въ кушаньѣ не имель никакого противнаго вкусу, и щипаель онъ, что въ послѣднемъ свойствѣ оное у всѣхъ масляныхъ зеренъ, до днесъ намъ извѣстныхъ, возьмель первенство, и естли не заимиль собою оныхъ, по крайней мѣрѣ оспанелься на ряду съ лучшими. Но слѣдствія оказали совсѣмъ противное. Начали въ разныхъ мѣстахъ посѣвъ сихъ иностранныхъ сѣменъ не малымъ дѣломъ, даже въ шѣхъ обласяхъ, гдѣ процвѣшаль свѣвъ рѣпнаго сѣмени. Но съ году на годъ начали опчасу больше оное бросать, и взялись по прежнему за рѣпное сѣмя, коего воздѣланіе не столько трудно и припомъ выгоднѣе.

Запрудненіе, опличающее масляную рѣдкую опъ рѣпнаго сѣмени и рапса, состоитъ въ томъ, что оному росту должно очень просторно, и какъ спекающемуся растѣнію пошребна подпора, чтобъ не свалилось и не загнило. Естли оное подпѣрь, принесель оное не токмо изобиліе въ разсужденіи количества, но

и качества; ибо зерна ея въ этомъ состоянїи будущъ крупнѣе и маслянѣе.

Можетъ же это растѣнїе родиться на всякой, шокмо не совсѣмъ изпощенной землѣ; а лучше на таковой, копорая въ силахъ побудить роснѣ. Но земля подъ него пошребна больше рыхлая или глинистая, нежели тучная и припомъ не свѣже унавоженная. Понеже на шраву масляной рѣдки, когда она еще молода и нѣжна, нападаютъ земляныя блохи и совсѣмъ погубляющъ, не должно сѣвомъ ея весною посадить, чшобъ растѣнїя заблаговременно укрѣпились, и не сполькобъ привлекали между шѣмъ родившихся насѣкомыхъ. Ученныя опыты доказали, чшо растѣнїе это можно сѣять осенью подобно озимому рѣпному сѣмени, и чшо оное зиму нашу выдерживаетъ.

Кишайцы сѣютъ оное на длинныхъ, но узкихъ грядкахъ, и огораживаютъ оныя жердками на поларшина отъ земли вышиною, чшобы разсплашья спебли сего растѣнїя поддерживашъ. Копотъ отъ сего масла, сожигаемаго въ ночникахъ, собираютъ они въ надвѣшенныя простыни, для составленїя своихъ чернилъ или шуши; самое же масло мѣшаютъ съ негашеною извесью, и эшимъ кишшомъ замазываютъ швы у своихъ водоходныхъ судовъ, къ сохраненїю оныхъ отъ морскихъ червей.

Хотя это масленосное растѣнїе по сѣхъ поръ еще не могло оспорить у насъ
пер-

первенства у рапса и рѣпнаго сѣмени, но не бесполезно оное сѣять небогатымъ людямъ, и при томъ такавымъ образомъ, какъ дѣлають оное Кишайцы.

Д. Рыжикъ.

Рыжикъ въ Нѣмецкой называется *Dotter-Saamen*, *Lein-Dotter*, *Flachs-Dotter*, *Sinken Saamen*, *kleiner Del-Saamen*, у *Линнея* *Myagrum Sativum*; почасу оказывается оной на хлѣбныхъ поляхъ дикорастущей, и въ противоположеніе оному сѣемой рыжикъ называется огороднымъ или посѣвнымъ. Онъ приноситъ свои на верьху вѣшвей сидящіе малые желтоватые цвѣты на длинныхъ стебелькахъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ. Продолговатые, шріугольныя желтоватые его сѣмена содержащія въ яйцеобразныхъ, нѣсколько вздувшихся двуклетчатыхъ спручкахъ.

Это маслосное сѣмя должно на унавоженныхъ пашняхъ сѣять рано весною, и наблюдать, чтобъ оное не переспѣло, въ каковомъ состояніи спручки сами собою разверзаются и сѣмена изъ нихъ выпадають.

Изъ полуосмины его сѣменъ можетъ вышсти до 18 и 20 бутылокъ масла; и хотя оныя въ разсужденіи количества выходу масла рѣпному сѣмени не уподобляющіяся, однако превосходящъ въ добротѣ онаго. Къ пріготовленію рѣпнаго масла въ пищу надобно еще прилагать искусство; а рыжиковое масло того не требуетъ: ибо оное можно вмѣсто коровьяго ѣсть съ хлѣбомъ.

бомъ. По самому сему обстоятельству можно оное употреблять въ лѣкарство, вмѣсто другихъ выгнѣаемыхъ маслъ. Сѣменами рыжика можно содержать малыхъ пѣвчихъ пшичекъ, сидящихъ въ клѣткахъ: онѣ ѣдятъ ихъ съ опмѣнною охотою, почему и прозваны въ Нѣмецкой землѣ *Zinzen-Saaten*, т. е. синичье сѣмя.

Е. Горчица.

Выше сего подъ буквою Б. упомянуто объ горчицѣ, яко средствѣ къ отвращенію земляныхъ блохъ отъ яроваго рѣпнаго сѣмени, но оной самой надлежитъ мѣсто между масленосныхъ растѣній, тѣмъ паче, что она, если только не поздно будетъ посѣяна, неурожаю въ нашихъ сѣверныхъ краяхъ почти совсѣмъ не подвержена.

Въ напечатанномъ въ Австріи по Императорскому повелѣнію наставленіи о посѣвѣ масленосныхъ растѣній обще съ крессъ-салатомъ и горчица деревенскимъ жителямъ по всякой справедливости одобряется; ибо горечь сѣменъ обоихъ сихъ растѣній доброшѣ получаемого изъ нихъ масла не препятствуетъ, поелику содержащаяся въ кожицѣ сѣменъ, и единственно остается въ жмыхахъ.

Мы имѣемъ двоякую горчицу, черную и сѣрую, которую въ противоположеніе первой бѣлою называть имѣютъ обыкновеніе. Обѣ оныя для масла равномѣрно доброшны.

По-

Поднесъ еще горчицу сѣяли у насъ большею частію только на огородахъ, для употребленія молодыхъ листовъ въ кушанье, а сѣменъ по обыкновенію въ расстирку для приправъ. Употребляющіяся листы оной въ кушанье по подобію всѣхъ капустныхъ родовъ, въ которыхъ въ первые весенніе мѣсяцы бываеиъ недоспашокъ. Если опаривая оныя сливъ первую воду, не испортишь они въ соусъ срубленные мѣлко со шпинатомъ. Крестьяне варяиъ изъ нихъ щи обще съ другими молодыми травами безъ разбору.

Когда сѣять оную въ полѣ большимъ количествомъ, должно употребляиъ подъ нее мягкую очень унавоженную землю, и приготоовляиъ точно шакъ, какъ бы подъ капустникъ; противъ холоду она не нѣжна, и у насъ можно ее сѣять даже въ Мартѣ; въ раннемъ сѣвѣ шерпииъ она отъ земляныхъ блохъ мало, или вовсе ничего. Если же по особливымъ обстоятельствомъ въ Мартѣ или половинѣ Апрѣля въ землю она попадетъ не можетъ, вырастетъ и урожаеиъ въ поздномъ сѣвѣ шѣмъ лучше, чѣмъ добротиѣ подъ нее земля будетъ назначена. На таковой землѣ не дѣлаеиъ ей вреда, когда очиивать съ нее нижніе листы для повареннаго расхода, или въ ранній кормъ скотиѣ.

Поелику къ хорошему урожаю нужно горчицу выпалывать, по простымъ земледѣльцамъ не лѣзя подаиъ лучшаго совѣту, какъ

зывается, *Auricula muris*, *Pilosella officin.* *Hieracium pilosella* у *Линнея*. Изъ волокнистаго ея корня выходятъ отростки или стебли, кои по землѣ стелются, и яйцеобразными, цѣльными, сверху зелеными и мохнатыми, а снизу бѣлыми пушистыми, рядомъ сидящими листьями усажены; также въ коленцахъ или узелкахъ корешковъ новые корни вырастаютъ, отъ чего трава эта весьма размножается. Изъ сихъ корней вырастаютъ одинаке и голые стебли, оканчивающіеся однимъ сѣроторючно - желтымъ цвѣткомъ, котораго чашечка черновата, шероховата, и обыкновенно бѣлою пылью осыпана. Растеніе это горько и сушительно, учиняетъ овцамъ запоры, а рогатому скопу шаковой свербежъ за кожу, что оной шерсть съ себя спираетъ, шощаетъ, а не рѣдко и умираетъ. Флеммингцы сказываютъ: когда желтые цвѣты множественно на ихъ паствахъ появляясь, заранѣе щипаютъ, что въ скошинѣ у нихъ уронъ будетъ. Въ этомъ разумѣютъ они желтомахорочникъ съ желтымъ цвѣтомъ; однакожъ оной тогда только Флеммингцамъ въ разсужденіи рогатаго скопа вредитъ, когда множественнѣе обыкновеннаго вырастетъ, а прочихъ травъ и злаковъ по состоянію погоды будетъ меньше. Кажется также, что

Часть III. Отдѣл. 2. Р тра-

права эша больше вредитъ, есѣли на ней не по одному цвѣтку бываетъ; чаятельно, что тогда въ цѣломъ растѣннй стеблѣ и лиспахъ болѣе бываетъ силы и болѣе соковъ, кои оно изъ воздуха и земли припягиваетъ. Трава эша бываетъ не на однихъ шокмо сухихъ пасивахъ, холмахъ и перелѣскахъ, но и на нѣкоторыхъ возвышенныхъ лугахъ. А какъ на шаковыхъ мѣсахъ за гладкостію пошвы праву влошь по самую землю скашиваютъ, шо коса захватываетъ лиспы и цвѣпы и желпомахорочниковы. Гдѣ она на лугахъ разплодилась, должно истребить оную вспаханіемъ луга, а есѣли и послѣ того начнетъ появляться, луговщикъ долженъ пеѣисъ о совершенномъ оной истребленіи.

М) *Широколистная чемерица, wilde Berg- und Wieß-Wurzel, serapias latifolia у Линнея.* Упругой и прямой ея сшволъ бываетъ вершковъ семи вышиною, лиспы имѣетъ широкіе и короткіе, нижніе пупые, верхніе островашие, всѣ они, а примѣшнѣе средніе охватывающъ сшволъ, такъ какъ бы были повернуты. Цвѣшочной колосъ ея длиненъ, и состоитъ изъ 25 или 30 внизъ висящихъ цвѣшовъ, кои меньше и короче листовыхъ своихъ покрывекъ, не рѣдко на одну сторону наклоняюща, и при наружныхъ ихъ лиспка бываютъ зелено-

зеленоваты, а два внутреннихъ не много поменьше и бѣловаты. Листы содержатъ въ себѣ горькій, прошивной и подозрительный вкусъ, и никакое живошное до оныхъ не касаеться. Но какъ права сѣя расшетъ по прокосямъ, рвамъ и закрайкамъ луговъ, и вмѣстѣ съ прочими правами попадаетъ въ сѣно, должно оную всячески истреблять. Г. Гледитшъ повѣснваетъ, что листы эшой травы, бывъ свѣжіе съ прочею правою заданы въ кормъ, въ одну ночь цѣлую конюшню здоровыхъ и сильныхъ лошадей сдѣлали больными, а трехъ изъ нихъ умертвили; а потому въроятнымъ образомъ чаешъ онъ, что *malus Henricus*, ш. е. злый *Генрихъ*, по Нѣмецки *Wiesen-Dingel*, о кошоромъ въ Ганноверскихъ показаніяхъ (*Anzeigen*) 1765 года извѣщаемо было, и кошорой нѣкоторымъ живошнымъ вреденъ и смертеленъ, а всего паче лошадямъ, самый эшотъ родъ чемерицы бышь долженъ.

Н) *Конпельникъ*, перстистой, пятилистной, водяной собачечникъ, по Нѣмецки *Alp-Kraut*, *Hirschwind-Kraut*, *Kletten-Kraut*, *Bruchwurz*, *Stamp-Arsc*, *Eupatorium Cannabinum*, у *Линнея*. Трава эша изъ многолѣтнаго волокнистаго корня опускаетъ четверугольной, красноватой, мохнатой, въ аршинъ съ четвертью и съ половиною вышиною спволъ, усаженный прошивуположенно сидящими, про-

долговаго оспровашыми, какъ пять персповъ раздѣленными, и съ оспроу нарѣзкою мохнашыми лисшами. Не рѣдко у лисповъ бываетъ шолько по два боковыхъ, и бывающъ они шогда шреперспшною лапочною, но иногда бывающъ пяншперспшныя. Сшволъ раздѣляется къ концу на многія корошкшя вѣшви, на кошорыхъ находяшся малые красновашые, и шакже бѣлые благовонныя цвѣшпы, во многомъ числѣ плоскимъ пучкомъ вмѣстѣ сидящше. Трава эша имѣешъ вкусъ горькшй и оспрый щекошящшй запахъ, и находишся здѣсь множешвенно на лугахъ больше низменныхъ, нежели возвышенно лежащихъ. Рашешъ и цвѣшешъ съ половины лѣша въ самую осень, и свѣжая ошъ скоповъ оставляется неприкосновенною; въ сѣнѣ же смѣшанная хошя не лошадамъ, но шѣмъ больше рогашому скопу вредна. Но не могу я сказашь, что зло эшо содержишся въ продолговатыхъ ли ея при кошенш выпадающихъ сѣменахъ и въ сѣнѣ остающихъ, или въ лисшахъ и шебляхъ; пошому что коровы, бѣвши кормъ, шолсшыя шебли эшой шравы большею часшью оставляютъ, выбравъ прочее сѣно. Почему мнѣ до днешъ вѣрояшнѣе кажется, что сѣмена ея болѣе вредны. Я замѣшилъ въ нѣкошорыхъ крешшянскихъ дворахъ, у коихъ шрава эша на лугахъ рашешъ множешвенно, что

что коровы въ оныхъ часто занемога-
ютъ и умираютъ, зимою опнимаемыя
шбляша никогда не вырастаютъ, но по-
слб сильныхъ поносовъ и опухолей по-
мираютъ. Чтобъ отъ этой крайнб
опасной травы освободиться, должно
либо лугъ вздрасть и подвергнувъ об-
мбнному земледблю, или, когда шого
мокрость дна не позволитъ, траву эту
еще до разцвбпанія србзывать. Если-
ли произведено это будетъ нбсколь-
ко лбтъ сряду, конечно она истребится,
чему неминуемо быть должно, когда не
будетъ она умножаться разсыпаніемъ
свбжихъ сбменъ. Когда же таковыя
мокрыя луга можно будетъ рвами осу-
шить, трава эта на нихъ равномбрно
пропадетъ, и начнетъ расти такъ сла-
бо, что близъ стоящія прочія травы
оную заглушатъ.

О) *Евфорбія*, *Euphorbia* у *Линнея*. Мы
имбемъ изъ сего многочисленнаго прав-
наго поколенія нбкошорые роды, кои
отчаси на возвышенныхъ, часью же
на низменныхъ лугахъ развелися, и по-
падаютъ въ сбно. Трава эта приключа-
етъ отчаси, что молоко коровы при
доеніи выходитъ красновато или съ
кровью, или посоявъ нбскольکو въ
горшкахъ, дблается сине и съ пшпа-
ми. О родъ травы этой, *солнечная евфор-
бія* называемой, извбщаетъ *Хагстремъ*
(смол. *Schwed. Abhandl. 12 Band, 103 C.*),

что коровы, овцы и козы бдятъ оную
алчно, но ошъ шого мяса и молоко ко-
ровье и овечье получаетъ противный
вкусъ, а овцамъ и поносъ приключаетъ-
ся. Произходитъ ли и съ козами тоже
дѣйствіе, онъ замѣпишь еще не могъ.
Изъ шѣхъ же родовъ евфорбїи, онъ
вкушенїя которыхъ въ означенныхъ ско-
тахъ помянутые припадки примѣчены,
суть слѣдующіе:

Широколистная евфорбїя, *Euphorbia*
platyphyllos у *Линнея*. Находитъся она не
штокмо по пашнямъ, но и на нѣкото-
рыхъ лугахъ. Копьеобразные и разрѣ-
зные листы ея охватываютъ нѣкото-
рымъ образомъ стебель; оный раздѣ-
ляется на пять главныхъ вѣтвей, а
каждый изъ нихъ опять на три сучка,
а сїи на двое. На сучкахъ находящїеся ли-
сты бывають яйчкомъ, или больше
сердцеобразны. Плодъ ея всюду усаженъ
бородавочками.

Круглолистная евфорбїя, *drey spat-*
tige dolder Euphorbie, *Euphorbia replus* у *Лин.*
Растетъ въ перелѣскахъ, по прокосямъ,
закрайкамъ и около рововъ луговъ, по-
чему и въ сѣно попадаетъ. Стебель по
длинѣ своей весь усаженъ многими на
черешкахъ сидящими, завороченными,
яйцеобразными, совсѣмъ цѣльными ли-
стами. Стебель раздѣляется на концѣ на
три вѣтви, а каждая изъ нихъ на двѣ
меньшихъ, усаженныхъ яйцеобразными
же

же листьями; иногда отъ ствола выходящъ по длинѣ его вѣтви, и тогда являющася эша шрава, какъ бы особливаго роду. Листы на шаковыхъ бываютъ мѣсяцомъ.

Солнечная евфорбія, *Efula folisqua*, *Euphorbia helioscopia* у *Линнея*. Не рѣдко случается на шѣхъ же мѣсцахъ, гдѣ бываетъ предшедшій родъ, и цвѣтетъ въ Іюль. Она свое цвѣточное колесо всегда поворачиваетъ прошиву солнца. Однолѣпный ея корень рѣдко опускаетъ болѣе одного стебля, вершковъ семи вышиною, который усаженъ не многими дубинкообразными, и что рѣдко въ этомъ родѣ случается, пилкою зазубренными листьями. На концѣ стебля раздѣляется на пятеро, и на сихъ сучкахъ пясть листовъ въ кружкѣ стоятъ. Каждый шаковой сучокъ раздѣляется на трое, и усаженъ завороченными яйцеобразными листьями.

Волчье молоко, а по переводу съ Нѣмецкаго *ослово молоко*, *чортова молоко*, *свиное молоко*, *Euphorbia esula* у *Линнея*. Подобно обѣимъ предшедшимъ, расстетъ кой-гдѣ по шѣмъ же мѣстамъ. Отъ главнаго стебля опускаетъ многіе сучки, изъ коихъ каждый раздвоенъ; на сихъ сидятъ сердцеобразные листки, а цвѣточные листки мѣсяцомъ. Плодъ шравы этой гладокъ, а все растѣніе содержишь въ себѣ ѣдкой молочной сокъ.

Малая, на трое раздѣляющаяся вѣтвистая евфорбія, Euphorbia exigua у Лин. Распенѣ по пашнямъ и лугамъ; листы на ней узки, шупы и подобно какъ обкусаны. Главной стебель раздѣляется на трое, иногда же на четыре и пять вѣтвей, кои опять раздѣляются на двое и усажены копьеобразными листьями. Цвѣточные листки полумѣсяцомъ; плодъ ея гладокъ.

Болотная евфорбія, Tithymalus palustris, Euphorbia palustris у Лин. Распенѣ вообще по болошамъ, также и на нѣкоторыхъ низменныхъ лугахъ, а особливо по куспарникамъ, закрайкамъ и рвамъ оныхъ. Многолѣтний корень ея опускаетъ многіе, въ аршинъ съ четвертью и съ половиною вышиною, красноватые стебли, кои покрыты копьецообразными, гладкими, попеременно сидящими листьями. Всеобщій стебель раздѣляется на многія отпрыски, кои большею частью еще на трое раздѣляются, и яйцеобразными листками усажены, сучки тройные опять раздѣляются. Первоначально появляющіеся цвѣты бывають пятилистные и мужскіе, потомъ слѣдуютъ обоюдо-полые, и состоятъ изъ четырехъ листковъ. Плодъ усаженъ бородавочками. Иногда стволъ шаковою порядочною мешлою не раздѣляется, но изъ угловъ листовыхъ выходятъ только одинакіе сучки.

Гдѣ находишь шовѣ или другой изъ сихъ родовъ евфорбіи, или волчьяго молока травы, которая своимъ молочнымъ ѣдимъ сокомъ составляетъ оптѣнно нездоровый кормъ, шамъ должно луга либо разпахивать, когда еще сѣмена травъ сихъ не поспѣли, и обсеваешь доброю правою, или когда желасмо луга оставишь старые, какъ были, по должно евфорбіи срѣзывать, пока онѣ еще не разцвѣли, или шолько что зацвѣшуть. Это можешь шѣмъ удобнѣе произведено бытъ, что права сѣя, оптъ однихъ шолько сѣменъ размножающаяся, расшетъ отдѣленными круговеньками, и можно оную въ назначенную пору одну подкашивать, не шрогая прочей травы на лугу. Таковымъ дѣйствіемъ, сѣя вредная права въ нѣсколько лѣтъ можешь совсѣмъ испреблена бытъ. Болошнюю же евфорбію, какъ скоро оная опростешъ вершковъ въ шестъ, долженъ луговщикъ срѣзывать, оптъ чего оная шакже чрезъ нѣсколько лѣтъ испребитъся.

П) Колючей салатъ, съ яйцеобразными разширенными листьями, ядовитой латукъ, *Lactuca virosa* у Лин. Расшетъ иногда множественно на возвышенныхъ лугахъ, но обыкновенно круговеньками бываетъ шогда листомъ крупнѣе, которые за вышиною своею оптъ косы захвапываются и попадають въ сѣно, которое просполудины обыкновенно въ кормъ молодой скопинѣ

назначаютъ Жеребята отъ шого худѣ-
ютъ и сохнутъ, голѣютъ, и дѣлаются
шакъ гадки, какъ бы коросповыя; шѣля-
ша же получаютъ отъ шого обыкновен-
ную сыпь, копорая производитъ и отъ
другихъ причинъ, но сію шѣмъ тяжеле
согнать, еспли произойдешъ отъ вред-
ныхъ шравъ, въ сѣнѣ находящихся. Бо-
таническіе признаки этой вредной пра-
вы слѣдующіе: сшебли ея колючи, ли-
сшы охващываютъ сшебль выпятивши-
мися губами своими, и имѣютъ по себѣ
колючія жилки; верхніе лисшы бывають
иногда полуперисшы и сѣ вызубрина-
ми. Сокъ въ этой шравѣ молочной, горь-
кой и противнаго вкусу.

Гдѣ шрава эта находится, должно
спарашься ишреблять оную шѣмъ же об-
разомъ, какъ совѣшывано выше въ разсу-
жденіи большей части родовъ евфорбіи.

- Р) *Весенняя вѣтреница, еверхѣ торча-
щіе цвѣтки имѣющая, Wald-Rüschenschale
mit Eppichblättern, Pulsatilla apii folio, Ane-
mone vernalis у Лин.* Находится большею
частью въ борахъ, но нерѣдко случает-
ся и на смѣжныхъ къ онымъ, какъ вы-
сокихъ, шакъ и низкихъ лугахъ, а особ-
ливо шаковыхъ, кои лѣсомъ окружены,
ошкуда шрава эта больше сѣменами за-
носится, нежели можетъ глубоко лежа-
щими корнями своими просшираться.
Дровянишой, на вѣшви раздѣляющійся
корень ошпускаетъ много лисшвъ и
одинъ

одина только стебель. Листы сидятъ на длинныхъ черешкахъ, перисты, и состоятъ изъ двухъ или трехъ паръ, и одного нѣсколько мохнатого листка; другъ другу противоположенные листки коротки и широки, обыкновенно съ шре-мя разнovidными разрѣзами или выемка-ми; одиначный листокъ крупнѣе, также на шрое раздѣленъ; изъ нихъ каждой раз-дѣлъ большую часть съ шре-мя вырѣ-зами, а изъ нихъ средній опять раздѣленъ малыми разрѣзами. Стебель правы эшой бываетъ побольше трехъ вершковъ, и окруженъ шерстистою, желтоватою, лоснящеюся и многими нѣжными врѣзами раздѣленною оболочкою, а на концѣ сво-емъ снабженъ вверху споящимъ цвѣт-комъ. Оный снаружи мохнатъ, и сна-чала бываетъ бѣлъ съ примѣсю пур-пуроваго. Мало по малу волоски на немъ желшбютъ, и цвѣточные листы након-ецъ покрывающся лоснящеюся желшою шерстью.

Висячая весенняя вѣтреница съ пря-мыми цвѣточными листками, *Pulsatilla vulgaris*, *Anemone pulsatilla* у Линнея. Ра-стетъ также въ лѣсахъ и на возвышен-ныхъ мѣстахъ, но счищается меньше вредною. Дровянистой ея, многократно раздѣленный черный корень сверху уса-женъ щетинками. Листы и стебель сна-чала покрывы многою шерстью. Листы, изъ корня распуще, бывають многочи-сленны,

сленны, космашы, съ малыми разрѣзами, а узкіе оспренъкіе лиспы опяшь разнообразно раздѣляющся. Послѣдній одиночный листъ имѣетъ чешыре лапки и больше, кои на шрое и чешверо разрѣзаны. Сшебль ея бываетъ побольше шрехъ вершковъ, и оболочка онаго состоитъ изъ нѣсколькихъ сросшихся на руку похожихъ листовъ. Цвѣтокъ виситъ внизъ; сѣменникъ шорчитъ вверхъ; шесть копьецообразныхъ цвѣточныхъ лиспиковъ прямы, космашы и фіолешовой краски.

Висячая весенняя вѣтреница, съ завороченными цвѣточными листками, Pulsatilla folio minore nigricante, Anemone pratensis у Лин. Оказываея цвѣтущею въ началѣ самой весны по рѣдкимъ кустарникамъ, песчанымъ полямъ и возвышеннымъ лугамъ. Цвѣточные головки ея развертываются рано, и едва шолько изъ земли вылезутъ, по крайней мѣрѣ стебель простираея уже въ высоту, пока еще корневые лиспы не успѣютъ развернуться. Корнемъ и лиспами во всемъ подобна она шпорому роду. Оболочка сшеблевая кажея бытъ однолишною, со многими глубокими и неравными вѣзами. Цвѣточные лиспы никогда не разпростираются, и цвѣтокъ всегда являея свернувшимся; они темно-фіолешовы, или черновашы, и концы ихъ пригнушы въ средину.

Гдѣ сїи вредныя травы начнутъ оказываться, должно ихъ тщаельно искоренять, пока онѣ еще цвѣшутъ, и пока сѣмена не успѣли созрѣвъ высыпаться. Но гдѣ весенняя вѣпреница уже слишкомъ размножилась, нѣтъ лучшаго совѣту, какъ лугъ вспахать и обсеять желаемымъ хлѣбомъ или родомъ травы. Еще должно напомнимъ, что весенняя вѣпреница не всюду подъ однимъ названіемъ извѣстна; ибо кромѣ именъ *пасхальной цвѣтъ*, *козлова борода*, *вѣтрена трава*, *Schlotten-Blume*, *Hackel-Kraut*, *Witz-Wurtz*, называющъ оную въ нѣкоторыхъ мѣстахъ *диной Анемонѣ*. Въ особливости симъ послѣднимъ названіемъ, чтобъ не обмануться, должно оспергаться: дѣши сполько рано разцвѣтающіе цвѣты рвутъ, и связавъ въ пучки нюхаютъ, а это не рѣдко худыя слѣдствія въ нихъ производитъ; ибо хотя Анемоны съ весеннею вѣпреницею какъ цвѣтомъ, такъ и плодомъ сходны, но послѣдняя какъ листовую стебля своего оболочкою, такъ и сѣменами съ хвостикомъ отъ Анемоновъ довольно различествуетъ. Сверхъ того и самыя наспоющіе дикіе Анемоны, по нашимъ лугамъ, полямъ и лѣсамъ распушціе, опчаспи явнымъ образомъ бываютъ ядовиты, часшю же подозрительны, и отъ того роду Анемоновъ, которой любители цвѣтовъ сполько уважаютъ,

и кои изъ воспочныхъ странъ вывезены, въ БошаникѢ же садовыми *Анемонами*, *Anemone coronaria* у *Линнея*, называющся, довольно опшичны. *Малый бѣлый лѣсный Анемонъ*, *журавлинный цвѣтъ*, *Wald-Häckerlein*, *Anemone nemerosa* у *Линнея*, имѣющъ ѣдкость во всѣхъ своихъ частяхъ. Сверхъ листовъ его выходящъ продолговатый голый снѣбелекъ, оканчивающійся бѣлымъ, иногда мяснаго цвѣту цвѣшкомъ, и ошъ дрвнихъ еще замѣченъ, что скошы получающъ ошъ него кровавую мочу, возпаленіе и кровавой поносъ. *Малый желтый лѣсный Анемонъ*, *золотой пѣтушокъ* *Gold-Häckerlein*, *ranunculus nemorosus*, *Anemone ranunculoides* у *Лин.* къ предшешему во всемъ сходственъ, и пѣмъ только различенъ, что снѣбль надъ шремя его листьями короче, а потому цвѣшъ не столько надъ листьями возвышенъ, шакже что иногда вмѣсто одного снѣбля выходящъ изъ того же мѣста два, и каждый изъ нихъ цвѣшкомъ оканчивается. Рано весною въ Маршѣ и Апрѣлѣ развершывающійся цвѣшокъ его бываетъ всегда желтъ, и состоишъ только изъ пяти кругловатыхъ листковъ. Обыкновенной большой бѣлой *Анемонъ*, по Нѣмецки *Anemon-Röslein*, *Wind-Röslein*, *Wind-Blume*, *Anemone sylvestris* у *Лин.* цвѣшетъ въ разныхъ мѣстахъ по лугамъ и полямъ въ Маѣ, а въ садахъ еще

еще въ Апрѣлѣ, и продолжаетъ цвѣсти почти чрезъ все лѣто; пошому что опчаси корень новые стебли выпускаетъ, часью же онѣ сѣменѣ выросшіе стебли въ разное время цвѣшутъ. Прежде, нежели цвѣшокъ развернется, бываетъ онѣ шершисшѣ въ осязаніи, развернувшійся же великъ, бѣлѣ, нѣскольکو гладокъ, и содержишѣ рѣдко больше пяти кругловатыхъ лисковъ. Сѣмена его бывають завернуты въ бѣлую волну, болѣе длинны, нежели круглы, легко вываливаются на землю, а пошому разносѣяся вѣспромѣ и разсѣваются.

С) *Поручейница*, по Нѣмецки *Erpich-Wasserment*, *Sium* у *Линнея*. Также изъ породы хохломъ цвѣтѣ имѣющихъ справъ. Изъ оной замѣшимъ мы слѣдующихъ два рода:

Широколистная поручейница, *Wasser-Erpich*, *Frosch-Erpich*, *Sium latifolium*, у *Линнея*. Видима бываетъ по болошстымъ берегамъ, въ малыхъ ручьяхъ и рвахъ, также на очень низменныхъ и долго подѣ водою стоящихъ лугахъ. Узловою ея, ползучій, волокнисшій и многолѣшній корень опускаетъ бороздчатою, пусшою и суковошою, въ аршинѣ сѣ четвертью и сѣ половиною длины, и въ разсужденіи широкихъ выходящихъ листовыхъ черешковъ коленцами раздѣленный стволѣ. Перисшые листы его состоятѣ изъ разныхъ гнѣздами

здами сидящихъ, продолговатыхъ, съ зазубринами лисповъ, а на концахъ только по одному лиску. Бѣлая цвѣточныя колесца выходяшъ изъ конца колосковъ. Распѣніе это цвѣтетъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ; и какъ нѣкоторые луга, на которыхъ она растетъ, бывъ двукосными, уже скашиваются, попадаетъ она, если стволы ея не очень зашвердѣли, иногда въ сѣно, въ которомъ у недоспавшихъ Хозяевъ за скудоспѣю въ корму сѣдается коровами, отъ чего онѣя получаютъ кровавую урину. Луговщикъ по сему долженъ оную почасту за лѣто срѣзывать.

Поручейница, имѣющая цвѣты около коленцовъ ствольныхъ, малая бѣлая поручейница, Scheibring, Sium nodiflorum у Линнея, также отчаспи попадаетъ въ сѣно. Нижніе листы ея, изъ воды торчащіе, видомъ шаковы, какъ у перваго роду, а верхніе снабжены на ухосходствующую губкою; на стеблѣ же и вѣтвяхъ сидящіе листы напрошивъ всегда имѣютъ у каждаго листка по двѣ губки, и потому кажутся состоящими изъ трехъ ланныхъ, очень нѣжно зазубренныхъ неравной величины лисковъ. Бѣлая цвѣточныя колесца сидяшъ на короткихъ черешкахъ въ углу листовомъ у коленцовъ, однакожъ и отрасли отъ ствола оканчиваются шаковыми же цвѣтами. Общей оболочки кучки цвѣтшной

Шной почаспу у нихъ не достаеѣтъ: Сїя трава во вредномъ дѣйствїи предшедшей подобна; и расшеѣтъ какъ по углубленїямъ мокрыхъ луговъ; такъ и въ водяныхъ каналахъ на лугахъ и близъ оныхъ, опкуду крестьяне выкашивающъ еще съ другою травою, и сносяѣтъ къ луговой справѣ. Гдѣ вода никогда не высыхаеѣтъ, должно сїю поручейницу почаще косою срѣзывать, отбираѣть отъ прочей травы, и бросаѣтъ въ навозную яму. Хоть она долго не испребляеѣтся, но наконецъ въ продолженїи предписаннаго пропадаеѣтъ.

Т) *Вьюхъ*; *водяная болиголовъ*, *Wit-terich*, *Wasser-Kraut*, *Cicuta aquatica*, *Cicuta virosa* у *Линнея*. Расшеѣтъ при берегахъ потоковъ, рѣкъ, рвовъ и прудовъ; также въ болошахъ и стоячихъ водахъ, и шѣмъ же образомъ, какъ выше объ поручейницѣ справѣ сказано, попадаеѣтъ въ сѣно; но она еще ядовитѣе шой. Цвѣшеѣтъ она у насъ съ Іюня до осени. Корень ея долготѣнїй, и лѣтомъ бываеѣтъ она совсѣмъ другаго виду, нежели весною; не рѣдко весною вода вымываеѣтъ его изъ мѣста, и обнажаеѣтъ отъ всѣхъ волоконъ его. По сей-то причинѣ весною находяѣтъ корни сїи на берегахъ, сверхъ илу лежащїе. Есть плачевные примѣры, что бѣдные незнающїе люди или дѣти, находя сїи корни, ѣли и помирали. Корень эѣтомъ бываеѣтъ очень великъ, рѣдкою, *Часть III. Отдѣл. 2. С* ош-

отчаспи съ большими, отчаспи съ малыми отросками, съ наружноспи желтовашо бѣлѣ, и когда, а особливо зимою, верхняя его часть будетъ подвержена дѣйствію воздуха, дѣлается вверху зеленѣ, а наружность его окружается кольцами, а между оными оказывающся ямочки. Кольца сіи составляютъ остатокъ наростовъ корневыхъ листовъ, кои корень широкою кожею окружаютъ. А ямочки весною надувающся ростками, изъ которыхъ равно и изъ краевъ колецъ, не токмо выходятъ корневые отроспки, но и молодые побѣги стволовъ, а особливо въ верхней части. Внутри корень эшотъ бѣлѣ, мясистѣ, ноздреватѣ, и подобно какъ перегородками раздѣленъ на части; лѣтомъ бываетъ онъ плотнѣе и тверже. Сокъ его зимою и въ началѣ весны бываетъ желтѣ, но когда ночь перестойтѣ, нѣсколько краснѣетъ; сначала вкусъ его бываетъ хошя сладковатѣ, но вскорѣ оказываеиъ нѣкую бѣдность. Лѣтомъ сокъ эшотъ бываетъ слабѣе и водянѣ. Запахъ весною сходенъ къ пущарнаку, но прошивенѣ. Изъ верхней части корня сего вырастаеиъ весною много листовъ, а потомъ между оныхъ стволъ. Длинные, круглые и внутри пустые черешки листовъ корневыхъ простирающся внизъ кожею, кошорая корень окружаеиъ, въ верху же раздѣляющся на многія отрасли, и носятъ

сятъ составной перистой листь. Гладкій стволъ этой травы достигаетъ ростомъ полутора аршина (въ иныхъ странахъ сажени), къ низу толсѣ, бѣль съ красными полосами, къ верху зеленѣетъ, внутри пусѣ, перехваченъ колѣнцами, изъ копорыхъ вѣтви вырастаютъ, и на которыхъ листь сидятъ, и разширенною кожею черешковъ своихъ какъ бы ножнами стволъ окружается. Корневые и ствольные листь между собою сходны, кромѣ что первые побольше послѣднихъ; они гладки, и лоснящися свѣтлозелены, а состоятъ изъ многихъ листовъ, сидящихъ на опросткахъ общаго черешка; вѣтви стоятъ попарно, съ однимъ листомъ на концѣ; листь главной вѣтви раздѣляются на многіе, иногда на пятнадцать малыхъ, и сіи листьки бываютъ въ окруженіи своемъ длинноваты, остры, по краямъ какъ пила зазубрены, и опчаси цѣльные, частью же раздѣленные на двѣ и больше лапки. Цвѣточное колесо или хохоль великъ, и стоитъ наравнѣ съ листьами. Вообще не имѣетъ онъ общей оболочки, иногда стоитъ подъ онымъ листовъ, рѣдко больше одного листка. Хохоль этотъ раздѣляется на двенадцать и больше лучей или малыхъ хохолковъ, а каждая изъ нихъ облекается шрема, иногда пышью узкими листьками, кои по опцвѣшеніи хохла назадъ по че-

решку заворачиваются. Бороздчатая ея сѣмена почти сходны къ сѣменамъ пепрушки. Однакожъ эта болиголова отъ родовъ пепрушечныхъ легко отличается своимъ собственнымъ не весьма прошивнымъ запахомъ, и меньше мѣлко раздѣляющимися лиснами, также лисками, подъ цвѣточными хохлами находящимися, и кои прочимъ лиснамъ равны, недоспашкомъ оболочки на малыхъ цвѣточныхъ хохлахъ, и болѣе яйцеобразными и мѣльче избороженными сѣменами. Не рѣдко выохъ ошибкою пріемлется за пуссарнакъ, а особливо въ разсужденіи корня. Корень пуссарначный обыкновенно бываетъ меньше и болѣе сходенъ къ верешену; онъ съ прочими своими частями имѣетъ собственный пряный и пріятный запахъ, внутри разгородковъ не имѣетъ; у цвѣточнаго хохолка его оболочки совсѣмъ не бываетъ, и цвѣточные лиски его желшы.

Корень выоху преимущественно ядовитъ, и свойство эшо въ немъ сильнѣе бываетъ весною; но и прочія части растѣнія сего не совсѣмъ отъ того свободны, а особливо въ корневыхъ лиспахъ одинакое дѣйствіе, какъ и отъ корня примѣчено. Когда свѣжіе лиспы попадутъ въ сѣно, можешь человекъ получить ошалѣніе и опухоль шѣла, естли проспашъ ночь въ сараѣ съ шаковымъ сѣномъ. Ядъ корня столько силенъ, что зара-

заражаетъ воду болоша, въ кошоромъ расшешъ, и покрываетъ оную масловапою перепонкою.

О плачевномъ дѣйствіи сего растѣнія надъ человѣками описаны многіе примѣры. Припадки отъ него главнѣйше состоятъ въ ошалѣніи, обморокахъ, склонности ко сну, безчувственности, несказанномъ разслабленіи, безумствѣ, бѣшенствѣ, судороги въ членахъ, падучей болѣзни, пошности, дѣйствительной рвотѣ, икотѣ, возпаленіи въ желудкѣ, черныхъ пятнахъ на кожѣ, сухости во рту, ударахъ параличныхъ, и очень часто въ самой смерти, коя иногда скоропостижно слѣдуетъ. По смерти пошчасъ все тѣло вздувается, а особливо чрево и лице, а кожа багровѣетъ или дѣлается черновапо-синя; соки въ тѣлѣ несказанно жидѣютъ, сосуды мозговья разпускаются, и шечетъ изорѣвая пѣна, иногда зеленая. Аптекарской помощникъ получилъ несказанное побужденіе ко сну послѣ того, какъ онъ въ жаркій лѣтній день, вспомявши, растѣніе это вырвалъ, и принесъ домой, какъ повѣствуетъ *Тревъ* въ *Commercio Norib.* 1740. Лучшее лѣкарство отъ сего яду рвотное.

Для несмысленныхъ скоповъ выдохъ также смертельный ядъ составляетъ. Въ Швабіи лошади и рогатый скотъ растѣнія сего не трогаютъ, также въ

Швецїи, Сибири и Египтѣ рогащые скоты до него не касаются, пока здоровы; когда же принудитъ ихъ голодъ, или иныя обстоятельство, праву эту бѣсть, бывающъ она имъ, естли только не смертоносна, чему *Линней* и *Гадъ* видѣли примѣры, но конечно очень вредна, и производитъ въ нихъ, равно и въ лошадяхъ, крайнѣ гибельную заразу. Въ Швециї и Норвегїи гнушающся оною овцы и козы: первымъ оная крайнѣ вредна, да и послѣднїя по сказанїю *Гада* отъ нее помирающъ. Когда пищенся, что одинъ родъ скоповъ въ какой нибудь спранѣ безъ вреда оную бѣтъ, въ другой же напротивъ; по дѣйствїю этой правы, по различїю климатовъ, должно быть разному. Такъ извѣстно на прим., что въ Норвегїи свиньи эту болголову бѣдѣтъ безъ вреда, въ Швабїи же многїя отъ нее помирающъ. Но можетъ быть свиньи въ Норвегїи бѣли вмѣстѣ съ нею кислая правы, кои должно щипать за пропивуядѣ выюху, на прим. щавель, и тому подобныя, или дома поены были кислымъ напишкомъ, какъ-то гущею квасною или инымъ чѣмъ, что оказалось надъ собаками и кошками, коимъ для опышу давали сокъ выюху, и отъ чего слѣдствїя выходили разныя.

Поселику корень сего ядовитого растѣнїя безъ труда вырвать можно, то луговщикъ долженъ имѣть только де-
ре-

ревянной крѣкѣ, и можетъ онымъ, захватывая его, изъ болоша вытаскивать, а какъ завянетъ, бросаешь въ навозную яму; ибо когда много свѣжихъ сихъ корней въ оную бросишь и другими веществами закрышь, могутъ отъ вредныхъ изъ нихъ испареній приключаться накладывающимъ навозъ въ свое время, или вымѣшивающимъ оной, обмороки и оглушеніе, а можетъ стать-ся что нибудь и хуже.

У) *Водяной пупъ*, щитообразной съ пятью цвѣточными хохолками *водяной пупъ трава*, *Sumpfnabel-Kraut*, *Hydrocotyle* у *Линнея*. Растетъ по низменнымъ лугамъ, а цвѣшетъ въ Іюль и Августъ. Жиловащій его корень многолѣтній, ш. с. продолжается чрезъ многіе годы. Кругловащій и гладкій стебель спелется по землѣ; попеременно на ономъ сидящіе листья почти на шарелку сходны, по краямъ округло вызубрены, гладки, сочны и стоятъ на длинныхъ черешкахъ, кои вросли въ нижнюю ихъ сторону, отъ чего и прозванъ щитообразнымъ. Изъ угла листового произходятъ кругловащые, гладкіе, въ палецъ длиною, снизу двумя кругловащими чешуйками осажженные цвѣточные черешки, оканчивающіеся цвѣточными хохолками, въ которыхъ цвѣтки, коихъ не рѣдко больше пяти бываетъ, сидятъ колесцомъ отчасти на концѣ,

частью же съ боку черешка. При всякомъ цвѣткѣ находится листокъ шиломъ. Распокъ въ сѣмечкѣ сверху окруженъ желшоватымъ, какъ грибъ рухлымъ вѣнчикомъ. Растѣніе это остро, и приключаетъ овцамъ возпаленіе, кровавую урину и другіе припадки, естли побдѣшъ однихъ только свѣжихъ листовъ его. Когда луговщикъ растѣнія сїи въ Іюнѣ мѣсяцѣ подсѣчетъ, и будешъ это повторающъ послѣ, какъ оныя опяшъ появляшя, пропадутъ они наконѣцъ.

Ф) Конскія сѣмена трава, тысячелистница водяная, водяной фенхель, конской фенхель, Peersaat, Wätersfenchel, Warzen-Kraut, Phellandrium aquaticum, Millefolium aquaticum, cicutana palustris tenuifolia. Растетъ у насъ въ стоячихъ водахъ и болошистыхъ мѣстахъ. Двулѣпный ея корень морковью наружно раздѣленъ на коленца, и около оныхъ какъ бы колесцомъ обсаженъ жилочками, внутри проховащъ и мягокъ, такъ что рѣдко его цѣлой изъ болоша вышацишь можно. Стебель ея толстѣ, бороздчатѣ, съ уступами или коленцами, нижнею частью разтянушъ, и усаженъ многими различно изогнутыми вѣтвями. На концахъ вѣтвей появляющя въ Іюнѣ и Іюль цвѣточныя хохолки, кои обыкновенно внизъ наклоняющя. Главный хохоль обнаженъ, но при ошдѣленіяхъ онаго стоятъ,

стоятъ обыкновенно семь острыхъ листовъ. Дабы это примѣчаніе достойное растѣніе тѣмъ легче познать было можно, надлежитъ только замѣтить, что оное сходно къ обыкновенному кервелю, но потчасъ по мѣсту родины своей различается. Отъ водяной болиголовы можно легко же оное отличить, когда только сравнить описанія, и обратишь примѣчаніе на плоды ихъ. Поселику большая часть по мокрымъ и болописшымъ мѣстамъ растущихъ и хохломъ цвѣтъ имѣющихъ растѣній, обыкновенно челобкамъ и скопамъ вредны, должно и эту праву потчасу выдергивать и срѣзывать, чпобъ оная въ сѣно не попадала, а всего меньше была сѣдаема. *Линней* и другіе наблюдатели замѣтили, что многое употребленіе оной лошадямъ заразу приключало, состоявшую въ опнятіи заду.

Въ здѣшнихъ болошахъ (говоришь Авторъ) случается этошь припадокъ съ лошадьми въ нѣкоторыя годы, когда они, какъ-то въ нынѣшнюю весну въ особливости было, при недостаточной паствѣ этою правою не гнушались; а это всегда происходитъ, когда по болошамъ нѣтъ недостатку въ хорошихъ травахъ. *Линней* выводитъ все это вредное дѣйствіе отъ личины или нимфы нѣкоего особливаго жучка съ хоботомъ, котораго онъ *circulio paraplecticus*

называетъ, и которую скопина нечаянно проглатываетъ. Это можетъ быть и не можетъ. Между тѣмъ онъ же, путешествуя въ Испанію въ Мальмѣ отъ обывашелей свѣдалъ, что имъ эшотъ конской параличъ не извѣстенъ, не взирая на то, что помянутая трава тамъ растетъ множественно. Чтобъ удостовериться въ томъ, кормилъ онъ двухъ лошадей ею, и оныя бѣли траву эшу охотно; но испытывалъ тысячу стволотъ этой травы, ни въ одномъ не нашелъ оныхъ личинокъ. Мнѣ еще не удалось означенную личинку въ эшотъ мѣстѣ найшишь, почему и остаюсь во мнѣніи, что и безъ нее трава эта вредна, что открываетъ бѣдѣй вкусъ листовъ, вѣтвей, стеблей и корня ея. — Впрочемъ замѣчаю здѣсь еще утверждаемое нашими паслухами о вредности травы *остраго осота*, *carex acuta* у *Линнея* называемой, что она единственно происходитъ отъ находящагося въ ней червя, только въ дождливую погоду: рогатая скопина, бѣвши въ такое время эшу траву, пухнетъ и умираетъ; напротивъ въ сухое время можетъ бѣсть оную безвредно. Деревенскія общества подтверждаютъ здѣсь новымъ и незнающимъ паслухамъ, чтобъ не гоняли они стадо въ дождливую погоду на мѣста, гдѣ растетъ острый осотъ. Надлежитъ еще вѣдать

о сѣменахъ эшой водяной пысячелистницы, имѣющихъ пріятный вкусъ съ продолжающеюся во рту оспроюю, что коновалы ихъ цѣнаютъ за лучшее лѣкарство лошадямъ отъ снѣпницы, кашлю и всякихъ наружныхъ поврежденій.

Х) *Красной каменоломъ*, *Neben-Dolde mit röhren förmigen Blättern*, *Wasser-Filipendel*, *Oenanthe aquatica, fistulosa* у *Линнея*. Растетъ въ водяныхъ рвахъ, болопахъ и на мокрыхъ лугахъ. Многолѣтний и глубоко въ шинѣ стоящій корень эшой травы состоитъ изъ многихъ пучками соединенныхъ жилъ, между которыми иногда случаются коленца, и опускаетъ какъ спелющіяся, такъ прямо стоящія вершковъ 14 вышиною, пусыя и малыми вѣтвями усаженныя избороженныя плети. Листовой черешокъ, который стебель плети окружаетъ, внутри пусъ, въ началѣ какъ бы съ трещинкою, потомъ свертывается трубочкою, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ собственный черешокъ листа происходитъ, узко стягивается. Всѣ листья на ней перисы; нижніе состоятъ изъ нѣсколькихъ паръ листовъ, вмѣстѣ сложенныхъ, а сѣи опять раздѣляются на три и четыре пупыхъ лапки. Верхніе состоятъ изъ нѣскообразныхъ длинныхъ листковъ, кои отчасти цѣльные, отчасти же напрое разколоты. Цвѣточной хохоль находится либо на равнѣ съ листьями, или

на

на концѣ вѣшвей, обыкновенно не имѣетъ мѣшечка или общей оболочки, или снабженъ бываетъ только однимъ листомъ, и раздѣляется на три и на пять, рѣдко больше, малыхъ хохолка, у которыхъ съ одной стороны оказывается по три и больше бѣловашыхъ оболочныхъ ш. е. хохолокъ прикрывающихъ листка. Цвѣточные листки у нее красноваты. Крайніе цвѣточки сидятъ на длинненькихъ, а средніе на корошечныхъ черешкахъ; цвѣтки сидятъ плотно между собою. Всѣ скопы оставляютъ эту праву безъ прикосновенія, и острый прошивной вкусъ оной легко внушаетъ къ ней отвращеніе. Г. *Линней* извѣщаетъ, что онъ самъ, носивъ эту праву въ рукѣ во время сильнаго жару, претерпѣлъ болѣзненное чувствованіе, которое однако скоро прошло, когда онъ ее бросилъ. Неосторожное вкушеніе сего распѣнія члвками вредное дѣйствіе свое явственнo доказало: слѣдовали за шѣмъ судороги, изкошеніе глазъ, обмороки, удары и самая смерть, не взирая на то, что въ шѣлахъ людей, симъ ядомъ умерщвленныхъ, всѣ внутреннія оказывались невредимы, и кровь въ лучшемъ состояніи. Однако Г. *Линней* пишетъ, что рубленая эта праву въ смѣси съ гущею и зернами коровами ѣдена была безвредно, почему является, что можетъ быть она не всякому скопу вредна. Но

впро-

впрочемъ одинъ опытъ сего рода въ разсужденіи этой sprawy не можетъ еще сельскихъ жищелей обезпечить; ибо можетъ спастся, что корова прежде сего опыту Блѣ кислой кормѣ, кошорой со-сѣпавилъ прошивуядѣ этой справѣ. Можетъ также случиться, что и гуца была уже кисла, а въ смѣси съ этою травою пришла еще въ величайшую кислоту. По сему справу сію должно щипать опасною, и съ луговъ и пасбищъ испреблять вырывая съ корнемъ посредствомъ крюка, и бросають въ навозную яму.

Ц) Солнечная роса, *Sonnen-Thau*, *Ros solis*, или *Rorella*. Находишься у насъ это растѣніе на болотистыхъ очень низменныхъ лугахъ и пасшвахъ, также и на возвышенныхъ зашопленію меньше подверженныхъ лугахъ и пасбищахъ, на кошорыхъ мохъ естъ; почему листья его отъ косы, въ шаковыхъ мѣстахъ низко пускаемой, срѣзываются и попадаютъ въ сѣно.

Сего растѣнія у насъ два домашнихъ рода, а именно: 1) круголистная солнечная роса съ голыми стеблями, *Ros solis folio rotundo* С. В. Р. *Drosera rotundifolia* у Лин. 2). Долголистная солнечная роса съ голымъ стеблемъ, *Ros solis folio oblongo* С. В. Р. *Drosera longifolia* у Линнея. Оба рода цвѣшутъ у насъ въ Іюль мѣсяцѣ. Изъ малаго волокнистаго

го ея корня выходящѣ многіе листы подобіемъ роза; стебель мохнатѣ, а листѣ бываетѣ кругловатѣ, снизу зеленѣ и почти гладокѣ, сверьху же пурпуровѣ, и усаженѣ лоснящимися какѣ бы росю покрышыми волосками; опѣ чего земля блеститѣ шамѣ, гдѣ эша права растетѣ. Видѣ листовѣ не всегда бываетѣ кругловатѣ, но иногда продолговатѣ. Но какѣ прочій видѣ опасенъ одинакѣ, и кусты дальняго различія вѣ себѣ не оказывающѣ, шо самѣ Линней сомнѣвается, постояненѣ ли эшотѣ видѣ листовѣ, и два ли эшо разные рода. Между листовѣ выходитѣ изѣ корня очень низкой, одинакой, голой стебликѣ, носящій односпоронной бѣлой цвѣточной колосокѣ. Вѣ старину листы сего растѣнія собиравали со многимѣ суевѣріемѣ кѣ употребленію во многія Магическія дѣйствія, и кѣ леченію болѣзней разныхѣ. Поселику имѣющѣ они ѣдкое и возбуждающее свойство, шо сокомѣ оныхѣ поднесѣ еще мажущѣ бородавки и курьи глазки для согнанія. Писатели вѣ разсужденіи внушренняго употребленія солнечной росы еще не согласны, пошому что одни щипающѣ ее вредною, другіе же цѣлебною, а особливо опѣ болѣзней вѣ легкомѣ; однако нѣкоторые искусные Хозяева увѣряли меня, что сѣ сѣномѣ засушенная эша права лошадямѣ и овцамѣ ихѣ сильной кашель приключала, чѣмѣ

чѣмъ утвержденія *Боррихіевы* и *Раіусовы* подтверждаются, которые пишутъ, что употребленіе солнечной росы скошинѣ, а особливо овцамъ, крайнѣ вредно; ибо повреждаетъ у нихъ легкое, и производитъ смертельной кашель. Вода и жидкости всякія отъ настаиванія въ нихъ сухихъ листовъ этой травы получаютъ красной огненной цвѣтъ.

Гдѣ сія подозрительная трава во множествѣ находится, должно избѣгивать оную вспаханіемъ мѣста и засѣваніемъ какимъ нибудь хлѣбомъ, кормными и луговыми травами. Когда же эта солнечная роса расстетъ не въ большомъ количествѣ, должно круговеньки ея вскопать засѣвомъ, или только поковырять растенія, пока онѣ еще не зацвѣли. Нужно только предупредить, чтобъ сѣмена на ней не выспѣли, для того что тогда ея яйцеобразной плодъ, или сѣменной пузырекъ, вверху пястью своими остроконечными сошниками разверзается, и сѣмена разсыпаются врознь, отъ чего слѣдуетъ травы этой размноженіе.

Д. Засѣваніе луговъ однимъ родомъ травы.

Когда луга наши будутъ и совсѣмъ свободны отъ ядовитыхъ и подозрительныхъ травъ, и обросши разными злаками и травами многого рода, изъ коихъ каждая въ особенности скошамъ питательна и пріятна, не должны мы однако
ДУ-

думать еще, чтобъ наши луга находились въ лучшемъ совершенствѣ: можемъ имъ еще больше или меньше половины совершенства не достаточествовать, пока не будуще они произращать одного роду травы, которое съ добрымъ присмотромъ вышнюю степень совершенства, къ чему мы луга довести можемъ, составляетъ, и о чемъ поднесъ еще нигдѣ порядочно не помышляли.

а) Еще въ предшедшемъ ошдѣленіи коснулись мы, что вспахивая луга къ засѣванію однимъ родомъ травы, и переработывая сохою и бороною, имѣемъ вѣрнѣйшее средство къ истребленію распущихъ на оныхъ нездоровыхъ и опасныхъ травъ: пошому что хощя нѣкопоры изъ вредныхъ растѣній, больше и меньше множественно росшія, по предписанному вырыванію и подрѣзыванію будуще истреблены мало по малу; но нѣкопоры изъ нихъ очень дробны и нѣжны, также множественно съ доброю правою смѣшаны, что ихъ совсѣмъ чрезъ обыкновенное выпалываніе истребишь не можно. Но положимъ, что и будуще они истреблены, намѣреніе тѣмъ еще не достигнуто: ибо, хощя мы въ огородахъ и на хлѣбныхъ нивахъ сорныя травы посредствомъ выпалыванія и убавляемъ, но когда одинъ изъ нихъ будуще истреблены, то другія отъ ежегоднаго полонія еще не пере-

во-

водяпся, понеже хошя малый корешокъ ихъ въ землѣ останется прирвавшись, травы шѣ отъ него вновѣ разводятся. На лугахъ, кои не имѣющъ шаковой опверстой пошвы, какова въ огородахъ и на пашняхъ, жилки и корешки справъ при полошье еще больше въ землѣ по швердости ея будущъ оставапсья. Сверхъ того о выпалываніи луговъ въ хозяйствѣ и помышлять не должно. Не всегда и на пашняхъ, гдѣ великіе сѣвы, эшу ручную работу исполняпъ можно, а шолько желательнo, чпобѣ исполнялась.

- 6) Обозрѣвая луга, усматривающся травы и злаки очень многихъ и крайнѣ различныхъ между собою родовъ, изъ кошорыхъ одни во время обыкновеннаго кошенія уже переспѣвающъ и спояшъ засохшими, другія же шолько въ половину зрѣлости своей, и такъ далѣе. Должно вѣдашь, чшо злаки и травы, для корму какъ въ сѣно засушенныя, такъ и свѣжія, тогда сочнѣе и пишательнѣе бывающъ, когда цвѣшущъ или къ разцвѣшанію приближающся. Въ какомъ же совершенствѣ будетъ лугъ, произносящій шолько одинъ родъ травы, кошорая въ одну пору разцвѣтаешъ и скошена бытъ можетъ? въ эшомъ намѣреніи художественныя луга, зашъваемые кормными травами, имѣющъ предъ всѣми еспешивенными лугами то
- Часть III. Отдѣл. 2. Т ве-

великое преимущество, что съ нихъ
справу можно сниматьъ въ лучшемъ спе-
пени ея совершенства, когда она цвѣ-
тѣтъ; и не должно думать, чтобъ су-
шенныя травы только составляли луч-
шее сѣно: оное изъ сушеныхъ злаковъ
(*), а особливо когда сѣи будутъ луч-
шихъ родовъ, можетъ съ оными не по-
комо на ряду поставлено быть, но въ
нѣкоторомъ видѣ еще и предпочтено.
Въ XI Части сего сочиненія въ VIII гла-
вѣ предлагаются два травяныхъ рода
къ этому намѣренію; но есть еще мно-
гія кромѣ того, посѣвъ заслуживающія,
и кои вскорѣ будутъ описаны. Однако
въ разсужденіи сихъ злаковъ всегда бу-
детъ составлять главную вещь то,
чтобъ мы не такъ, какъ до нынѣ посту-
пали, собирали сѣмена ихъ безъ разли-
чія на полу сѣнныхъ сараевъ, и разсѣ-
вали смѣсю; потому что не должно оп-
супать отъ главнаго правила, *имѣть*
на лугахъ только одного роду траву,
когда желаемо оныя довести къ полно-
му совершенству. Одни только злаки
безъ примѣси между оными травъ не
всѣ вообще имѣютъ одинакій ростъ,
слѣдственно и цвѣшутъ не въ одну по-
ру, которая есть настоящее время къ
подкашиванію ихъ. Когда же желаемо
имѣть на лугу болѣе, нежели одинъ
родъ

(*) Что значить *злакъ*, объяснено будетъ въ слѣдую-
щемъ отдѣленіи подъ буквою Е.

родъ травы, то должно опобратъ два или три рода шаковыхъ покмо, кой въ роснѣ другъ друга не предупреждающъ, не задерживающъ и не заглушающъ, но въ одну пору роснѣ свой оканчивающъ, и въ цвѣщеніе вступающъ. Много еще оспалось опышовъ Хозяевамъ въ разсужденіи злаковъ, чѣмъ можно было показашъ для каждаго изъ нихъ рода приличную пошву земли, и какой родъ травы на кошорой лучше раснѣтъ, какъ - то въ разсужденіи хлѣбовъ мы успѣли, и опредѣляшъ можемъ: на помѣ или другомъ полѣ, или десятинѣ земли, лучше урожаешся шотъ или иной родъ хлѣба, при шаковомъ или инаковомъ воздѣланіи.

- в) Не всѣ травы и злаки въ свѣжемъ своемъ состояніи имѣющъ равной шолщины и связи шебли и лиспы, чѣмъ по скошеніи въ одно время засохли. Между шѣмъ, какъ будешъ выжидашъ шого или другаго роду шраву или злакъ, пока она засохнѣтъ, другіе роды могушъ уже пересохнушъ, и шѣмъ много ушрашишъ своей силы. Въ эшомъ намѣреніи уборка сѣна съ лугу, одною шравою засѣянаго, легче и скорѣе, а по сей одной причинѣ можно получишъ сѣ него пишательнѣйшее сѣно. Не рѣдко на лугахъ случающся шаковыя шравы, коихъ лиспы и шебли шолько сочны, что оныхъ, въ мочливыя лѣша особливо,

почти никогда порядочно засушить не можно. Если травы и роды злаковъ, кои хотя не столько полносочны, но снабжены связною кожею, кошорая изхожденіе парами внушренныхъ влажностей задерживаетъ, и высыханію чрезъ то препятствуетъ. Таковаго роду, на примѣръ, у насъ (говоритъ Авторъ) нѣкоторые роды луговыхъ травъ, для кошорыхъ по скошеніи травы принуждено бываетъ разъ по двенадцати въ день на лугъ ходишь; ибо безъ таковаго присмотра оныя въ рядахъ въ жаркое время очень скоро сопрѣютъ. Если же на лугу будутъ травы или злаки, кои во время косьбы уже поспѣли, высохли и переспоили на корни, еще болѣе пересыхаютъ, лежа въ рядахъ во время сушенія съ прочею правою, а и того болѣе по сложеніи въ копны, или въ самомъ сѣнѣ. Такъ, на примѣръ, склизъ или собачья петрушка, описанная выше въ числѣ вредныхъ травъ, лишается своихъ листовъ прежде, нежели скошена будетъ. Это не составило бы убытку; но очень многія и здоровыя травы поному же подвержены.

- г) У нѣкоторыхъ экономическихъ писателей къ разпахиванію луговъ предлагаются проспранныя разпоряженія, также и особливые орудія къ тому, чрезъ что не мало Хозяева отъ предпріятія сего удерживаются; однако съ лугами дол-

должно при вспахиваніи ихъ точно такъ поступать, какъ обычно съ пашнями въ паровомъ клину. Въ разсужденіи пашбы скоша должно во многихъ мѣстахъ часть пароваго клину уже въ Августѣ, когда рожь снята будетъ и по жнивью очисшится мѣсто къ скошопашву, въ первый разъ пахать взметомъ, а чрезъ нѣсколько недѣль двоить, и наконецъ поздно осенью засѣвать озимымъ хлѣбомъ. Таковымъ образомъ можно лугъ, по снятіи съ него одной или двухъ травъ, въ Августѣ вспахать взметомъ широкими бороздами, и ожидать по состоянію погоды, когда дернины еще осенью того же году сопрѣвуть, тогда передвоить, а потомъ доброю желѣзною бороною совсѣмъ раздробить, и травы съ корнями ихъ повышаскать. Если сего сдѣлать будетъ не можно, потому что паханіе будетъ поздно предпринято, или погода не благопоспѣшна, почему дернины не скоро перепрѣвуютъ; тогда оставивъ взметъ лежать въ зиму не двоя, и уже весною такъ перепахать, чтобъ учинить землю къ принятію травныхъ сѣменъ столькожъ способною, какъ лучшую пашню.

- д) Въ первой Части сего сочиненія, при случаѣ описанія славнѣйшихъ пашенныхъ системъ, при такъ называемомъ обмѣнномъ земледѣліи, т. е. превра-

щая пашни въ луга, а сїи въ пашни посмѣнно, обстоятельно упомянуто о семъ, что оное въ нѣкошорыхъ мѣстахъ Нѣмецкой земли употребительно, на примѣръ, въ Мекленбургїи, и извѣстно подъ названїемъ коппельнаго Хозяйства. Кому не можно сему у себя въ точности подражать, но удобно однако ежегодно малою частію то производить; ибо не во всякихъ обстоятельствахъ и всемѣстно можно совѣщивать, чтобъ Хозяинъ вдругъ много своихъ луговъ разпахалъ, и тѣмъ по состоянію годовой погоды въ первое лѣто лишилъ себя части сѣннаго сбору. Кто не имѣетъ еще въ этой части Хозяйства довольнаго свѣдѣнія, лучше тому ежегодно только по малой долѣ луговъ своихъ поднимаешь и обсѣваешь однимъ родомъ травы. Въ опношенїи же къ упомянутому шеперь обмѣнному земледѣлію, или коппельному Хозяйству, можно лугъ по взодранїи онаго обсѣять въ первый годъ озимымъ хлѣбомъ, или когда сего успѣть будетъ не возможно, то въ слѣдующую весну яровымъ хлѣбомъ, или спручковыми овощами. Нѣкошорые луга имѣютъ подъ собою шаковую мягкую землю, что (какъ-то въ разныхъ мѣстахъ видѣнь можно) по хорошемъ вспаханїи весною узкими бороздами можно ихъ обсѣять овсомъ или льномъ. Можно удо-

удобно заскородишь сѣмена, по бороздамъ разсѣянные, но не должно бороздъ разворачивать поперечную скородью. Не взирая на то, что сѣмена большею частью упадутъ въ глубину бороздъ, забираются въ землю, и всходяишь длинными рядами, удаются они на этой нови, никогда подъ сѣвѣ, или по крайней мѣрѣ давно не упошреблявшейся, не шокмо хорошо, но и дернины взмешу чрезъ лѣто совершенно перепрѣвакшъ. По сяншій хлѣба шаковой лугъ, которой уже *распашъ* называется, двоится, скородится, еще разъ или два перепашивается, и тогда обсѣвается озимымъ хлѣбомъ. Первое дѣйствіе, по сѣвѣ-взмешаннымъ бороздамъ сѣять овесъ или ленъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нижней Саксоніи называется *дрейшъ*; равномѣрно говоряишь шамъ, когда шаковую распашъ, обсѣявъ шравую, опашъ въ лугъ запусшашъ, дрейшъ запустилъ въ облогу. Когда шаковымъ образомъ воздѣланной лугъ вторично хлѣбомъ обсѣянъ будешъ, можно разсѣивать и шравныя сѣмена, когда хлѣбъ уже взошелъ, дабы оныя еще осенью въ землю дождемъ могли бытъ вбишы, а весною взойши и вмѣстѣ съ хлѣбомъ росши. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣютъ и гречиху по взмешу шаковому, которая на распаханной облогѣ лучше всего урожаешся. Можно же

таковой разпаханной лугъ засаживать каршофелемъ: обкапываніе оныхъ мотыкою, для присыпанія къ сѣволамъ ихъ земли, учиняешъ оную очень мягкою, и къ приняшю травныхъ сѣменъ впредь способною. Каждому Хозяину должно пошву земли своей съ прочими обстоятельствомъ своего мѣста такъ знать, чшобъ могъ онъ избрать легчайшее и способнѣйшее средство засѣвать луга свои тѣмъ или инымъ родомъ травы. Естли не препятствуетъ ему право скотопасства, можетъ онъ по предписанному образу разпаханной лугъ до обсеянія травною одною рода занять нѣкошпорыми полевыми лѣпными плодами. Въ таковомъ случаѣ можетъ онъ лугъ свой либо однажды яровымъ хлѣбомъ обсеять, или засадить картофелями ранняго роду, по разположенію мѣста, или, не обсеивая яровымъ хлѣбомъ по взмету, лугъ пахать сохою до тѣхъ поръ, какъ земля сдѣлается мягка, и посредствомъ скородьбы вычищена, засеять по ней желаемой родъ травы, и пошомъ укашашъ кашкомъ, естли прибише сѣменъ въ землю не ввѣряешъ будущему дождю, или при господствующей засухѣ онаго ожидашъ не можетъ. Можно съ симъ сравнить то, что сказано будетъ о засѣвѣ луговъ одною травною во второй половинѣ сего сочиненія въ XI Части, въ главѣ VIII. Естли по снятіи

тій травы пущенъ будетъ скотъ на незашвердѣвшую еще землю, и оную разшолочивъ, тогда при заказаніи луговъ будущій годъ можно прокашишь кашкомъ, и шѣмъ слѣды скоповъ загладить.

- с) Разпахиваніе луговъ къ засѣву травною одного роду можно Хозяину совѣщывать и по тому главному основанію, что шѣмъ пошва земли какъ бы освѣжается, и къ произведенію несравненно множайшаго количества сѣна, которое по свойству пошвы до цѣлой половины просшираться можетъ, удобряется. Когда представишь себѣ настоящее содержаніе луговой пошвы, которая досель приносила одну только траву: эта пошва представляетъ настоящій войлокъ; старые связные корни такъ въ ней переплелись, что молодая мочка корней не имѣетъ мѣста, гдѣ прицѣпиться, и тянуть въ себя питаніе. Представимъ же себѣ вновь перепаханной лугъ, въ которомъ всѣ старые травы и корни посредствомъ переработыванія земли ораніемъ содрѣли, а чрезъ то въ навозъ превратились: пошва чрезъ то сдѣлалась чиста и свободна, такъ что молодые корни новой травы нигдѣ уже не находясь препяствія въ ширину и глубину просшираться. До столь олубенѣвшее и войлочистое дно луга никогда не имѣло на себѣ отверстія къ благотворнымъ влія-

нїямъ воздуха и солнца, такъ какъ наши хлѣбныя пашни посредствомъ паханїя къ принятїю оныхъ опшверзаются, и шѣмъ шолько поправляющся, какъ бы опъ вывезеннаго навозу. Въ эшомъ-то заключаея главная причина, опъ чего художественные луга, кои прежде паханы были шолько подѣ дшловину, шолько опшмѣнной урожай сѣна дающъ. Можно такового же урожаю шравы обѣщающъ себѣ, когда луговая пошва время опъ времени будещъ опшверзаема, и чрезъ-то приводима къ удобнѣйшему принятїю шолико плодощворныхъ воздушныхъ солей.

ж) По обѣянїи луговъ одного рода шравую не должно допускать росши по времени появляющихся пошпороннихъ шравъ, и не дающъ имъ усилишся къ заглушенїю или уменьшенїю главной шравы. Главная выгода опъ обѣянїя луговъ одною шравою, что всѣ не принадлежащїя къ оной расшѣнїя вдругъ глазамъ являющся, и пошому можно послать ребяшокъ, кои впрочемъ время свое въ игрѣ провождающъ по неупощребленїю оныхъ ни въ какое дѣло, къ выдергиванїю шаковыхъ пошпороннихъ шравъ, однакожъ безъ напряженїя силъ своихъ, и для чего пришавляющъ къ нимъ въ надзираштели шариковъ и шарухъ. Въ эшомъ упражненїи должна и Управа Благочинїя подавашъ руку помощи, наряжая бесполезныхъ

ныхъ нищихъ къ вычищанію шаковыхъ луговъ, дабы удерживать ихъ шѣмъ отъ праздности. Гдѣ же по близости есть смиришельные дома и богадѣльни, шамъ осужденные и бѣдные подѣ предводительствомъ, первые своихъ прислуживовъ, а вторые старостѣ, на шаковые луга вываживаемы бышъ должны, и шѣмъ заслуживать себѣ пропитаніе. Нѣкоторыя владѣльцы въ этомъ намѣреніи по числу десятиинъ могутъ съ смиришельными и рабочими домами контракты заключать, и послѣ того производя работою оставлять на ихъ попеченіе. Всюду есть (говоритъ авторъ относительно до своей страны) средственныя и малые пашенныя города, коихъ дѣти и взрослые шуенядцы шолько что по мѣру бродяшъ. Когда это отъ начальства замѣчено будетъ, надлежитъ шаковыхъ собирая отдавать подѣ присмотръ, и съ прислуживомъ отсылать къ владѣльцамъ земель, съ коими заключенъ договоръ о вычищаніи луговъ и пашенъ: послѣ сего конечно меньше будетъ нищихъ шаскаться по улицамъ, или не будутъ оныя по прежнему питаться празно.

Е. Показаніе лучшихъ законовъ (*).

Ученому Эконому не нужно сказывать, въ чемъ состоитъ различіе между правъ
и

(*) Да проститъ мнѣ общество сей вольной переводъ Нѣмецкаго названія. Grafer въ слово элакъ. У насъ

и злаковъ; для не знающихъ же нужно сказать, что это растѣнія, кои въ разсужденіи своихъ внутри пуспыхъ, бороздастыхъ, коленцами и узлами снабженныхъ стеблей, листовъ, луговашыхъ цвѣтовъ, и своихъ единичныхъ сѣменныхъ зеренъ къ нашимъ обыкновеннымъ хлѣбнымъ родамъ, какъ-то пшеницѣ, ржи, овсу и шому подобному сходствуютъ: ибо и помянутые хлѣбные роды къ роду злаковъ надлежатъ. Когда же сравнить съ помянутыми родами хлѣбовъ, собственно травами называемыя, какъ-то павилику, рѣпейникъ, сурѣпицу, то каждый усмотритъ различіе между травъ и злаковъ.

До нынѣ на художественныхъ лугахъ больше уважали травы, нежели злаки, и послѣдніе не надлежащимъ образомъ почти совсѣмъ пренебрегали, что по мнѣнію моему большею частью отъ того происходило, что Хозяева лучшіе злаки мало знали, и послѣ отъ меньше добрыхъ травъ отличать научились. Преимущественно лучшіе злаки понынѣ еще большей части Хозяевъ сколько не знакомы, что и названія ихъ

не было по днесь еще такового различія въ названіяхъ травамъ простымъ съ тѣми, кои сходятствуютъ къ родамъ хлѣбнымъ. Не могъ я назвать оныхъ луговыми травами, ибо сіе не объяснило бы ихъ; поелику на лугахъ растутъ всякія травы. И такъ заимствовалъ я Слѣянское слово *злакъ*, которое, какъ мнѣ показалось, самое это означаетъ во Псалтирѣ: *злакъ на службу скотомъ*.

ихъ имѣ еще чужды. Большая часть Хозяевъ средственнаго состоянія изъ сего себя изключить не могутъ. Только между пасухами, овчарами и земледѣльцами естъ кой-гдѣ больше примѣчательные люди, кои лучшіе злаки знаютъ и называютъ умѣютъ.

Что же злаковъ не должно поставлять ниже кормныхъ травъ, это лучше мнѣ рѣшишь опредѣленіемъ нашего величайшаго Бопаника, нежели моимъ собственнымъ. Я разумѣю въ томъ славнаго Доктора Г. *Бемера*, которой въ новомъ зрѣлищѣ Природы пишетъ такъ: злаки въ хозяйствѣ составляютъ необходимое растѣніе. Поелику луга и мокрединныя мѣста сами собою не могутъ производить лучшихъ злаковъ, ни въ довольномъ количествѣ, заводя въ художественные луга, и спарающа на оныхъ сѣявъ либо одни шокмо злаки, или въ смѣси съ другими кормными травами. Однакожъ злаки по приличію должны первенствующую часть оныхъ занимать; для того что они питаются не насыщая, удобно въ желудкѣ перевариваются, не приключая надмѣнія и жару, какъ то дѣлаютъ многія кормныя травы, когда одними оными кормить; ибо, когда злаки находясь на естественномъ имъ собственномъ, умѣренно влажномъ, и питательномъ днѣ, и состоятъ въ полномъ ростѣ, бывающъ мягки, рыхлы, сочны, и содержатъ при чистомъ, водянисто-сладко-

сладковашомъ, или мокрошно - сладкомъ, умбренномъ, нѣсколько бальзамичномъ вкусъ, иногда нѣчто сокрытое, очень умбренно вяжущее, также улаждающій бальзамичный запахъ. Послѣднимъ не доспаетъ естественныхъ добрыхъ свойствъ либо опчасши, либо вовсе. Онъ суровы, связны, полстобылы, кислы, жестки, и не для многихъ скоповъ годящся. Ядовитыхъ нравъ въ собственномъ смыслѣ у насъ нѣтъ; но могутъ шакковыя быть случайно, бывъ осквернены шиною и насѣкомыми, кои на нѣкоторыхъ мокрыхъ и тучныхъ пажисяхъ произходящимъ отъ того своимъ надмѣвающимъ и неудобоваримымъ свойствомъ, не примѣннымъ образомъ полагаютъ основаніе къ продолжительнымъ заразамъ въ скопѣ. Сверхъ того могутъ злаки скотамъ даваемы быть либо свѣжѣ, или сушеные сѣномъ. Напротивъ же многія другія распѣнія, а особливо возхваляемые роды дяшловинъ, и многія другія спручковые плоды носящія распѣнія листья свои при сушеніи многимъ количествомъ шеряющъ, а пошому трудно ихъ засушить на сѣно безъ великаго урону; шакже легко повреждающся, естли спебли ихъ не совсѣмъ засушены будутъ. Единое только обстоятельство, можетъ быть, учиняетъ посѣвъ злаковъ непріятнымъ, что ихъ рѣдко можно скашивать больше двухъ разъ, другія же распѣнія снимающъ до нѣсколку разъ; одна-
кожъ

кожѣ безвредность и доброша травы, когда ее скосишь въ надлежащую пору и въ плодоносящемъ состояніи, убытокъ эшотъ изобильно награждаетъ. (Въ разсужденіи медвяной травы, *Holcus lanatus* у Линнея, на добрыхъ земляхъ дошли уже до того, что скашивающъ оную, естли не чаще дятловины, по крайней мѣрѣ сшолькожъ разъ, и она всегда опростаетъ. Не досматъ только опышовъ съ другими родами злаковъ, кои можешъ бытъ въ разсужденіи скорого росту отъ медвяной травы не опстанутъ. Съ прошедшаго года между добрыми злаками открытъ одинъ родъ, кошорой у медвяной травы почти выигрываетъ, и въ чемъ опдана ему отъ Экономовъ по многихъ опысахъ справедливостъ. На старыхъ самородныхъ лугахъ конечно большая часть злаковъ рѣдко можешъ опростать до двухъ разъ, и сшолькожъ скашивается бытъ; но посѣйшюкмо злаки на распаханной землѣ, какъ-то по днесъ съ дятловиною и медвяною правую производило, дабы опредѣлишь, сколько разъ оныя скашивать можно, и сколько они въ эшотѣ дятловинѣ уравниются, или нѣтъ. Можно же и на самородныхъ лугахъ чрезъ наводненіе и унавоживаніе, какъ въ послѣдствіи объяснено будетъ, злаки доведши къ тому, что можно будетъ ихъ скашивать чаще обыкновеннаго, и въ эшотѣ случаѣ дятловинѣ уравнишь.) Къ сему присовокупляется,

что

что на маломъ пространствѣ несказанно много злаковъ расшѣтъ, и своими узкими и гибкими лиспами они всѣ промежки, ославляемыя отъ другихъ расшѣтій, занимающъ и наполняющъ; далѣе, что у родовъ травъ, многолѣтний корень имѣющихъ, каковыхъ очень много, корни ошчасу больше сплетаются, опускающъ больше стеблей и листовъ, когда будутъ почасу скопиною сбѣдаемы, или подкашиваемы. — (Нѣкопорые изъ сельскихъ Хозяевъ въ разсужденіи спручковыхъ расшѣтій взирающъ больше на кучу, нежели внутреннее содержаніе оныхъ въ отношеніи къ злакамъ. Когда мѣсто, на которомъ расшѣтъ одна дяшловина, съ другимъ равной величины, на которомъ нѣтъ, кромѣ травы, обозрѣтъ, покажешся, что дяшловины больше, нежели простой травы, съ равнаго мѣрою мѣста снятъ можно; однакожъ видъ обманывается. За нѣскольکو лѣтъ предъ симъ вѣсилъ я зеленую дяшловину и зеленую медвяную траву, сняшыя съ мѣстъ равной мѣры, и нашелъ, что послѣдней вѣсомъ было гораздо больше. По засушеніи дяшловины и травы нашелъ я послѣдней цѣлою прешью вѣсомъ больше, не взирая на великую осторожность въ сушеніи дяшловины, именно на простыняхъ, такъ что ни одного листка оной не пропало. Также дяшловина и медвяная трава росли на землѣ равной доброты, имѣли одинакій ростъ, и въ одну пору

ру зацѣли. Зависитъ еще равномерно отъ дальнѣйшихъ опытовъ, не могутъ ли многжайшіе роды травъ, кромѣ медвяной, съ дяшловиною равняться или еще оную превозвыситъ).

Но изъ вышенаписаннаго заключенія Г. Бемера можно разумѣть, какъ своей имѣетъ Хозяинъ въ собственномъ шакѣ называемыхъ злакахъ ошмѣнно добрый кормъ, и сколько мало людей разумѣютъ собственныя свои выгоды, когда по обыкновенію, до сихъ поръ бывшему, большая часть Хозяевъ взираютъ на нихъ равнодушными глазами.

Прежде, нежели покажу я лучшіе роды злаковъ, кои предъ другими посѣвъ заслуживаютъ, должно чистапельямъ напомнить, чѣмъ они сначала произвели опыты малымъ дѣломъ, и посредствомъ оныхъ извѣдали, кошорый родъ по сложенію пошвы луговъ ихъ лучше родиться можетъ: ибо, какъ вѣдаютъ они въ разсужденіи пашенъ своихъ, что пшеница и ямень шребуютъ земли лучшей, нежели рожь и овесъ, не иначе и съ разными родами злаковъ. Между преимущественно добрыми злаками не многіе шокмо на всякомъ мѣстѣ безъ разбору рости могутъ. Между шakovыми не многими на прим. медвяная шрава, кошорою самой сухой песокъ укрѣпить можно, кошпа на ономъ растетъ, но на доброй землѣ шпрое и чешверо выше выбѣгаетъ; на углубленныхъ же и зашопленіямъ под-

верженныхъ мѣсахъ напрошивъ не хорошо удерживается. Хотя многіе изъ лучшихъ злаковъ на сухомъ пескѣ осенью въ мочливыя лѣша расшумъ, но не удерживаются и выпадаютъ. Далѣе, есть роды шравъ, кои на холодной глинястой землѣ не удерживаются, хотя поминаемая медвяная шрава держится на оной преизрядно. По сему долженъ Хозяинъ опыты свои къ засѣву луговъ одною шравою сперва произвестъ въ маломъ дѣлѣ, или ожидашь, пока ошъ другихъ получишь наспавденіе, на каковой землѣ шомъ или иной родъ злаковъ съ выгодною сѣянъ можно. Если же на самородныхъ его лугахъ ешь добрый родъ злаковъ, между другими шравами смѣшенно расшущей, то по виду онаго можешъ заключить, какую пошву земли онъ болѣе любитъ.

Напоследокъ сельскій жишель долженъ напередъ замѣнить, что обсѣяніе луговъ одинакою шравою, по состоянію пошвы, можешъ отчаспи ранѣе, часью же позднѣе повшоряемо быть, по мѣрѣ того, какъ постороннія шравы опянь на оныхъ появляясь, и главную шраву слишкомъ глушить могутъ. Такъ, на примѣрѣ, извѣстный пухъ на умѣренно влажной землѣ можешъ вскорѣ опянь появившись, который ошъ самомалѣйшихъ въ землѣ оставшихся корешковъ опраспашетъ и разпроспраняясь начинается. Когда же лугъ, на кошоромъ хотя не много пуху
пра-

правы находишся, не будешь скошенъ до поспѣлости его многочисленныхъ сѣменъ, будешь оныя въпрямъ всюду разнесены и разсѣяны. По сему должно при начинающемся одолбнѣи отъ постороннихъ нравъ вновь ко вспахиванію луга приступать, и начать перемѣну посѣву дяшловиною, спружовыми плодами, хлѣбомъ и проч. умалчивая о томъ, что прежде описанное подъ буквою д) главное основаніе, для кошораго разпахиваніе луговъ предписывается, по нѣкоторому порядку годовъ очередь свою имѣть должно.

а) *Медвяная трава, конская трава, пырей хлѣбообразный мягкій, Honig-gras, Ross-Gras, Gramen paniculatum molle, Holcus lanatus у Линнея.* Этотъ родъ травы, когда я въпорую половину сего сочиненія подъ заглавіемъ Хозяйка издалъ сначала, и траву сію выхвалялъ (смотри Часть XI, главу VIII), съ того времени многіе Хозяева начали оную сѣять. Въ помянутомъ мѣстѣ описаны выгоды отъ этой травы, и можешь оная сѣена быть съ дяшловиною, хлѣбомъ, или одна особнякомъ. Еслили будешь она сѣена одна, должно производить это осенью, и лучше рано, нежели поздно. Очень дробныя сѣмена ея разсѣваются сверху, и оспавляются дѣйствію дождя, чтобъ онымъ вбило ихъ въ мягкую землю. Когда же пошва земли будешь шверда, каковъ, на прим.

суглинокъ, можно заскородить ихъ легкою бороною, или еще лучше укатать капкомъ. Свѣжими сѣменами можно сѣять съ Августа до новыхъ сѣменъ.

Преимущества травы сего роду очень похваляющъ, а именно, что она какъ на низменныхъ, такъ высокихъ, сухихъ и песчаныхъ мѣстахъ росши можетъ, а послѣднѣя отъ оной утверждающъ, такъ что со временемъ могутъ составлять лучшую для овецъ паству, когда только обсеянное этою травою мѣстомъ до тѣхъ поръ пощадишь пастбою скопа, пока все дно травою связано будетъ. Но сыпучій песокъ сѣменами сими обсеивать можно тогда, когда можно уповать, что не будетъ недостатка въ изобильномъ дождѣ или влажности въ Октябрѣ или Ноябрьѣ. Въ мочливые годы можно избирать къ тому и лѣтніе мѣсяцы.

Каждая трава получаетъ по состоянію пошвы земли своей больше или меньше росту. На доброй тучной луговой землѣ получаетъ медвяная трава, которая тучнѣе еще лучше укушается, толстѣйшіе стебли, нежели пшеничная солома, даже валяется, въ предупрежденіе чего должно траву эту косить еще до раздвѣтанія ея.

Когда намѣрено траву эту употребить зеленую съ кормъ, можетъ это въ смѣси съ дятловиною быть всего лучше. Когда сѣяна она, не смѣшавъ съ
для.

дѣшловиною, тогда дають ея въ кормъ либо смѣшавъ съ сѣнною дѣшловиною, дабы у скотины не происходило надмѣнѣнїя, или попеременно одну дѣшловину, пошомъ медвяную сѣну. Можно же и чрезъ день давать сїи сѣны мѣня. Таковая перемѣна зеленого корму скотамъ чрезмѣрно прїятна, и замѣчается пришомъ, что побужденїе ихъ къ ѣдѣ чрезъ шо поддерживается и поощряется. Всегда одинакой кормъ наскучиваетъ скотинѣ, на стойлѣ содержимой, ештьли по крайней мѣрѣ соломы или сѣна не будетъ даемо въ перемежку.

Когда коровы сїю сѣну, ештьли сѣбли ея шолсты и шросисшы, будишъ ѣшть ежедневно, и единственнѣй ихъ въ шомъ кормъ состоятъ будишъ, многїя придушъ въ ушомленїе, и умирають могушъ. Въ шакшомъ случаѣ должно оную крошишь мѣлкою рѣзкою. Ештьли рѣзашъ вмѣстѣ съ нею сѣно или солому, кормъ эшомъ не шолько коровамъ наскучишъ.

Болошисшыя луга, или шакшвы, кои зимою или весною шолько нѣшколко недѣль подъ водою стоишъ, эшою сѣною засѣвать не должно; ибо напослѣдокъ она на нихъ переводишъ.

Порокъ сего шолько полезнаго злака состоишъ въ шомъ, что зашопляемая въ сѣно, когда долго на рядахъ пролежишъ, корни ея на шомъ мѣстѣ

вымирають, или по меньшей мѣрѣ убавляются; почему на рядахъ лежащую должно ее на другой день, или по крайней мѣрѣ въ третій, граблями перевернуть на новое мѣсто. Еслии шрава сія будетъ состоять въ загороженномъ мѣстѣ, куда скошина неходитъ, будетъ оная послѣ последней скоски въ глубокую осень при инѣяхъ и умбранныхъ морозахъ, подобно озимому хлѣбу, еще опроснать, и пребывать здоровымъ скопскимъ кормомъ, тогда какъ дятловина опъ инѣевъ и морозовъ уже почернѣетъ, или по крайней мѣрѣ обрюзгнетъ, или плесневѣлые листья получатъ. Но должно наблюдать, чтобъ скошеніемъ медвяной шравы въ Ноябрь (около 20 Октября по Россійс. счету) не опоздать: ибо когда нападетъ уже лежачій снѣгъ, а шрава эта хотя на палецъ опросла, тогда таковая покрывка съ корнямъ, еслии не будетъ смертоносна, по крайней мѣрѣ очень ихъ ослабитъ, и учинитъ, что она въ слѣдующую весну вырастетъ рѣдка и меньше уклочится. По недоспадку опытности не могу я сказать, происходитъ ли это на мѣстахъ возвышенныхъ, гдѣ шравы меньше ширекіе и тучные листья получаютъ. У меня же, гдѣ злакъ этотъ содержится на низменныхъ и хорошо удобренныхъ мѣстахъ, а потому получаетъ очень ширекіе и тучные листья,

сты, эштоу уронъ никогда не проходишь. Понеже на лиспахъ ея находится мягкой мохъ, и въ осязаніи являесться какъ бархатъ; производящъ оныя подъ собою много теплоты, а олѣ того степели и корни сопрѣвають. Я щитаю, что права эша можетъ быть очень способна защищать корни нѣкоторыхъ иностранныхъ деревъ, кои оставляются въ зиму на открытомъ воздухѣ, олѣ зимней спужи сполькожъ хорошо, какъ наваливаемый на оныя навозъ, естли усплатъ ихъ оными подъ зиму.

Случается наконецъ, когда медвяная права на одномъ лугу шесть и восемь лѣтъ простоитъ, что между оною появляющіяся плѣшины, а именно: права эша укущается чрезмѣрно, такъ что со временемъ на доброй землѣ выходящъ такіе кусты, что выходитъ изъ нихъ олѣ 20 до 30 и больше степелей. Между шаковыми кустами, когда оныя убавяшся со временемъ и сдѣлаются меньше, производящъ плѣшины, или голая земля, которую вновь обсеваешь должно, естли разположено лугъ еще далѣе подъ эшою правую содержать. Когда пошва земли тверда, или на плѣшинахъ выростушъ кусты другихъ злаковъ и травъ, должно только вскопать землю мотыкою на плѣшинахъ, чтобъ разбѣянные на оныхъ сѣмена корень пустишь могли. Для сего намѣренія должно только ма-

лое мѣстечко этой sprawy при первой косьбѣ пощадишь, и дашь сѣменамъ вспѣть совершенно.

Собираніе сѣменъ производишь чрезъ осмыгиваніе оныхъ рукою съ sprawy, стоящей еще на корнѣ; ибо когда оную съ сѣменами скосишь, чтобъ послѣ ихъ вымолошишь, симъ образомъ спѣлыхъ сѣменъ получишь не можно для того, что слабо сидящія въ гнѣздахъ своихъ сѣмена сіи онѣ малаго движенія воздуха, или онѣ дождя выпадающъ. Когда же справу скосишь съ недоспѣлыми сѣменами, оныя не взойдутъ. Зрѣлость сихъ сѣменъ познаваема бываетъ по спелю, кошпорой тогда бѣлеть начинаеши; тогда они легко рукою осмыгиваются. А какъ сѣмена сіи очень drobны, много потребно оныхъ къ засѣву мѣста, кошпорой должно производить въ самый тихій день, чтобъ верженія всюду равно ложились. До нынѣ у насъ Хозяева, кои предпринимали съ этою справою опыты, чрезъ два года снабжаемы были лучшими сѣменами медвяной sprawy онѣ Интелижанцѣ-Коншоры Лейбцигской, и надобно полагать, что справа эта во многихъ мѣстахъ болѣе уже не незнакома.

6) *Многоцвѣтной водяной шишковникъ, или водяной пырей трава, großer Wiesen, Poa aquatica у Линнея.* Мы имѣемъ справу этой два рода, большую и малую. Первая вырастаетъ болѣе, неже-

ли

ли въ человѣка вышиною, имѣетъ очень толстый стебель, и въ среднемъ Маркѣ Брандбургскомъ находится вдоль береговъ Хавеля, но не всюду, и тамъ, гдѣ она безпрестанно подъ водою растетъ, составляетъ вкусный кормъ, коимъ не только лошади и рогатой скотъ, но и овцы очень охотно и такъ бѣдятъ, что можно онымъ очень скоро откормить скотину на убой. Для этой причины посѣвъ этой травы совѣшанъ на самыхъ мокрыхъ лугахъ. *Смотри* вторую половину сего сочиненія Частъ XI, главу VIII. До нынѣ щипали трудностию получать сѣмена этой травы изъ шѣхъ мѣстъ, гдѣ она растетъ, для того что отчасти должно за оными разбѣзжашъ на лодкахъ, частью, гдѣ можно безъ лодокъ, по болотамъ плавающимся. Давно уже Хозяева начали у себя на самыхъ низкихъ мѣстахъ сѣять эту траву, и въ нынѣшнемъ еще году сѣмена оной находились въ Лейбцигской Интелижансѣ-Конторѣ. Прежде сего выхваленная для мокрыхъ болотистыхъ луговъ въ Экономическихъ писаніяхъ *Тимовеева трава*, *Wiesen Leisch-Graz*, *Phleum pratense* у *Лин.* не мало не заслуживаетъ быть поставлена на ряду съ шишковникомъ.

Въ вышепомянутой главѣ XI Части будетъ описанъ примѣръ, что водяной шишковникъ и тамъ растетъ, куда во-

да никогда не доходишь, а именно: одинъ Хозяинъ подъ первый сѣвъ этой правы избралъ мѣстечко черной болошной земли осушенной, на которомъ саживалъ онъ капусту; ибо заключилъ онъ, что каждая, хотя водополи неподверженная, добрая, сѣжая или влажная земля, носящая хорошую бѣлую капусту, пшеницу и тому подобное, можетъ годна быть и къ посѣву водяного шишковника.

Когда же луга, временно подъ водою бывающіе, обсеяны этою правою, должно оныя вспахать, или вскопать, или взрубить мошикою, какъ то можетъ быть кому способнѣе, по малу съ году на годъ производишь, и опчаси свободишься отъ кислыхъ нравъ и сѣна, частью же чшобъ получать съ нихъ праву и сѣно одного роду.

Однако посѣянная эта права растетъ лучше, когда посредствомъ маленькихъ ровковъ и бороздокъ мѣсто ея наводняемо быть можешь.

Никакую праву не можешь быть удобнѣе заготовлять на сѣно, какъ водяной шишковникъ: ибо гдѣ оная растетъ, бываетъ шамъ единственною правою, и въ разсужденіи своего росту и густоты, подобно хлѣбу, вилами въ сушеніи на рядахъ разбивается, или за толщиною валовъ провѣтривается. Когда высохнетъ, связывается оная въ умѣренныя вязанки, по-

подобныя хлѣбнымъ снопамъ. Почему накладка на возы и складываніе производимъ очень проворно; а таковыми снопами Хозяину можно заранѣе разчисленіе сдѣлать, на сколько ему таковаго сѣна въ домашнемъ расходѣ спашемъ.

По берегамъ Хавеля, когда вода велика, во время сѣнокосу должно праву эшу косить подѣ водою; однакожъ при выноскѣ оной на берегъ къ сушенію гораздо меньше труда и прапы, нежели какъ бываетъ съ другими злаками. Ни одна былина не пропадаетъ, потому что всѣ онѣ имѣющъ равной ростъ и одинакое наклоненіе. Къ сушенію выпашенная водяной пишковникъ трава поспѣетъ разсѣлается, какъ солома, въ другихъ же злакахъ великой уронъ произойдетъ, когда съ ними поступимъ таковымъ же образомъ.

Лошади, коровы и овцы бдятъ сѣю праву некрошеную, ни мало не разпрушивая подѣ ноги; но ягнятамъ и ошнятымъ шблятамъ лучше давать оную рѣзкою.

в.) *Луговой овесъ, дикій овесъ, Французская райграсъ, или фроманталь,* копорую однако не должно смѣшивать съ райграсомъ Англинскимъ, по Нѣмецки *Wiesen-Haber, Knoll-Haber, Knollen-Craß, Avena elatior* у *Линнея*. Трава сѣя изъ самыхъ раннихъ кормныхъ злаковъ, потому что можно оную еще въ Маѣ мѣсяцѣ косить. Имѣетъ ползучей корень,

рень, изъ котораго вырастають многіе, въ аршинъ съ четвертью и въ полшора аршина длиною себля. Лиспы на нихъ длиною болѣе трехъ вершковъ, широки, и обыкновенно на обѣ стороны гладки; кисти цвѣтчныя отъ полупяди до 6 вершковъ длиною, не слишкомъ разширены. Колоски въ нихъ состоятъ изъ двухъ цвѣтковъ сросленные, равной величины, и оба усаженные блестящими волосками. Сѣмена выпѣваютъ совершенно большею частью только въ верху кисти, желтоваты, продолговаты, гладки, съ одной стороны съ бороздкою, и въ лузгѣ своей напросто рѣ содержатся. По вымоченіи можно ихъ подобно манной крупѣ (*Schwaden-Grüße*) въ пищу употреблять. Кисть выходитъ совсѣмъ сжавшись изъ ноженъ верхняго листа, по нѣсколькихъ дняхъ уже на длинные отростки разширяется горизонтально, короткіе же отростки стоятъ еще съ главнымъ себлемъ параллельно, что придаетъ кисти очень красивый видъ; наконецъ всѣ онѣ наклоняются внизъ, и кисть сверху начинается цвѣсти.

Сихъ опличительныхъ признаковъ можеть быть довольно къ опличенію этой травы отъ райграса Англинскаго, которую доднесъ еще съ нею смѣшаваютъ за одно.

Наша райграсъ или луговой - овесъ домашняя, и расшетъ удобнѣе на умѣренно влажныхъ мѣстахъ. На пескѣ и худощавой землѣ хопя она и расшетъ, однакожъ плохо. Цвѣшетъ она въ нашихъ мѣстахъ два раза, съ Мая и съ конца Іюля въ Августъ; а сѣе бываетъ не токмо, когда она будетъ скошена, но когда и на корнѣ проспоитъ, потому что весною при разцвѣщающихъ рано былинахъ во множествѣ находящіяся кусты лисновъ лѣтомъ вырастаютъ въ полныя соломины, и поздныя цвѣты произносятся.

Посѣвъ и польза этой сладостной лошадямъ, рогатому скоту и овцамъ кормной травы въ *Новомъ Зрѣлищѣ Природы* на Нѣмецкомъ языкѣ описывается тако: овесъ этотъ имѣетъ длинный сочный стебель, многіе длинные, широкіе, мягкіе лисы, множество лисовыхъ кусточковъ при каждомъ стеблѣ, и служить въ кормъ не токмо свѣжая, но въ заготовленіе сѣна; сверхъ того другому сѣну, съ копорымъ смѣшана, придаетъ особливую доброшу. Когда впрочемъ пошва земли хороша, получается этой травы свѣжей и сѣномъ вдвое больше, нежели отъ другихъ травъ. (Это должно такъ разумѣть: когда дикой овесъ или овсяная трава будетъ посѣяна особливо, опличается она въ показанномъ количествѣ отъ другихъ са-

самимъ себѣ предоставленныхъ злаковъ, каковое обстоятельство въ подобномъ содержаніи бываетъ съ медвяною травою и многими другими злаками, одинаково содержимыми, кои на самородныхъ лугахъ имѣющъ бѣдной видъ, но на художественныхъ лугахъ потчасъ поправляющся). Можно луговой овесъ либо одинъ, или въ смѣси съ другими кормными травами сѣять, только мѣша, подъ него назначаемыя, должны быть мокры, или такого положенія, чѣшбъ ихъ удобно наводнятъ можно было, когда мочливая погода не учинитъ сего ненужнымъ. Лучше всего оной сѣять на землѣ, бывшей предъ шѣмъ подъ хлѣбомъ. Она чрезъ паханіе подъ сѣвѣмъ прѣуготовляюща, и высѣвѣмъ производима весною или осенью при тихой погодѣ, пошому что сѣмена дробны, и пришомъ подъ дождь. Въ весенній сѣвѣмъ должно мѣшати эшомъ овесъ съ дяшловиною и луцерною, дабы онъ въ первый годъ бывъ слабъ, лучше выдерживалъ солнечный жаръ и лучше уклочался. Съ перваго даже въ шестой годъ урожай травы эшой будешъ отъ часу обильнѣе, а особливо когда землю въ шрестій годъ понавозишь; со втораго по шестой годъ можно оную за лѣшо раза три и больше косить. Чѣш она чоспѣла къ подкошенію, признакъ шомъ, что кисъ начнешъ показываться, а еще

еще не разцвѣшетъ. По шести годахъ можно эшопъ художественный лугъ оляшь разпахать и засѣять полевыми плодами. Сѣмена эшой травы собирающся, когда кисписшой колосъ начнешъ желѣть. Оныя легко высыпашся, и опъ сего луга сами безпресшанно обсѣваюшся. —

- г) *Луговой лисій хвостъ*, *Wiesen-Fuchsschwanz*, *Alopecurus pratensis* у *Линнея*. Трава эша любилъ нѣскольکو низменное, умѣренно влажное луговое мѣсто, а хоща можетъ расши и совсѣмъ на сухомъ или мокромъ мѣстѣ, но ошанетъ въ плохомъ ростѣ, а на послѣднемъ будетъ заглушена опъ другихъ травъ. Она растетъ почши во всякихъ мѣстахъ, и гдѣ естъ добрые самородные луга, сосшавляетъ шамъ всегда очень не малую частъ сѣна, въ кошорыхъ красивые широкіе листы эшой травы всегда узнать можно. Она имѣетъ жилозашой корень, чрезъ многіе годы продолжающійся. Былины ея выросшашъ въ аршинъ и полшора, съ широкими, длинными, по краямъ и срединѣ мохнашыми лисшами. Шишка бываешъ опъ полушора до двухъ вершковъ длиною, и сосшавляешся изъ малыхъ другъ съ другомъ шѣсно сжашыхъ цвѣшочныхъ пучковъ. Оба мѣшечка у ней равной величины, и усажены длинными лоснящимися волосками. Лузга подобна мѣшечкамъ, и ошъ

ость ея длиннѣе цвѣтовъ; сѣмена желтоваты и почти прозрачны. Весною появляется она рано, цвѣшетъ за лѣто раза по два, и красивыя ея серебристо-бѣлыя, темными полосками разцвѣченныя шишки появляются почти въ началѣ Мая; сѣмена созрѣвають еще до сѣнокосу. Она растетъ сильно, и опростаетъ споро, такъ что въ годъ легко можно косить ее раза три. Стебли ея толсты, мягки и сочны; листья широки. Вкусъ ея, какъ и долженъ быть въ добрыхъ кормныхъ злакахъ, склизокъ, сладковатъ и пріятенъ, которой и по засушеніи остается. Хотя этою правою нѣжно-шерстныхъ овецъ кормить бы и не надлежало, но онѣ бѣдятъ оную какъ свѣжую, такъ и въ сѣнѣ съ опмѣнною алчносшю. Всякое сѣно шѣмъ больше уважается, чѣмъ больше будетъ въ немъ травы лугового лисьяго хвоста. Гусеницы насѣкомыхъ, поѣдающія всякія травы, сію не трогаютъ; почему посѣвъ ея въ особливо-сипи полезенъ тамъ, гдѣ гусеницы одолеваятъ (*). Съ этою правою не должно смѣшивать пашенный или по пашнямъ

(*) *Лисій хвостъ* прозывается она по тому, что кучками растущіе ея цвѣты составляютъ подобіе лисьяго хвоста. Смори Ботанической подробной Словарь Г. Меіера, Москва, 1781 года, въ 4.

нямъ распушую лисій хвостъ праву, ко-
шорая множесшвенно распетъ на глини-
стыхъ мѣстахъ. Оба рода различаются
шѣмъ, что на первомъ шишка соспавле-
на изъ многихъ волосиспыхъ колосковъ,
а на эшой цѣльная, усаженная голыми
колосками.

Стелющаяся, водяной лисій хвостъ,
трава, плывучая трава, Flutt = Gras,
kleines Flott = Gras, kriechendes Spieß = Gras,
Alopecurus geniculatus у Линнея. Распетъ
по плоскодоннымъ рвамъ и болопамъ,
кои лѣшомъ пересыхаютъ, также по
низменнымъ мѣстамъ, копорыхъ не за-
ливаешъ, но кои влажны. Опличается
оная опъ обоихъ предшедшихъ родовъ
своими изогнутыми спеблями, кои въ
каждомъ коленцѣ уголъ соспавляютъ,
а у первыхъ спебли прямо вверхъ идушъ.
Оная, подобно просу, производишъ кустъ
спеблей опъ одного корня, кои сначала
спелются по землѣ, послѣ распушъ
вверхъ, и приносяшъ множесство сѣ-
менъ. У меня трава эша составляетъ
множесшвенную сорную праву въ пова-
ренномъ огородѣ; но кажешъ, что къ
посѣву равное прочимъ заслуживаетъ
одобреніе, для того что коровы ѣдятъ
ее весьма охотно.

- д) Анѣоксанфъ, желтая благовонная тра-
ва, желтая донная трава или лавен-
дель, gelbes Ruch = Gras, Meliloten- oder La-
Часть III. Отдѣл. 2. Ф wendel-

pendel: Gras, Anthoxanthum odoratum у *Линнея*. Волошисшой и долголѣшній корень ея производитъ многія вершковѣ семи вышиною прямо распушчїя былины, а иногда и шелющїяся опрасли. Лисшы у ней съ длиннымъ бѣлымъ мошкомъ съ обѣихъ сторонѣ, а особливо снизу; гладкіе же бывающѣ рѣдко. Цвѣтешъ она подобїемъ колоса вершка въ полшора длиною. Оба сѣменные пузырька бывающѣ величины не равной, и обѣ лузги на оныхъ длиною противъ меньшаго пузырька, съ конца скруглены и зубриспы; у каждой лузги естѣ ость. Сѣмена сросшашъ съ соковымъ листкомъ, и висашъ въ темноокрасной лузгѣ; оныя яйцеобразны, гладки и темно-вашы.

Донникъ эшотъ растешъ какъ по горамъ, шакъ на равныхъ лугахъ и водянистыхъ низменностяхъ луговыхъ; она можешъ расши на землѣ всякаго рода. Желашчїй обсѣяшь лугъ для сѣна овцамъ, шрава сїя преимущественно къ шому способна. Годишся же она и въ смѣсь съ другими добрыми родами шравѣ, когда нѣсколько оныхъ на лугу имѣшъ желашемо. Весною начинаешъ она рано цвѣсти, и мало по малу ошцвѣтаешъ. Ошъ прочихъ злаковъ удобно ее опличишъ по прїяшному ея запаху: оный въ корнѣ очень силенъ, сходенъ къ бизаму и нѣсколько прошивенъ, а въ шравѣ умѣренъ

ренѣ и прїяшенѣ, почти сходенѣ къ настоящей мелилошѣ или донной шравѣ. Благовонїе ей во всякое время свойствен-но, но сильнѣе бываетъ во время цвѣ-ту, и удерживается оное чрезъ многіе тоды, когда шрава хорошо засушена бу-детъ; вкусъ ея сладковатѣ и прїяшенѣ. Она надлежитъ въ число шѣхѣ немно-гихѣ шравѣ, кои всякому скопу вку-сны и здоровы, а особливо овцамъ. И шакъ между прочимъ кормомъ заспу-паешъ она мѣсто приправы, пишпель-на, сочна и листовьяна, разполагается хорошо, и можетъ за лѣто по состо-янію пошвы земной скашиваема быти отъ двухѣ до шрехѣ разѣ. Естли бу-детъ она смѣшана въ сѣно изъ другихѣ злаковѣ, и когда отъ сѣна прїяшный духъ, произходитъ онъ отъ доннику сего. Одна-кожъ сѣ задачей въ кормъ сполько благо-воннаго сѣна должно обходиться сѣ оспорожностію, чтобъ не давать онаго напередъ, а послѣ сѣна, не имѣющаго духовишности; ибо впрочемъ скопина за послѣднее нѣсколько дней принимается не будетъ. И для шого шакое сѣно должно оставляти къ послѣдямъ.

Донная эша шрава размножается очень легко, гдѣ она сама собою на лу-гахъ расшетъ, какъ отъ сѣменѣ, шакъ и кореньевѣ, а особливо естли луга подкошены будутъ по созрѣніи сѣменѣ. Для посѣву же сѣменами запасись очень

легко, когда колоски желѣть начнутъ; тогда оныя легко выпадають, естли обѣ нихъ поколошишь, или на корнѣ рукою съ спелей осмыгивашь. Для сего естественнымъ образомъ должно клочокъ лугу оспавлять на сѣмена, когда прочая шрава подкашивается.

- е) *Пырей или собачья трава*. Подѣ симъ названіемъ извѣсны многіе роды злаковъ, кои отъ Ботаниковъ различно раздѣляются. Г. *Бенеръ* раздѣляетъ оныя по ихъ цвѣточнымъ кисточкамъ, которыя у однихъ висятъ на одну сторону, а у другихъ равно на обѣ.

Между родами пырея, одностороннюю кисть имѣющими, счисаются 1) *Овечій пырей съ четверугольными стволами и щетиноватыми листьями, овечья трава, малая козлова борода, Schaaf-Schwingel, kleiner Bochs-Bart, Festuca ovina* у *Лин.* Gramen folio junceis brevibus majus radice nigra, С. В. Р. Растетъ на самой сухой землѣ по борамъ, холмамъ и каменнымъ горамъ. Сія овцамъ столько полезная шрава не рѣдко въ разсужденіи своихъ корешковъ, упругихъ листовъ и мѣлкихъ корней съ другою подобною ей за одно счисается, и пошому, хотя несправедливо, *козлова борода* называется. *Настоящая же козлова борода* есть *Aira canescens* ш. е. собачья трава пырей. Овцы ошипываютъ съ сего овечьего пырея одни только листья, а стволъ оспавляютъ. Ум-

ные

ные овчары, гоняющіе стада по низменнымъ и высокимъ пашвамъ, учреждающъ такъ, чтобъ въ дождливую погоду, когда низменности налишы водою, или вообще для овецъ опасны, гонящъ ихъ по высокимъ мѣстамъ, для пріисканія на оныхъ овецей травы, или въ случаѣ, когда оной немного, гоняющъ ихъ упрямъ по росѣ, счишая доставлять тѣмъ овцамъ лѣкарство или предохранительное средство отъ загниванія въ желудкахъ ихъ корму; почему нужно сухія мѣста оною обсыпать. *Линней* повѣствуетъ въ III. Части der Abhandl. der Stockh. Acad. объ этой травѣ слѣдующее: въ большомъ Карлсенѣ мало иныхъ травъ во всемъ его Аллварѣ, кромѣ этой, которая едва примѣтна, почему и считающъ сію каменистую гору голою и бесплодною. Вокругъ оной къ берегу расшетъ высокая и добрая трава; однакъ овцы ходящъ ежедневно на Аллварѣ, отбѣдающъ на ней, не прикасаясь къ высокой травѣ по морскому берегу, или топчущъ оную, ибо онѣ по вкусу вѣдающъ избирать, что для нихъ здоровѣе. — 2) Красной пырей съ полукруглымъ стволѣмъ и мохнатыми цветочными черешками, красная козловая борода, Hart-Schwingel, Festuca rubra у *Линн.* Расшетъ тамъ же, гдѣ и прежній родъ находится. Отъ онаго различивуетъ главнѣйше космашыми сво-

ими черешками цвѣтучной кисти и видомъ сѣвола, которой съ одной спороны круглѣ, а съ другой плоскѣ. Также и ростомъ онѣ нѣсколько больше, имѣютъ листы нѣсколько шире, и когда сѣмяна его спѣютъ, получаетъ красный цвѣтъ. Когда трава сія еще молода, овцы ѣдятъ оную очень охотно. 3) Жесткой пырей съ гладкими колосками и щетинистыми листьями, *kleiner Hart-Schwingel*, *langstielliger Borsten-Schwingel*, *Festuca diriuscula* у Линн. Находится на сухихъ лугахъ и по другимъ сухимъ мѣстамъ. Корневые листы у него щетиною, или какъ нитки, бороздчаты, а листы на сѣволахъ плоски и правянисты. Овцы и эту траву любятъ, только когда она молода. 4) Луговой пырей, коего колоски въ разширенной кисти винтомъ извернуты, *Festuca elatior* у Линнея. Трава эта составляетъ у насъ лучшій и здоровѣйшій кормъ лошадямъ и рогатому скоту. Для овецъ сѣно изъ ней ядрено; должно оную очень молодую косить. Растетъ на тучныхъ лугахъ въ сообществѣ съ луговымъ овсомъ, съ которымъ можно оную наравнѣ посѣвать. На щощихъ неплодныхъ лугахъ бываетъ и она щоща; многіе годы длящейся корень ея выпускаетъ листы аршина въ два вышиною, широкіе на поверхности, съ глубокими бороздками, сверху нѣсколько мохнатые, а снизу глад-

гладкіе. Кисть не рѣдко бываетъ въ пя-
денъ длиною, почти односпоронняя, и
не очень разширена. Колоски соспоянѣ
большею часію изъ пяпи, семи и
девяти цвѣшочковъ. Сѣмена шемноваты.
Сначала сжапою бывающая кисть ма-
ло по малу разширяется острыми угла-
ми и начинаетъ снизу разцвѣпать, при
чемъ колоски очень красиво сами въ се-
бя подобіемъ винта завертываются. Цвѣ-
шетъ въ началѣ весны, и еще въ Авгу-
стѣ. Собираніемъ сѣменъ нѣтъ особли-
вой нужды спѣшитъ пошому, что они
не легко обваливаются, а держатся на
спволѣ, пока оной засохнетъ.

Роды пырею съ кистью, на обѣ сто-
роны простирающеюся, слѣдующія: 1)
Стелющейся пырей, коего колоски безъ
остей, и меньше сосудца, гладкой ов-
сяной пырей, *niedriger glatter Haber-Schwin-
gel*, *festuca decumbens* у Линнея. Расцветъ
по выеокимъ и сухимъ мѣстамъ, въ по-
ляхъ и лѣскахъ, но находясь не во
множествѣ; спволъ его прилегаетъ, а
цвѣшочная кисть спойнѣ прямо, коло-
ски яйцеобразны и безъ остей. Родъ
эшой сославляетъ добрую и сладкую
праву, и занимаетъ широкія большія
дернины.

2) Манной пырей съ вѣтвистою
кистью и кругловатыми плоско сидя-
щими колосками, манная трава,
утячья трава, небесная роса, шлен-

ско-срацинское пшено, Schwaben-Gras, Milthau, Himmels-Thau, Festuca fluitans у Лин. Gramen aquaticum fluitans multiplici spica, С. В. Р. Gramen mannae esculentum. Сію траву не должно смѣшивать съ кровавою, перстообразною Фенхельною правою, которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называется дикою манною правою, Wild-Manna-Gras, и проч.

Посѣвъ этой травы, главнѣйше для ея сѣменъ, одобряемъ былъ въ претѣй главѣ сей Части подъ буквою О. а здѣсь еще, какъ и въ помянутомъ мѣстѣ, предлагается за весьма добрую, скошу пріятную, кормную траву, поелику надлежитъ въ число пѣхъ немногихъ злаковъ, кои на болописныхъ и низкихъ лугахъ сосавляютъ сладкій кормъ. Но не должно думать, чтобъ она могла расти только на мѣстахъ показаннаго свойства: она растетъ и на умѣренно влажныхъ и никогда подъ водою не бывающихъ мѣстахъ, когда ее посѣяшь. Однакожъ и тутъ опличается трава эта отъ многихъ другихъ, что и по созрѣніи сѣменъ сосавляетъ скошамъ пріятный и небезсильный кормъ, такъ что оную должно уважать, яко преподлѣзнейшую изъ травъ вообще для чловѣковъ и скошовъ.

О собираніи и прѣуготовленіи сѣменъ ея къ поваренному употребленію, сказано будетъ во второй половинѣ сего

го сочиненія въ IX Часпи, II главѣ. Но прѣуговореніе сѣменъ не всюду одинаково, почему опишу я здѣсь предвари-тельно одно средство, по которому сія манна получаетъ очень хорошій на-ружный видъ, и потому можешь учи-нена бышь торговымъ товаромъ.

Послѣ того, какъ собранныя сѣмена будутъ сушены двѣ недѣли на солнцѣ, или при недѣли въ прохладномъ мѣстѣ, высыпаютъ ихъ въ сду-пу, переложивъ соломою или тростни-комъ, и потомъ толкутъ умѣренно де-ревяннымъ пескомъ, чтобъ сошла луз-га; послѣ спалываютъ и отъ всякаго сору очищаютъ. Потомъ высыпаютъ еще разъ въ сду-пу, пересылая слоями сушеными цвѣтками, ноготки называе-мыми, или яблоновымъ, или лѣщиновымъ лискомъ, и до шѣхъ поръ толкутъ, какъ черная кожа скопиръ, а крупа получишь лоскъ свой. Ноготки присово-купаютъ нѣчто къ цвѣту. Когда крупы свой лоскъ получаютъ, тогда вѣяніемъ, смѣшаніемъ и спалываніемъ начисто вычищаются, и къ продажѣ будутъ го-товы. Называютъ крупы сіи Польскою или Франкфуршскою манною, потому что оныхъ множество привозятъ на продажу изъ Польши и Франкфурта, что на Одерѣ, въ разные мѣста. Понинѣ онѣ еще такъ дороги, что Берлинская меца, или полчешверика, обыкновенно по-
Ф 5
ку-

купаются по 12 Прусскихъ грошей. Но могла бы она сойти въ 8 грошей, есѣли бы начали оную разводитъ по сѣвомъ, а чрезъ то срацинское пшено и сего учинили ненужными. А хопя она при умножившемся сѣвѣ цѣною бы и спала, но Хозяева ни отъ какого плода столько выгодъ получить не могушъ; потому что манной пырей и по снятїи сѣменъ составляетъ еще очень питательное и вкусное сѣно. Въ сушеной эшой шравѣ еще та особливоесть, что охотно ѣдятъ ее и свиньи. Но удобнѣе она для нихъ тогда, есѣли зимою рѣзашъ оную рѣзкою, обваривашъ, и либо одною, или смѣшавъ съ отрубями или дробинами свиней кормитъ.

ж) *Гладкая вислая перловая трава, пырей овсяной горной, красивая трава, glatte hangende Perl-Gras, Schön-Gras, Gramen montanum avenaceum C. B. Melica nutans у Линнея.* Растетъ на сухихъ мѣстахъ и по перелѣскамъ, а цвѣтитъ отъ Мая до Октября. Долголѣнный корень ея отпускаетъ многіе отростки. Сволъ ея четвероуголенъ, въ семь и 14 вершковъ вышиною, съ широкими листьями и внизъ висящими колосками. Кругловатыя сѣмена ея имѣютъ съ одной стороны бороздку. Этого родъ шравы всякому скоту прїятенъ, и заслуживаетъ посѣвъ для овечьего сѣна, въ особливости на возвышенностяхъ и горахъ,
по-

потому что она овцамъ пріятна и ли-
ствяна. Сего роду травы имѣемъ мы
еще *бахромистую перловую траву*,
Gramen montanum lanuginosum С. В. Она ра-
стетъ на сухихъ песчаныхъ мѣстахъ,
и также имѣетъ долголѣтний корень.
Отличается отъ предшедшаго роду на-
ружною лузгою нижняго или большаго
цвѣтка, копорая окружена волосяною
бахромкою; внутренняя лузга гораздо
короче и разколоша.

- з) *Собачья трава*, *Schmiele*, *Aira*. Между
сими опродіями пырея есть роды, кои
къ лучшимъ кормнымъ злакамъ причи-
слятъ должно: 1) *Водяная собачья*
трава съ тупыми сверхъ мѣшечка вы-
давшимися лузгами; *малой водяной*
шишковникъ; *водяное просо*; *сладкая во-*
дяная трава; *Wasser-Schmiele*, *Klein-Milisch*,
Queller-Gras, *süßer Milisch*; *Aira aquatica* у *Лин-*
нея. Г. Шреберъ говоритъ, что трава эта
скошамъ очень пріятна; а Г. Гледитшъ
пишетъ объ ней слѣдующее: Расшѣніе
это почти изъ всѣхъ Нѣмецкихъ зла-
ковъ по виду своему прекраснѣйшее,
оная соспавляетъ сладчайшее и пита-
тельнѣйшее изъ всѣхъ сѣнъ, съ бо-
лошъ снимаемыхъ, копорому она обще
съ водянымъ шишковникомъ, роа *aquat-*
са у *Линнея* (трава эта описана подъ
буквою б), придаетъ собственно силу
и преимущество. Отличается же это
водяное просо по слабымъ своимъ ли-
ствамъ,

спкамъ, разшаращенной цвѣточной кисти и гладкимъ шупымъ, ш. е. безоспншымъ лузгамъ, кои длиннѣе сосудовыхъ пузырьковъ, въ коихъ сѣмена. Находима она по всѣмъ мокрединнымъ низменностямъ, гдѣ есть холодные родники и малые ручейки текутъ, на самой шинистой, тучнѣйшей и солянистой пошвѣ, гдѣ бываетъ она, не взирая на ростъ свой, отъ четырнадцати вершковъ и въ аршинъ слишкомъ, сладоспна и сочна; гдѣ же расстетъ она между другою густою правою, бываетъ низка и пропадаетъ, когда лугъ глубокими рвами осушенъ будетъ. Должно сѣять оную на шаковыхъ лугахъ, кои во влажности содержимы быть могутъ, и припомъ должна она только единственную праву составлять, безъ всякой смѣси съ другими. 2) *Пашенной пырей съ остистою и шерстистою лузгою*; высокая пашенная собачья трава; *пыхъ*; *Acker-Schmiele*, *Acker-Strauß-Gras*, *Acker-Wind-Halm*; *Gramen segetum panicula arundinacea*, С. В. Р. *Aira cespitosa* у *Линнея*. Этотъ родъ можно признавать по плоскимъ листьямъ, разширенной цвѣточной кисти и лузгамъ, кои снизу шерстисны и снабжены короткими прямыми остями; корень ея долголѣпенъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ, а расстетъ на плодовиныхъ лугахъ и на влажныхъ пашняхъ. Она разпространяется и укушается

щается сильно на доброй землѣ. Отъ сего луга дѣлаются не гладки, и кажутся какъ бы крошовыми кочками покрыты; однакожъ шерпять ее въ лугахъ, пошому что права эша лучшій кормъ для рогатой скошины составляетъ. Овцамъ не составляетъ она лучшаго сѣна, когда будетъ толстобыла; для оныхъ въ недостаткѣ другихъ правъ должно косить ее на сѣно еще молодую: ибо овцы по парамъ дѣлать ее, пока она не вымечетъ еще кисшей своихъ. Гдѣ на самородныхъ лугахъ права эша подѣлается слишкомъ высокіе холмочки, должно оныя вспахать и подвергнуть обмѣнному земледѣлю; ибо когда холмочки будутъ не равной вышины, произойдетъ отъ того затруднительное и не чистое кошеніе травы, и шже самое въ стрѣбаніи сѣна. Когда траву сѣю косить на сѣно лошадямъ, должно производить то, лишь начнешъ кисить изъ ноженъ своихъ вымешиваться. А естли она устареетъ, ощи ея вшыкаются лошадямъ въ десны, что имъ боль приключаетъ; также скашивающа изъ нихъ за скулами къ задѣ челюсти очень тугіе шарики, подобные тѣмъ, каковыми гусей на убой опкармливаютъ, кои лошадямъ приключаютъ боль, возпаленіе и охоту къ дѣлѣ очень уменьшаютъ. Когда необходимость кормить ихъ рѣзкою изъ соломы, въ кош-

шо-

шорой много сего пуху, должно онымъ почасу изъ рта вычищать таковыя шарики. Производишь эшо конюхъ, опворотивъ ей языкъ на одну сторону, и державъ рукою такъ крѣпко, чтобъ она его назадъ не опшнянула; пошомъ указательнымъ пальцомъ шупаетъ въ показанномъ мѣстѣ, и шарики вынимаетъ вонъ; послѣ шожъ учиняетъ на другой споронѣ рта: эшо должно производить еженедѣльно по разу.

Пухъ эшомъ въ хлѣбѣ должно щипать еще вреднѣе, нежели шомъ родъ справы, конорой пахари называютъ *кистеръ* или *кастеръ*, Ботаники же *tritium repens*, *glumis mucronatis aristatissime aristis spicula brevioribus*, а Господинъ Шреберъ *простымъ кистеремъ* или *пшеничнымъ кистеремъ*; смотри въ его описаніи кистера (*Beschreibung der Quecke*) съ рисункомъ, снятымъ съ напуры, напечатаннымъ на Нѣмецкомъ языкѣ въ Лейбцигѣ 1772 года. Пашенный пухъ перероспаетъ хлѣбъ, а особливо въ мочливыя весны; хлѣбъ съ онымъ отъ сильныхъ дождей валяется, не можетъ подняться, и произходишь, что въ колосахъ полетшаго хлѣба ни одного зернушка не бываетъ. На низменной черноземной пошвѣ, настоящій домъ сего пуху, и въ нынѣшнемъ (1784) году всѣ пшеничныя нивы онымъ покрыты. Пшеница въ половинѣ Іюня казалась бытъ отъ онаго свободною,

ною, или по крайней мѣрѣ было онаго въ ней мало; но какъ въ нѣкошорыхъ мѣстахъ съ конца Мая пошли почти черезъ день дожди, пухъ шамъ одолѣлъ, и довелъ пшеницу на многихъ нивахъ къ повалѣнью, пока она еще не зацвѣтала. Кпо незнающъ въ злакахъ, не можетъ кистеря опличить отъ пшеницы, пока они оба изъ трубокъ своихъ еще не вымешались: но и тогда еще есть между ими опличительной признакъ шомъ, что верхній и не такъ широкій листъ кистеря оканчивается длиннѣйшимъ остриемъ. По сему признаку можно оба растѣнїя еще съ самаго начала весны различить, и кистеръ заблаговременно выполоть, если сѣвъ пшеницы не великъ, а людей довольно. Полоніе кистеря очень награждается, ибо впрочемъ, когда послѣдуетъ погода помянушаго свойства, вся пшеница погибаетъ, такъ что и сѣмень не возвращаетъ. Выпосланный же кистеръ должно шомчасъ сушишь и опкладывать къ лучшему скопскому корму; ибо корни его въ особливости сладки и питательны. 3) Сѣрая собачья трава съ щетиннистыми листьями и цвѣтчною кистью съ оболочкою; сѣрая козлова борода; Grauschmiele, grauer Bocksbart, Gramen fol. Junceis, radice Jubata C. B. P. Aira canescens у Линн. Корень ея однолѣтній. Все растѣнїе видомъ блѣдно; листья на немъ

немъ волосисшы и щешинновашы, а верхній обѣмлетъ собою кисъ снизу, какъ бы ножны. Ость на лузгахъ снизу толще и темна, по срединѣ имѣетъ малыя зазубрины, а къ верху тонѣе и бѣловата. Кисъ, пока еще не разцвѣшетъ, трубочкообразна. Распѣніе это, по извѣстію Г. Гледитша, такъ называемое настоящая козлова борода, есть въ среднемъ Маркѣ Брандебургскомъ, коего самые молодые листки овцамъ очень пріятны; оное отъ деревенскихъ жителей обыкновенно за одно съ прочими родами смѣшивается. Можно засѣвать онымъ плодовиные пески и сухія поля въ пользу овецъ.

- и) *Пухъ*, *Strauß-Gras*, *Agrostis*. Между множайшими родами этой травы слѣдующіе въ нѣкоторомъ отношеніи заслуживаютъ одобреніе: 1) *Тростникообразный пухъ*, коего наружная лузга шершава, снабжена короткою извитою остью; темная песчаная собачья трава; тростистый пухъ; *Sandrohr-Schmiele*, *Schilfsiches-Strauß-Gras*; *Agrostis arundinacea* у Линн. Расстетъ по сухимъ облогамъ, а особливо множественно въ лѣсахъ, имѣетъ многолѣшый корень, и около двухъ аршинъ безъ четверти вышиною стволъ; жесткіе, жирокіе, проснниковые листы и кисъ, такимъ образомъ стянушую, что она почти колосу уподобляется; но одна часть ея, кошорая цвѣшетъ, разши-

ширятся, и послѣ опять сжимается. Калмыки плещушъ изъ эшой травы пол-
спи, и накрывающъ оными свои кибит-
ки. Г. Линней замѣшилъ, что спадо
козъ на одномъ островѣ гошова было
помереть съ голоду, нежели Ъспъ пра-
ву эшу. Напрошивъ Калмъ щипаешъ
оную къ шѣмъ растѣніямъ, которыми
деревенское Хозяйство поправлено бытъ
можетъ, и повѣснвуетъ, что оное изъ
самыхъ листовянисныхъ и мягкихъ ро-
довъ травы, и что скошы, а особливо
лошади, Ъдяшъ оное съ великою охотою.
Онъ прибавляетъ еще къ тому: имѣетъ
оное предъ многими другими злаками
то преимущество, что надлежитъ къ
рано поспѣвающимъ весеннимъ растѣні-
ямъ, а при томъ въ самую глубокую
осень зелено и свѣже; однако въ первомъ
году по посѣвѣ косить его не можно.
Должно послѣднему писателю ошдать
справедливоси, когда онъ говоритъ,
что лошади траву сѣю Ъдяшъ охотно,
хотя впрочемъ кажется она бытъ не
изъ самыхъ пишательныхъ кормныхъ
злаковъ. Но это должно лишь о шѣхъ
мѣстахъ разумѣть, гдѣ лучшихъ корм-
ныхъ злаковъ мало, или вовсе нѣтъ,
или гдѣ въ началѣ и концѣ лѣта оныя
ошчаси еще не выросли, или долго
не ошросаютъ, тамъ можно растѣніе
это съ выгодною сѣять. 2) *Волосистой*
пухъ, съ шилообразными, равной длины,
Часть III. Отдѣл. 2. Х ще-

щетилистыми и подцвѣченными со-
судцовыми пузырьками; волосистая
собачья трава; Haar-Schmiele, Haar-Strauß-
Gras; Agrostis capillaris у Линн. Расплетъ
всюду на легкихъ и песчаныхъ мѣстахъ.
Стебель ея расплетъ прямо, одинакъ,
отъ десяти до 14 вершковъ вышиною;
цвѣточная кисть сначала бываетъ сжа-
та, во времяжъ цвѣтенія расширяется,
и послѣ опянь сжимается, очень тонка,
и состоишь изъ многихъ тоненькихъ
волосообразныхъ вѣтвей. Цвѣтки бы-
ваютъ иногда зелены, обыкновенно
красноваты. Поелику траву сию бьютъ
всѣ скопы охотно, на худощавыхъ зе-
мляхъ расплетъ она густо и высоко, и
мохъ раски не допускаетъ; по вѣ по-
слѣднемъ обстоятельству заслуживаетъ
она въ особливости посѣвъ на пашковыхъ
лугахъ, на которыхъ мохъ травы одо-
лбваетъ, и истребить его иначе не-
льзя. Въ этомъ же намѣреніи можно се-
сѣять въ смѣси съ желаемымъ родомъ
травы.

- 1) Скотская трава, муравка, Роа. Се-
го поколенія имѣемъ мы очень хоро-
шія отродія, кои щипаемъ къ лучшимъ
кормнымъ злакамъ, и въ числѣ которыхъ
подъ лицерою 6. выхваленный водяной
шишковникъ или водяной пырей, Роа
aquatica, занимаетъ первое мѣсто. 1) Трех-
цвѣтная шерстистая скотская тра-
ва, средняя муравка, обыкновенная
ма-

малая трава, Rispen-Gras, mittleres Vieh-Gras, Klein Gemein-Gras; Gramen pratense paniculatum medium C. B. P. Poa trivialis L. Poa Hall. Hist. 1464. Трава эша хопя находишся на всякихъ пошвахъ земли, но въ особливости на сухихъ каменистыхъ суглинкахъ и горисныхъ мѣстахъ, также на самыхъ пашняхъ, на которыхъ захватываетъ большія круговеньки. Корень ея многолѣшенъ; стебель круглъ, прямо растетъ, вышиною въ пядень, рѣдко вершковъ въ шесшь. Листы выходятъ во многомъ числѣ изъ корня кучею, корешки, очень остры и на концахъ шиломъ. Кисть на ней больше густа, нежели рѣдка; обыкновенно выходятъ по двѣ, рѣдко по три отрасли изъ общей почки. Колоски ея зелены, пурпуровы, лоснящіеся, снизу шерстисты, и состоятъ обыкновенно изъ трехъ цвѣтковъ, иногда больше. Трава эша сладка и пишательна, всѣ скопы бдятъ ее охотно, и овчары выбираютъ луга, оною наполненные, къ заготовленію овамъ сѣна. Почему можно возвышенные луга обсеивать оною на сѣно для овецъ.

2) *Многоцвѣтная шерстистая скотская трава, узколистная мурава, луговой пырейникъ. vielblüthiges wollichtes Rispen-Gras, schmalblättriches Vieh-Gras; Gramen pratense panicul. majus angustifolium C. B. Poa angustifolia у Лин.* Растетъ всюду на сухихъ лугахъ и пашняхъ;

цвѣтешъ въ Маѣ. Ползучій ея корень отпускаешъ много отпрысковъ. Спволъ толстъ, кругловатъ, и бываетъ около аршина съ четвертью вышиною. Листы шверды, узки и свернушы. Кисть стопишъ всегда разширенною, а малые зеленые, или темноваго-красные съ бѣлымъ, внизу шерстистые колоски состояшъ обыкновенно изъ четырехъ, также трехъ и пяти листковъ. Эшотъ родъ съ предшедшимъ совершенно сходственъ: оба они равной доброты, а эшотъ еще лучшимъ щипаютъ, и отъ славнаго Г. Профессора *Бекмана* обще съ водянымъ пырейникомъ (*Poa aquatica*) и манною травою (*festuca flutians*) въ особливости выхваляются. Г. Докпоръ *Бемеръ* пишешъ, что Англичанами сполько выхваляемая, и названная у нихъ *Бирдграсъ*, есть не иная, какъ самое эшо расшѣе.

А какъ Англичане споль много объ эшой травѣ говоряшъ славнаго, и шѣмъ возбудили вниманіе нѣкоторыхъ нашихъ Хозяевъ, хочу я заимствовашъ извѣстіе о разводѣ оной изъ Прусскаго Домоводственнаго Садоваго и Историческаго Календаря на 1773 годъ, котораго предписанія могушъ бытъ способны къ посѣву многихъ родовъ травъ.

Нѣкоторые изъ Англинскихъ домостроишелей получили сѣмена эшой травы, подъ названіемъ *Бирдграса*, изъ Виргиніи, и размноженіе оной въ нѣко-
шо-

шорые годы опмѣнно возвысилось. Пре-
жде, нежели узнали настоящую прилич-
ную пошву земли, въ которой расшѣніе
это какъ свои полныя преимущесшвен-
ныя свойства получишь, шакъ и при
своемъ обыкновенно богатомъ урожаѣ
ошашься можешь, были многіе удачныя
и неудачливыя опышы. Сначала посѣ-
яли сѣмена на мокрединѣ, шущъ расшѣ-
нія получили блѣдной и желшозеленой
видѣ, не простирая скорого роста сво-
его по обыкновенію. Когда обсѣяли пе-
счаное и кремнистое мѣсто, а при-
шомъ и горячее, росла эта шрава силь-
но, разпросшерла корни вокругъ себя
очень скоро, и получила темнозеленый
прямо лоснящійся цвѣтъ. Уже опъ пер-
ваго высѣву въ Англіи около 9 золош-
никовъ въсомъ въ концѣ Марша, произ-
вели сѣмена много сильныхъ кустовъ,
много шравы, и въ Окшбрѣ двенадцать
фуншовъ въсомъ спѣлыхъ сѣменъ. Тра-
ва въ Іюнѣ мѣсяцѣ была ростомъ въ
аршинѣ съ чешвертью, и въ шри дни
по скошеніи, когда высушена и свѣшена
была, свѣжаго сѣна съ зернами съ про-
сшраншва земли въ десяшь рушъ сня-
шо 30 пудъ. Послѣ этой скошки шра-
ва опросла шпорично въ аршинѣ слиш-
комъ, и тогда дали на ней вызрѣшь сѣ-
менамъ. Кшо съ этою шравою, равно
и съ домашними нашими добрыми лу-
говыми злаками, производилъ рачишель-

ные опыты, вѣдаешъ довольно, что нѣкоторые изъ нихъ остаются всегда зелены; и когда скошены будутъ съ сѣменами вполы, или большею частью выпѣвшими, опять опрашающъ и къ кошенію удобны дѣлаются. Это общепольсельство въ разсужденіи кормныхъ злаковъ замѣчаніе заслуживаетъ.

Бирдграсъ сначала посѣву бываетъ слаба, и кажешся рѣдко распушею; но когда подмѣшатъ въ нее половину овса, мѣрою по содержанію пашни, то послѣ растѣнія будутъ тѣмъ толще, выше, и обраснутъ такою густою облогою, что сквозь оную, кромѣ влаги, почти ничто проникнуть не можешъ. Когда погода будетъ тепла и перемѣшана съ дождями, то изъ свѣжихъ коленцовъ, даже въ самомъ низу, производящъ стебли, такъ что по опыту *Г. Рока* съ полудесятины земли съ небольшимъ можно получить иногда сѣменъ по осьми бочекъ. Когда многія коленица на сѣволахъ земли коснутся, изъ коренныхъ сѣволовъ показывающія новыя отростки, такъ что въ одномъ кустѣ при раздѣленіи въ пересадку оказывающіяся по двадцати и 30 сѣволовъ. (Все это бываетъ равномерно и съ большею частью нашихъ злаковъ, когда ходишь за оными шаковымъ же образомъ.) *Бирдграсъ* совсѣмъ не должно косить въ дождливую погоду, потому что опчаспи
перъ

первые лучшіе корневые листы этой травы, такъ какъ у другихъ травъ, не пропадаютъ, частью же для того, что въ это время кушмы и сиволы большею частью умножаются, и растѣніе до самаго созрѣнія сѣменъ зеленѣется, отъ чего трава эта остается столько полезною, и урожай сѣменъ ея предъ другими почти невѣроятно великъ. Землю подъ нее должно хорошо ухапать и чисто выборонить, такъ какъ бы подъ ямень, и сначала, пока растѣнія не уклочатся, отъ сорныхъ травъ чисто выпалывать.

Не худо при посѣвѣ прежде высѣять половину мѣроу ямению или овса, послѣ заскородить, а потомъ уже травныя сѣмена разсѣять. Между обоими родами сихъ яровыхъ хлѣбовъ молодая растѣнія укрѣпляются хорошо, и расшутъ такъ, что хлѣбъ обгоняютъ. Какъ скоро по посѣвѣ земля нѣсколько обсохнетъ, укапываютъ оную нѣсколько кашкомъ, кромѣ легкихъ песчаныхъ мѣстъ. Песчаная и кремнистая земля къ посѣву этой травы лучшая, а по болотнымъ и мокрымъ мѣстамъ урожай ея плохъ. На песчаныхъ поляхъ должно и положеніе мѣста брать въ замѣчаніе, нѣтъ ли въ ономъ какихъ исключеній, по которымъ одно мѣсто предъ другимъ для этой травы лучше. — 3.) *Пятицвѣтная гладкая скотская трава, простая скотская*

травѣ; *fünfbliithiges glattes Rispēn-Gras*, *Wiesen-Rispēn-Gras*, *gemein Vieh-Gras*; *Gramen pratense paniculatum majus latiore folio* C. B. *Poa pratensis* у *Линнея*. Этого рода отъ обоихъ предшедшихъ трудно отличить. Ползучіе корни опускающъ много отростковъ. Кругловатый стволъ вырастаетъ въ аршинъ съ четвертью, и на нижней части къ землѣ погнутъ, но отъ загибу выправляясь идетъ вверхъ прямо; въ осязаніи нѣсколько косматъ. Листы по длинѣ своей имѣютъ углубленіе. Кисть очень разширена, а цвѣточки на ней зеленые, малые. На пучной и плодovitой землѣ прораствѣ бываетъ гораздо мягче, сочиве и выше, нежели на возвышенныхъ лугахъ. Надлежитъ въ число нашихъ лучшихъ кормныхъ злаковъ. 4) *Однолѣтняя скотская трава, малая бѣлая пуховая трава*; *jähriges Rispēn-Gras*, *Sommer-Vieh-Gras*; *Poa annua* у *Линнея*. Растетъ на большей части не очень высокихъ и сухихъ мѣстахъ, равно и по заливнымъ лугамъ очень обыкновенно. Корень ея продолжается одно только лѣто. Стволъ растетъ косо, не круглъ, но больше сплюснутъ. Листы имѣютъ короткіе и гладкіе, кисть разширяется подъ прямыми углами. Колоски зеленые, на концахъ бѣлы, и состоятъ изъ трехъ или чешырей цвѣточковъ. Всѣ скоты любятъ сію траву. 5) *Шестилѣтняя*
скот-

скотская трава съ широкимъ стелющимся стволѣмъ, горной пырей; Berg-Vieh-Gras; Poa compressa у Линнея, Gramen murgum radice repente С. В. Трава эта расстилѣ по сухимъ дорогамъ, на возвышенностяхъ, даже по каменному строенію и сухимъ валамъ, цвѣшетъ въ Маѣ и Іюнѣ, и имѣетъ корень многолѣтний. Спволъ у нее не круглъ, но сплюснутъ, и до половины лежитъ на землѣ. Киспъ густа и наклонена на одну сторону. Колоски ея темнокрасны; молодые листы мягки и пшпашельны. 6) Четвероцвѣтная луковистая скотская трава, малая луковая трава; vierbluthiges bollenartiges Rispen-Gras, kleines Zwiebel-Gras, Eschalotten-Gras, Lanchel-Gras; Poa bulbosa у Линнея. Находима бываетъ во множествѣ по облогамъ, большимъ дорогамъ и въ деревняхъ на сыпучемъ пескѣ. Весною выходитъ рано, а лѣтомъ пропадаетъ. Какъ скоро снѣгъ сойдетъ, оказываешь она по мокрединамъ, и вылезаетъ сначала какъ иголки. Въ то время укрываетъ она землю очень, пока еще другія травы не выдутъ. Мѣспа, ея заросшія издали, кажутся молодыми хлѣбными всходами, и можно бы ее счесать за пшеницу, когдабъ только листы ея не были гораздо тонѣе. Листы растутъ изъ корня, сжавшись куспочкомъ, почему сходствуютъ къ луку. Спволъ бываетъ кругловатъ и око-

ло шести вершковъ вышиною; кисть на немъ разширена, бирюзоваго или голубоваго цвѣту, лузговые мѣшечки съ осѣми, и содержащѣ по четыре или только по три, равномерно осеи-
стыхъ, зеленыхъ съ бѣлою обводкою цвѣточковъ. Нѣкоторыя изъ нихъ вре-
менемъ вырожающа, и представляющѣ
длинные, изогнутые синеватыя ке-
гли. Эпошъ очень доброй кормной злакъ
въ особливости способенъ къ поѣву въ
смѣси съ другими, кѣ только не разпо-
ложитъ съясъ ее одну на сѣно для овецъ.

к) *Тимофеева трава*; *Timotheus-Gras*,
Wiesen-Eisch-Gras; *Phleum pratense* у *Лин-*
нея. Описание признаковъ этой травы
не нужно, для того что нынѣ оную
множесивенно съясъ начали, а потому
она во многихъ мѣстахъ знакома; не
знающіе же могутъ оную опѣискать,
взявъ прибѣжище къ *Линнеевой Бота-*
никѣ. Англичанинъ *Г. Рокъ* превознесъ
хвалу этой травы, и продавалъ намъ
сѣмена ея за родъ кормнаго злаку со-
всѣмъ новаго, изъ Америки выписаннаго;
но вскорѣ оказалось, что она у насъ
домашняя, и на мокрыхъ лугахъ ра-
стетъ не въ рѣдкость. Трава эта сы-
скала бы на себя больше охотниковъ,
когда бы *Г. фонъ Минхгаузенъ* въ сво-
емъ домоводствѣ оную одобрилъ не про-
пустилъ. *Г. Надворный Совѣтникъ Гле-*
дитшъ похваляетъ оную, а *Г. фонъ Гал-*
леръ

лербъ пишетъ объ ней сіе: Распѣніе это въ разсужденіи великаго своего росту и своихъ лисповъ, по легкости своего разведенія, прочносипи и пріятному вкусу, различныхъ особливостей, ему свойственныхъ, и преимуществъ, къ посѣву одобреніе заслуживаетъ. Распѣтъ она не шокмо по мокрымъ лугамъ, но и по мшаринамъ, на коихъ рѣдко опричь негодныхъ шравъ видимо бываетъ, и Г. Шреберъ напоминаетъ, что хотя стволы и листья ея не прошивны, скопу не вредны, но нѣсколько жесшки. Лошади и волы ѣдятъ ихъ лучше, нежели мѣлкіе скоты. Нѣкоторымъ же Хозяевамъ на ихъ болописныхъ лугахъ для того посѣвъ этой шравы одобрятъ должно, что она зыбкія и болописныя мѣста, по кошорымъ ходитъ не можно, своими часто соплетающимися корнями связываетъ, укрѣпляетъ, и учиняетъ возможными косить по онымъ. Въ равномъ же намѣреніи не давно Г. Профес. Боровски въ своемъ Алманажѣ предложилъ родъ шравы къ связанію и укрѣпленію трясинъ. Онъ называетъ ее *трясинная кормная трава*, *Bruch-Futter-Gras*, *Scirpus Dichotomus*, о кошорой пишетъ слѣдующее: этимъ родомъ шравы, коя въ особливости полезна къ связыванію и укрѣпленію трясинъ, сдѣлалъ первый опытъ въ 1770 году Краузъ въ Берлинѣ. Одно распѣніе, по извѣстію его, разши-

разширилось въ полгода на чешыре фуша; корни проникли на 3 фуша въ глубину. Лисшы ея, подобно осокѣ, бывающѣ въ полшора фуша длиною, толсты, ни тупые, ни оспрые, подобны нашей осокѣ. — Для рогатаго скоша составляетъ она опмѣнной кормѣ, и можешъ чрезъ три года трясину шакѣ укрѣпишь, что можно будешъ по оной на лошадяхъ ѣздишь. Родѣ этой травы находишся на оспровѣ Мадагаскарѣ, также подѣ Очаковымъ (нынѣ крѣпосью С. Николая), въ Таврикѣи, во многихъ округахъ множественно. Желаето, чѣтобъ съ оною произвели множайше и рачительнѣйше опышы, дабы по оказавшимся дѣйсвительнымъ опѣ ней пользамъ посѣвъ ея можно было начать всюду, гдѣ нужно. — Есѣли бы этой травы Ботаническихъ признаковъ показано было больше, можно бы тогда сказать, что нѣтъ ли оной у насъ и дома.

Можно бы изъ нашихъ домашнихъ злаковъ еще нѣкоторыя описать здѣсь, но кои не надлежатъ въ первую степень; однакожъ для Чистателей довольно и описанныхъ лучшихъ кормныхъ злаковъ, ко избранію для посѣву на лугахъ своихъ одного рода или многихъ въ шаковомъ разположеніи, чѣтобъ каждому роду скоша лучшее сѣно впредь доспавишь, и слѣдственно къ приращенію своего Хозяйства имѣшь самое неопорочиваемое сѣно какъ
для

для овецъ, ягнятъ, барановъ, такъ лошадей, рогатого скота и шблятъ. Сначала покажешь трудно снабдить себя сѣменами той или другой желаемой травы, однакожъ большая часть Хозяевъ, луга имѣющихъ, найдутъ на оныхъ нѣсколько изъ вышеописанныхъ злаковъ, съ которыхъ впервыхъ получаютъ сѣмень мало, и могутъ посѣять ихъ въ огородѣ или въ саду, съ нихъ получаютъ уже столько сѣменъ, что можно будетъ обсѣять десяшину или больше.

Ж. Унавоживаніе луговъ.

Ростъ травы къ полученію множайшаго количества сѣна чрезъ унавоживаніе несказанно поспѣшествуется. Къ поправленію же таковому и умноженію травы какъ самородные, такъ художественные луга способны различнымъ образомъ.

Еслили нѣтъ недостапка въ удобожательныхъ средствахъ, тогда разпаханные луга, коимъ слѣдуетъ учиниться художественными, когда земля не слишкомъ тучна, должно такъ унавоживать, какъ пашню, дабы сїи художественные луга нѣсколько лѣтъ сряду выдержашь могли и въ удобреніи остаться.

У кого же самородные луга, на которыхъ навозу запахать не можно, тогда изъ длиннаго соломеннаго навозу для таковыхъ луговъ употребленія сдѣлать не можно. Оной хотя бы и подъ зиму его положить, не перепрѣетъ, а еще задушитъ

шитъ подъ собою травы, и прорастѣнію оныхъ весною запрепятствуешъ. Одинъ только дробной перепрѣвшій коровій навозъ, также свѣжій конскій навозъ, безъ смѣси съ соломою, которой просолоудимы называющъ конскіе яблока или шевяки, могутъ къ сему годиться. Когда же нѣтъ инаго кромѣ широкаго соломеннаго навозу, то вывезши оной и размешавъ на зиму, весною должно будетъ стрессть граблями, что двойной шрудъ сосхавитъ.

Голубиной навозъ, которой подъ изходъ зимы по лугамъ разсыпаютъ, никуда полезнѣе сего употребленъ бытъ не можешъ. Куриный навозъ оказываетъ равную услугу; но какъ онъ свѣжій состоитъ въ большихъ кускахъ, должно оной по сосхожанію земли съ пескомъ или сухою глиною смѣшавъ раздробить, чтобы онъ дробными кусочками по лугу разбросанъ бытъ могъ.

Мыловаренная зола, отъ варенія мыла остающаяся, равномерно известъ, гипсъ, мергель или глина, торфная и каменнаго угля зола сосхавляющъ преизрядной шукъ для луговъ, гдѣ только досхашъ оныхъ можно. Глава о поправленіи земель или смѣшиваніи родовъ земли между собою сюда прилична. *Смотри Хозяина Часть I.* послѣднюю главу. Когда по сему лугъ имѣетъ на прим. глинистую швердую пошву, должно при вспаханіи онаго навозитъ на него нѣсколько песку; это по-
слу-

служишь вмѣсто навозу. Равномѣрное происходитъ, когда рыхлая луговая пошва будешь смѣшана съ глиною и чрезъ то укрѣплена. Таковыя поправленія луговъ посредствомъ смѣшиванія земель въ особливости для всѣхъ мѣстъ преимущественно одобряю всѣмъ, у кого sprawy мало, и пошому въ сѣнѣ шерпашъ недосташокъ.

Во впорой Часпи въ главѣ первой въ Ошдѣленіи б) преподано наставленіе, какъ завести навозной магазинъ изъ разныхъ веществъ, шакже кучи на полѣ, и навозныя сѣнки къ пріобрѣшенію многого навозу; что главнѣйше къ угобженію луговъ ошносится.

Въ помянутой же Часпи Хозяина, и въ той же главѣ писано, что жидкой навозъ, ш. е. гилль, навозная жижа или вода съ скопныхъ дворовъ и конюшенъ, всѣмъ другимъ навозамъ предпочищается, и что Швейцары въ эшомъ давно уже были нашими учителями. Посредствомъ сего гилля не токмо вообще можно праву учинить густораспушею, но и превратить, шакъ какъ сказано шамъ, однокосный лугъ во многокосный, ш. е. что лугъ, кошорой безъ сего унавоженія приносилъ только однажды въ годъ праву, можешь ошъ двухъ до чешырехъ разъ бышь кошенъ, а именно: когда только, по вышеприведенному предписанію, весною и послѣ каждаго скошенія лугу упрыскивашь
оной

оной гиллемъ. Способъ возить гилль и по лугамъ разпрыскивать, описанъ въ шой же главѣ въ Ошдѣленіи 8).

Можно же навозную жижу и другимъ образомъ зимою къ унавоженію луговъ вывозишь, а именно: когда она замёрзнетъ, лёдъ эшошъ разбивается въ мѣлкіе кусочки, и по лугамъ, пока еще снѣги не глубоки, лопашою разбрасывается.

Должно еще въ разсужденіи различныхъ вывозимыхъ шуковъ вѣдашь, что луга, весною заливаемые, не прежде должно угоджашъ, какъ по слишій воды, дабы она не снесла навозу. Гдѣ же луга не заливаются, тамъ еще съ осени унавоживаніе луговъ начинать можно, чтобъ снѣгъ съ навозомъ смѣшался и онымъ втянутъ былъ, что навозу ошмѣнно силы прибавляетъ.

Наконецъ можно возвышенно лежащіе луга унавоживашъ осенью, пригономъ барановъ, коихъ на паствѣ ошкармливаютъ, и въ подвижныхъ загородкахъ или ордахъ содержатъ, шакъ какъ дѣлаютъ то на пашняхъ. Къ сему нужно шолько сначала шѣ луга ошдѣлить, кои больше мохомъ поросли: ибо мохъ на нѣкоторыхъ высокихъ лугахъ находишся шакъ множественно, что ростъ травы съ году на годъ на оныхъ уменьшается. Когда шакъ-вые луга будутъ заниманы подвижными бараными пригонами, мохъ въ первое лѣто шакъ пропадетъ ошъ того, что больше онаго будетъ не видно. Одно шолько
гоня-

гоняніе овецъ на паспву по мшистымъ лугамъ, или выбиваніе оныхъ, можешъ луга ошъ моху совсѣмъ освободить.

3. Выищаніе луговъ отъ моху, кротовыхъ кочекъ и кустарниковъ.

Когда луга зараснутъ мохомъ, по росшъ пшавы на нихъ въ шаковой мѣрѣ удерживается, что по испребленіи моху цѣлою четвертью сѣна будетъ снимано съ нихъ больше.

Многія средства къ освобожденію луговъ отъ моху, какъ то выше упомянуто, чрезъ становленіе на оныхъ овечьихъ пригоновъ.

Всюду же употребительный къ тому способъ прскороженіе луговъ желѣзною бороною, которое до шѣхъ поръ вдоль и поперегъ производишся, пока мохъ весь будетъ раздробленъ, и послѣ бороною сволоченъ въ кучи къ своженію долой.

Когда мохъ сухъ выпасканъ будетъ, можно хранишъ его подъ навѣсомъ, и употребляшъ въ подстилку скошинѣ, что составляетъ для оной зимою теплую и сухую постелю. Можно же онымъ набивашъ шюфяки, подкладываемые подъ постели, кои впрочемъ набивающся соломой и сѣномъ, отъ чего постеля будетъ мягче, и можно будетъ обойтися безъ нижней перины. Въ безлѣсныхъ мѣстахъ можно мохомъ и печи шопить. Г. Гледитшъ пишетъ, что онъ содержитъ дробные угли, и когда мокрой мохъ шон-

кими слоями слой на слой прижашь и по засушеніи оспрымь ножемь въ длинные куски изрѣзашь, шо оной легко съ ними зажигается, и производить прочный пыль, даже въ золѣ продолжающійся; зола же яша не шокмо сама по себѣ добра, но и годна въ пошашь.

Выше упомянутые разные роды навозѣ, какъ-шо извешь, зола, голубиной калѣ и проч. соснавлиющь свержь угобженія средство мохъ съ луговъ испребляшь. Ештли бы возвышенныя луга въ зимнія ошпепели могли покрышь водою, равное бы дѣйствіе эшо произвело. На низменныхъ же болописныхъ лугахъ можно съ перевозимья по морозамъ насыпашь крупнаго песку время ошъ времени, и чшобъ слой его насыпанъ былъ не толще чешверши вершка. Мохъ, шаковымъ образомъ засыпанной, обращается болописному лугу въ навозъ, шакъ чшо росшъ травы примѣшнымъ образомъ ошъ шого умножается.

Сколько ни полезно луга ошъ моху свобождашь, но могушъ изъ нихъ бышь шаковые, коихъ мохъ больше полезенъ, нежели вреденъ. Въ числѣ сихъ могушъ бышь возвышенно лежащіе, и имѣющіе пошву не твердую, кошорая ошъ солнечныхъ жарѣ скоро высыхаетъ, а влажностъ ошъ дождя и росы безъ моху, ее удерживающаго, скоро ивлешаетъ парами. Таковыя луга конечно надлежатъ къ самымъ худшимъ,

а чрезъ испребленіе моху еще худшими учинятся. Положимъ, что можно навозить на нихъ глины, и въ этомъ случаѣ не иначе поступать должно, какъ по сказанному о воженіи крупнаго песку на болошистые луга.

Къ очищенію луговъ отъ крошовыхъ кочекъ упошребляющъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ орудіе, называемое *луговая скобель*. Это орудіе состоишь изъ трехъ большихъ изъ дубоваго дерева почти шреугольно выдѣлываемыхъ блоковъ, кои на обоихъ концахъ двумя прибитыми или привинченными брусами въ нѣкоторомъ разстояніи между собою содержащяся, и на переднихъ частяхъ довольно остро обтесывающяся, чтобы могли совершать пребуемую отъ нихъ услугу. Въ передній блокъ ушверждающяся два желѣзныхъ крюка, для зацѣпленія за нихъ припряжей, когда впрягаются лошади или волы къ шасканію этой скобели. Острые блока, шащаь по землѣ, срѣзываетъ кочки. Это производишь въ Апрѣлѣ послѣ того, какъ кочки нѣсколько дождемъ посмочишь.

Когда срѣзанныхъ скобелью кочекъ много и онѣ велики, останущяся онѣ лежащими разбросанно, и произведущъ неравносши; почему должно за скобелью либо кашокъ шащишь, и срѣзанныя груды раздавишь и сравнишь; или заставишь людей разбивать, когда куски велики, лопашами мѣлко, и тогда уже кашкомъ про-

щащипть; это всего нужнѣе на пошвѣ твердой, въ которую кусковъ ошѣ кочекъ вколопишь не можно. На таковой луговой пошвѣ всего лучше съ самаго начала, не упошребляя скобели, послать людей, и велѣшь имѣ кочки острыми желѣзными лопатками на подобіе треугольника разсѣкать, попомѣ раздробить въ мѣлкіе куски, разбросать въ право и лѣво, а особливо на шѣ мѣсна, гдѣ есть лошкинны. Въ которыхъ мѣснахъ кочки срѣзываются скобелю, свозятъ ихъ на лошкинны по близости, и шѣмъ заравниваютъ. Если же то не нужно, можно срѣзанныя съ кочекъ дернины отвозить въ навозной магазинъ, къ приготовленію изъ нихъ съ другими веществами добраго навозу.

По освобожденіи лугу ошѣ старыхъ заправенѣвшихъ кочекъ должно каждой весны спараться вновь производящія опять разбрасывать. Это производится обыкновенными навозными лопатами. Гдѣ земля рыхла, всего еще легче произвестъ это навозными граблями, и незалубенѣвшую еще землю разгрести врозь и сравнять. Разбрасываемая земля сославляетъ родъ навозу шамъ, куда попадетъ, да и самое то мѣсто, гдѣ была кочка, нужно только травными сѣменами, кои при этой работѣ съ собою въ запасъ имѣть должно, тошчасъ обсѣять; а впрочемъ она въ нѣсколько лѣтъ не обросетъ.

Есть-

Естьли луга поросли разными кустарниками, какъ-то лозникомъ и разными родами ивъ, шерновникомъ, калиною и шому подобными, то оныя не шокмо отъ часу болѣе разрастающся, но и кошенію и уборкѣ сѣна очень мѣшающъ; по чему о истребленіи оныхъ помышлять должно. Есть къ шому особливое орудіе, эрадикаторъ, ш. е. искоренитель называемое, и прежде еще въ домоводцѣ Г. фонъ Минхгаузена похваляемо было. Орудіе это состоитъ въ вилахъ, имѣющихъ при рога въ 10 вершковъ длиною, толстые и всюду зазубренные, кои спереди нѣскольکو къ навознымъ виламъ сходствующъ. Выкающъ въ вилы рожонъ, сажени въ двѣ длиною, толстой и изъ крѣпкаго неломкаго дерева, къ кошорому привязывается веревка; выкающъ потомъ вилы подъ коренья куста, подкладываютъ колодку, и шянутъ за веревку; эшимъ способомъ можно самые упругіе корни выворачивать.

Дѣлаются желѣзные крюки съ зазубринами на кольцѣ; кольцо надѣвается на рожонъ, въ кошоромъ напередѣ вбитъ гвоздь, чшобъ кольцо не соскакивало; подъ рожонъ подкладывается колодка, и зацѣпивъ корень крюками, на перевѣсѣ кустъ выворачивающъ.

Въ нашихъ мѣстахъ луга очень заросли лозникомъ. Какъ коренья его простираются по поверхности земли, употребляютъ къ искорененію сихъ кустовъ одну

только мошкы или крѣкѣ, на концѣ котораго насажено широкое и острое долото, онымъ подрубающъ корни, и послѣ руками выпаскивающъ. Таковымъ способомъ хошя корни и выдирающся, но большая часть оныхъ осѣдается въ землѣ; однакожъ когда пень будещъ вывороченъ, оныя не оппрыскивающъ, для того что гдѣ коса плотно къ землѣ ходишь можешъ, подрѣзываетъ она молодые отростки, выходящія отъ корешковъ, въ землѣ оставшихся. Въ ежегодномъ повѣреніи сего они слабѣютъ, и мало по малу замираютъ. Къ выкапыванію лознику и подобныхъ тому кустовъ избираютъ Августъ, по убораніи съ луговъ сѣна: чѣмъ жарче тогда будещъ погода, тѣмъ меньше оживетъ оставшихся въ землѣ корней. Когда же въ Сентябрѣ послѣ сухаго лѣта продолжается еще сухая погода; и эшотъ мѣсяцъ къ дѣйствию сему способенъ. Въ нѣкошорыхъ мѣстахъ бываетъ недостатокъ въ дровахъ, почему вычищаніе кустовъ можетъ производимо бытъ сторонними людьми, изъ однихъ только сихъ кустовъ и корней на дрова. Засохшіе кусты спаскиваются въ кучу, свозящаясь домой, и съ пользою употребляющся къ топленію печей хлѣбныхъ.

И. Обсушиваніе мокрыхъ луговъ.

Мокрыя и болошистые луга до тѣхъ поръ къ поправленію бывающъ не способны, пока не будутъ освобождены отъ из-

ли-

лишней мокроты. Поелику права на шаковых лугахъ составляетъ кислое и безсочное сѣно, которое въ сладкое единственно только обсушеніемъ луговъ превращено бытъ можешъ; развѣ въ сухое лѣто обсушивать ихъ вышеописанными родами злаковъ, кои на мокрединахъ сладкой кормъ составляютъ, и къ чему водяной пырей или шишковникъ всего лучше.

Свыше силъ часнаго человѣка, когда изъ сосѣднихъ дачъ на луга его вода течетъ, чѣмъ онъ въ своихъ дачахъ оплотъ къ удержанію оной сдѣлать могъ. Дѣло эшо государственное подавать помощь нужду терпящимъ мѣстамъ, и разпоряжать, чѣмъ имѣли они водяной опводъ въ шаковомъ размѣрѣ, дабы всѣ, какъ выше, такъ и ниже лежащія мѣста получили шаковой большой впускъ воды, чѣмъ всюду свою излишнюю воду въ эшотъ главной опводъ малыми ровками спускать могли, и нигдѣ бы она заспаиваться не могла.

Естьли же луга шаковаго содержанія, чѣмъ онымъ водяной опводъ или главной каналъ помощи оказать не можешъ, мало уже средствъ подать какой либо совѣтъ къ ихъ осушенію. Оныя оспаются подвержены судьбѣ своей, и единое удовольствіе владѣльца ихъ состоитъ въ томъ, что въ сухія лѣта получаетъ на нихъ небольшой урожай сѣна; какъ напрошивъ въ мочливыя шѣмъ больше жаловаться онъ долженъ, что собираніе сѣна сѣна со-

сставляешѣ для человѣковѣ и скотовѣ крайне утомительную и медленную работу.

У кого же есть низменные мокрые луга, кои терпятѣ отѣ пришеканія воды изѣ сосѣдственныхѣ мѣстѣ, два пути къ осушенію оныхѣ; либо сдѣлашѣ на мѣстахѣ, скашѣ имѣющихѣ, рвы, кои бы воду въ себя вбирали, и могли выпускашѣ оную въ другіе полевые и луговые рвы; или въ недостаткѣ шаковыхѣ водяныхѣ скашовѣ дѣлающѣ *стоячіе рвы*, ш. е. шаковые, въ кои съ луговѣ и полей спекающая вода вбираясь спойшѣ.

Легко можно себѣ представить, что по количеству прибавляющейся воды шаковые *стоячіе рвы* много мѣста занимашѣ могутѣ; но должно разсудитѣ, не великая ли и замѣняющая польза, что посредствомѣ шаковыхѣ рвовѣ доспавляется облегченіе въ убораніи сѣна. Не всегдашняя ли шо замѣна будетѣ, когда, на прим. лугѣ, съ котораго впрочемѣ убирались сѣ сѣномѣ въ три дни, а по осушеніи работу эту совершатѣ въ день; или, когда прежде по глубинѣ и вязкости болота, по оному шѣлеса запряженная проѣхашѣ не могла, и скошенную траву къ сушенію надлежало сносить на рукахѣ людямѣ, но чрезѣ шо уже свободно свозитѣ оное можно будетѣ, и потребно будетѣ впрое меньше людей и работы.

Сверхѣ того при заведеніи шаковыхѣ *стоячихѣ рвовѣ* долженѣ Хозяинѣ подумать

и объ рыбной ловлѣ, что оная сверхѣ имѣющейся пріумножись, а когда прудовѣ у него не было, то заведешѣ чрезѣ эпо оныя. Въ таковомѣ намѣреніи должно ему спочіе рвы располагашѣ выкапываніемѣ въ сухменное лѣшо, чтобѣ вода работы не отбивала. Надлежитѣ рвамѣ симѣ дашѣ таковую глубину, чтобѣ вода въ нихѣ и въ сухменныя лѣша не пересыхала, и рыбы бы держашѣся могли. Рыба, кромѣ домашняго употребленія, составляетѣ всюду разхожій товарѣ, и барышники изѣ городовѣ прѣзжающѣ оную скупащѣ въ деревни; прибавляющееся число народу возвышаетѣ опчасу на рыбу цѣну. Хотя не всякія рыбы въ таковой спочей водѣ держашѣся могутѣ, но гольцы и караси безѣ всякой нужды, кои въ лѣшніе мѣсяцы, когда молодыхѣ карповѣ нѣтъ, бывающѣ очень вкусны. Могутѣ же присоединены бытъ и лини, кои вкусомѣ помянушымѣ рыбамѣ хотя и уступаютѣ, но въ лѣшнюю пору имѣютѣ свою цѣну, и въ спочей водѣ, такѣ какѣ гольцы и караси, жить могутѣ. А таковымѣ образомѣ заняшья подѣ спочіе рвы мѣста одною рыбою уже за себя заплашишѣ въ состояніи.

У кого низменные луга, кои сами по себѣ малы, и не позволяютѣ удѣлить мѣста къ заведенію хорошихѣ рыбныхѣ сажалокѣ, должно замѣшши самое глубокое мѣсто, кошораго полая вода доспигаетѣ, и въ жаркое лѣшо выкопашѣ малой водо-

смѣ (бассейнѣ), или шакѣ называемой кошелѣ, а по нуждѣ и малые водоотводныя ровки съ лугу въ оной провеспи. Что же бы не было нужды содержать мосты, дабы ближнюю дорогою на лугѣ съ шѣлегою проѣхашь, бросающѣ въ сѣи отводныя ровки не слишкомъ большіе камни, а на нихъ настилающѣ зеленыхъ ольховыхъ вѣшвей, и прикрывѣ дернинами, сравнивающѣ съ поверхносцію луга. Вода пробирается между наложенныхъ камней, и лѣшѣ въ десять не будетѣ нужды эшотѣ каменной моспокѣ разбирая передѣлывать, чтобѣ доставишѣ водѣ свободной спокѣ, когда иломѣ промежки камней заволочешѣ и зашкнешѣ.

Вѣ болошѣ находишся лежащее шорфное вещество, кошрое поддерживаешѣ безпрестанную ржавчинную жидкость; для шого что вода сквозь шорфѣ, подѣ кошорымѣ иногда глина находишся, не можешѣ просѣдать вѣ состоящій подѣ оною песокѣ. Ешѣли съ помощію землянаго бурава найдено будетѣ, что вѣ глубинѣ ешѣ песокѣ, шо можно уповашѣ, что вода, по сдѣланіи сквозь шорфѣ и глину отверсшя, вся вѣ песокѣ уидешѣ. Кѣ произведенію шаковаго прорѣзу вѣ болошистомѣ днѣ упошребляющся не очень широкія доски, кои могушѣ состояшѣ изѣ оболонковѣ (первыя опѣ бревна съ обоихъ боковѣ при пиленіи опшимаемыя доски), и коихъ можно доспашѣ шамѣ, гдѣ лѣсѣ пилятѣ,

ляшѣ, сплачивающѣ оныя чешвероугольникомѣ, или иною фигурою въ клешку, или обрубѣ, подобный колодезному. Эшотѣ обрубѣ долженѣ бышѣ въ швахѣ своихѣ плошенѣ, чшотѣ грязь сквозь оныя не прошекала, и нижнихѣ досокѣ ребро опешываешѣ остро, чшотѣ можно было обрубѣ удобнѣе въ болошѣ вогнашѣ. Спавяшѣ потшотѣ эшотѣ обрубѣ въ болошѣ, выпашывающѣ, пока ошпановишѣся на швердомѣ днѣ, и работникѣ съ лопашою вошсѣдѣ въ средину онаго, начинаешѣ выкидывашѣ шурфной илѣ до самаго песку, коншораго шакѣ вершковѣ на шесшѣ должно выгнушѣ. Какѣ скоро изѣ обруба все выкидано будешѣ, чисная вода начнешѣ сквозь швы обруба прошекашѣ и оной наполнишѣ; но мало по малу въ песокѣ уходитѣ шакѣ, чшо вскорѣ на всемѣ болошѣ изсякнешѣ и превратишѣ оное въ сухой лугѣ. Когда одного шаковаго обруба будешѣ недосшашочно, можно сдѣлашѣ оныхѣ нѣсколькѣ. Когда ржавчинной шорфѣ шолько сядешѣ, чшо уже не будешѣ болѣе жидокѣ, можно обрубы вынушѣ вонѣ, развѣ только припеченія вешней и дождевой воды будущѣ велики; а впрочемѣ земля въ сшѣнахѣ, его окружавшихѣ, окрѣпнешѣ осаживаясь, и вода можешѣ въ ямы сшѣ шекашѣ не засшаваясь. По осушеніи лугу, выкиданную изѣ обрубовѣ землю свозяшѣ на шаковыя мѣста, кои шребующѣ возвышенія, на примѣрѣ въ лоштинки на лугахѣ; шаковымѣ же

же образомъ поступають и съ землею, выкидываемою при копаніи водоопводныхъ рововъ. Есѣли не будетъ на лугу нужды въ этой землѣ, а кучею лежатъ ей не ловко, можно тогда оную по всему лугу размешать и кашкомъ укатать. Дернины же надобно будетъ свозить въ кучу, дать онымъ перэгнить, и тогда размешать по всему лугу вмѣсто навозу. Еще въ разсужденіи водоопводныхъ рововъ должно упомянуть, что нѣкошорые Хозяева, по сдѣланіи на самомъ углубленномъ мѣстѣ лугу, куда скатъ воды есть, прямого рва, аршина около полупора шириною, проводящъ къ оному еще нѣсколько ровковъ разной ширины изъ разныхъ мѣстъ, наполняющъ оные вершка на три вышиною камнями, въ кулакъ величиною, мѣшая между оными и по меньше величиною, наспилающъ на камни толстой слой древесныхъ щепъ и моху (щепы къ сему способѣ ольховыя, для того что дерево это въ водѣ не гнѣетъ), а посверьхъ сего наполняющъ ровки землею, нѣсколько выше поверхности лугу, для того что земля со временемъ осядетъ и можетъ сравняться. Землю эту обсѣвають правильными сѣменами, чтобъ на лугу не было безполезнаго мѣста. Но сего само по себѣ очень хозяйственнаго дѣйствія не можно совѣщывать всемѣстно; удобно оное лишь тамъ, гдѣ воды спускаетъ не много, и гдѣ припеченіемъ илу и ржавчины промежки

межки камней засоришь не можеть, равномерно, гдѣ много снѣговой или дождевой воды собирается; тамъ сѣи камнями наполняемые водоотводные рвы услуги оказываютъ мало. Напротивъ ошверзтые рвы скорѣе къ спеченію воды своею открытосшію способствуютъ: ибо должно вѣдать, что воздухъ, вѣтръ и солнце воду сполькожъ скоро или еще скорѣе осушиваютъ, нежели она вѣ землю вбираеться можетъ. Когдажъ при закрытыхъ водоотводныхъ рвахъ во время сѣнокосу сильнымъ дождемъ нальетъ на лугъ воды, сѣно отъ того очень пошерпитъ, естли на рядахъ вѣ оной долго пролежитъ, или вѣ копнахъ простоитъ; или за шакowymъ наводненіемъ кошеніе лугу должно будетъ совсѣмъ оставишь, что вѣ сельскомъ Хозяйсствѣ соснавляетъ неудобство, когда время и работу отъ своей надлежащей поры откладываетъ къ другой; умалчивая о томъ, что шрава сама по себѣ много доброты своей шеряетъ, когда долго простоитъ вѣ гнилой стоячей водѣ. Естли выкиданною изъ ямъ и рововъ землею по лугу не разравниванъ, можно вѣ оную посадить ракишъ, ольхъ и шополей, кои много вѣ себя влажності всасываютъ и опять парами выпускають, а пошому лугамъ шакowymъ очень полезны бышь могутъ.

Напоследокъ вѣ разсужденіи водоотводныхъ рововъ замѣчается, что оныя вѣ
раз-

разныхъ мѣстахъ можно снабдитъ малыми и ничего несущими запорами (шлюзами), дабы въ сухменныя лѣта вода въ нихъ задерживалась; для того что хотя она и не можетъ служить къ орошенію луговъ поливаніемъ, но пошву земли содержишь влажною, и корни правные могутъ влагу сію въ себя втягивать. Когда вода во рвахъ сползетъ вершковъ на шесть ниже края поверхности луговой, по та земля, которая бокомъ къ водѣ примыкаетъ, оную въ себя сосетъ, приподнимаетъ вверхъ столько, что можетъ она до правныхъ корней достигать. Таковое втягиваніе воды землею, кто на сіе не обращалъ еще примѣчанія, можетъ усмотрѣть въ сахарѣ, копорой также воду вверхъ поднимаетъ, когда нижнюю свою частью оной коснется. Почему нѣкоторые низменнымъ водоотводными рвами снабженнымъ лугамъ, посредствомъ помпанныхъ запрудокъ, можно таковую же помощь оказывать, каковую имѣютъ другіе луга отъ поливанія напускаемою водою.

I. Поливаніе луговъ.

Когда унавоживаніе луговъ составляетъ вѣрное средство къ приумноженію на оныхъ травы, то наводненіе оныхъ составляетъ второе средство, съ копорымъ безъ перваго можно обойтись.

О пользѣ поливанія луговъ, такъ и о распоряженіяхъ къ тому по собственнымъ опытамъ ни одинъ писатель не предлагалъ

галѣ еще больше въ шаковой краткости, какъ Господинъ *Бергенъ*, слѣдующими словами: изъ всѣхъ произведенныхъ мною разпоряженій къ наводненію луговъ выходило, что чрезъ два года, по состоянію воды и луговъ, получалъ я сѣна вдвое и шрое предъ прежнимъ, и это сѣно по внутренней добротѣ своей гораздо было лучше прежняго. Съ году на годъ количество и доброша сего прибываетъ еще больше. Кто самъ того не видалъ, не повѣришь: признаюсь, со мною шожъ было. Изумляясь великою пользою, а особливо прибылью, какъ сказывали мнѣ прежде того искусные Хозяева, увѣренъ былъ я въ шомъ собственными опытами.

Всякая вода, какогобъ роду ни была, рѣчная, ключевая или колодезная, къ поливанію луговъ способна: довольно щасливъ, кто шолько шу или другую подъ рукою имѣшь можешь. Разумѣется же однако, что польза отъ ключевой воды не шакова велика, какъ отъ рѣчной; и что оная вода изъ шаковыхъ рѣкъ, къ коимъ смежны добрыя пашни, и дождевая вода съ оныхъ въ нихъ стекаетъ, лучше, нежели изъ рѣкъ, протекающихъ по песчанымъ и безплоднымъ мѣстамъ, или кислымъ и холоднымъ болошамъ; шакъ какъ и дождевая вода предъ всѣми имѣетъ преимущество, ештли шолько оной въ досташочномъ количествѣ имѣшь можно.

Когда по сему рѣки состоятъ къ нашимъ услугамъ, зависить послѣ того дѣло въ паденіи или наклонѣ, которой вода либо имѣетъ сама собою, или мы ей придасть можемъ. Еслили находишься паденіе отъ напуры, и до тѣхъ поръ, какъ придетъ на самое возвышенное мѣсто лугу, на трехъ саженяхъ только вершковъ семь наклонъ имѣющее; или, когда безъ вреда другимъ нашимъ дачамъ или сосѣднимъ можно выкапываніемъ на столькожъ наклонъ возвысится: то посредствомъ рва, въ полтора аршина въ пошелѣ или днѣ шириною, можно наводнишь луговъ болѣе полутора десятиинъ. Но лугъ долженъ быть совершенно равенъ, безъ ямъ и лошинъ, въ коихъ вода задерживаться можетъ, и безъ холмовъ или бугорковъ, на которые она вливаться не можетъ, сверхъ того быть въ таковомъ положеніи, чѣмъ имѣлъ небольшой скапъ, и какъ къ разширенію воды, такъ и къ спеканію оной долой имѣлъ способность. Обыкновенно скапы сѣи бывають внизъ по теченію рѣки, изъ которой вода берется, такъ что сама собою обратно въ оную входитъ. Но еслили скапъ лугу отъ рѣки въ сторону, должно будетъ воду съ него въ рѣку отводить прокопаннымъ рвомъ.

Когда вода будетъ доведена на высшее мѣсто лугу, и когда напура или искусство доставили къ тому потребную спо-

способность, тогда съ возвышенія проведенный, но опѣ часу уменьшаемый, и наконецъ совсѣмъ теряющійся главный ровъ приводитъ воду мало по малу въ меньшіе, а изъ оныхъ еще въ малѣйшіе ровки, кои напоследокъ учиняются бороздками, пальца въ два шириною, по всему лугу оная разливаея, подобно какъ кровь въ человѣкѣ изъ большой жилы въ маую, а изъ оной въ малѣйшую, и шакъ по всему шѣлу. Но чтобъ бытъ всегда власшителемъ воды, въ главномъ рвѣ, гдѣ онъ пріемлетъ сію изъ рѣки, снабжается запоромъ или шлюзомъ, которой опираея, когда нужно поливать лугъ, и замираея, когда оной полишъ будешъ довольно. —

Лучшее время къ наводненію или сему поливанію луговъ весна, когда нѣшъ уже причины опасаться большихъ морозовъ, дабы вскорѣ послѣ онаго проросшающая шрава вреда не понесла, что, когда она будешъ въ водѣ находишся или совсѣмъ оною покрыта, легко случишся можешъ. Однакожъ ночные морозы ей не вредны; ибо вода, находясь въ безпрестанномъ движеніи, не замерзнетъ, и морозу до корней и росшковъ шравныхъ не допустишъ. По правилу должно воду на лугахъ держать опѣ шрехъ до чешырехъ недѣль, слѣдственно весь Апрѣль мѣсяцъ въ теплыхъ шранахъ, въ холодныхъ же съ половины Апрѣля до половины Мая. Прошиву сего

погрѣшающъ иногда съ хорошимъ, иногда съ худымъ послѣдствіемъ. Топчасъ по снятїи перваго сѣна приступающъ опять къ наводненію луговъ, и продолжающъ поливаніе ошъ трехъ до чепырехъ недѣль, равно какъ весною. Не рѣдко случается, что по продолженіи наводненія нѣсколькихъ лѣтъ сряду, луга начинающъ по снятїи двухъ травъ приносить третью, въ кошоромъ случаѣ наводняющъ луга и послѣ втораго сѣнокосу. Осенью же и зимою (гдѣ можно) луговъ наводняющъ ошнюдь не должно.

Къ сему правилу о наводненіи луговъ присовокуплю яшо, что преподаешъ намъ одинъ Хозяинъ Швейцарской, гдѣ наводненіе или поливаніе луговъ прежде, нежели у насъ въ нижней Нѣмецкой землѣ, вошло въ употребленіе, да и мѣстоположенія къ тому способнѣе. Это Г. Берtrandъ, кошорой въ своихъ *Elemens d'Agriculture*, преподаетъ слѣдующія правила:

1) Высокіе и опверзтые луга, шѣ, коихъ пошва шолько легкая (песчаная), шѣ, коихъ положеніе на полдни, шѣ, у кошорыхъ есть скатъ, требующъ наводненія больше, нежели коихъ обстоятельство инаковы: сему научаешъ уже и здравый разсудокъ. Относятся же это замѣчаніе шолько до жаркихъ и сухменныхъ лѣтъ.

2) Должно держаться мѣры, у кого вода шокмо средственная, и особливо когда оною наводняешся швердая пошва земли.

мли. (Des eaux mediocres, ш. е. воды сред-
спвенныя, относяся у Хозяина не до
количества, но качества воды. Слѣдствен-
но значить то воду средспвенной добро-
шы, кошорая, какъ въ Швейцаріи часпо
случается, течетъ чрезъ горы, и пріемлетъ
въ оныхъ желѣзныя частицы или купо-
росъ. Когда по сему, на прим. на глини-
спую пошву сядетъ много частицъ купо-
росныхъ, лугъ отъ сего очень повре-
дился.)

3) Наводненіе должно производишь
осенью изобильнѣе, нежели весною, а ве-
сною больше, нежели лѣтомъ. Зимой на-
водняю я луга шокмо доброю водою, ко-
шорая не замерзаетъ, или мерзнетъ
очень мало, и шогда вдругъ большимъ
количествомъ оную пускаю. (Г. *Берт-
рандъ* подъ доброю водою конечно раз-
уметъ ключевую воду, кошорая во всѣхъ
спранахъ близко къ источнику бываетъ
тепла, и когда въ онаго находишь въ
движеніи, то не замерзаетъ, а сіе дви-
женіе на скаписомъ лугу быть должно.
Гдѣ есть шаковая способность, шамъ клю-
чевая вода зимою совершитъ прямо же-
лаемое дѣйствіе надъ пошвою луга, а
именно то же, каковое согрѣвающей на-
возъ оказываетъ надъ корнями растѣній,
какъ на примѣрѣ Г. *Медикусъ* въ Мангей-
мѣ свои иноспранныя, до нынѣ у насъ
подъ кровлю въ защитѣ содержимыя
деревья, содержишь всю зиму на откры-
шомъ

томъ воздухъ, прикрывая корни ихъ на поверхности земли насыпаннымъ толсто навозомъ, и шѣмъ отвращаетъ прониканіе морозовъ. Чшо же Г. Бертрадъ предлагаетъ лѣшомъ луга поливать меньше, нежели весною, причина сему та, чшобъ вода ошъ теплоты солнечныхъ лучей не пришла въ гнилость, и шѣмъ бы травы не повредила: ибо, кшо имѣетъ дѣло съ поливаніями луговъ въ жаркія лѣта, чаятельно при дождяхъ съ громомъ замѣшилъ, чшо при слѣдующей попомъ жаркой погодѣ, когда оная нѣсколько дней простоишъ и луга обсушишъ, трава совсѣмъ чернѣетъ или зелень свою теряетъ. Также и весною должно остерегаться, чшобъ наводненія не произвестъ тогда, какъ молодая трава проросшатъ начала; ибо ошъ того вянетъ оная легко, или по крайней мѣрѣ покрываются иломъ, и слѣдственно доставишъ худое сѣно.

4) Воду не перемѣнять (не спускать и не прибавлять, когда оная луга уже покрыла единожды), когда земля крѣпко замерзла.

5) Перемѣняютъ воду (спускаютъ и напускаютъ) только ввечеру и поушру.

6) Когда случится большой иней, даже когда трава въ ростѣ пойдетъ, тогда и лучшая вода опасна. Простолюдины въ деревняхъ могутъ эшо замѣчатъ по тому, когда ввечеру на оконныхъ стеклахъ пошъ будетъ собираться. (Причина сему та,

та, что поливая молодая трава чрезъ
лишекъ влажности въ себя вшянетъ, и
сосуды ея отъ того лопнутъ. Нѣжныя
весеннія растѣнія выдерживаютъ иней и
ночные морозы лучше, когда во внутрен-
ности ихъ меньше соку.)

7) Излишество тучной шинистой во-
ды приводитъ способности растѣній въ загни-
ваніе, и учиняетъ, что по прошествіи
году оныя начнутъ вырастать шверды
такъ, что скоты ихъ бсть не будутъ.
(Слишкомъ долгое держаніе самородныхъ
луговъ подъ водою учиняетъ, что на
нихъ добрыя травы пропадаютъ, и мѣ-
ста ихъ занимаютъ кислыя, въ мокрошъ
удобно расшущія, какъ на примѣрѣ осока.)

8) Не хорошая вода можетъ быть по-
правлена различнымъ образомъ. Когда при-
няла она вредное свойство, прошекая
чрезъ клѣвкую, болошистую, шуфнаго
камня качество имѣющую, или желѣзи-
стую землю, должно опвесити оной, еже-
ли можно, иное печеніе, или поспелъ ея
усплатъ крупнымъ пескомъ или кремня-
ми. Еще поправляютъ воду, мѣшая оную
съ навозною жижею, даютъ оной поспо-
ять въ прудахъ, и бросаютъ въ оныя
разныя способныя вещества, какъ-то из-
вестъ, навозъ, вѣшви древесныя, и воду
приводятъ въ движеніе, болшая колесами,
подобными крыльямъ вѣтренной мѣльницы.
Еслили вода холодна, проводятъ оную въ
каналъ, чтобъ лучи солнца больше на нее

упадали, и держатъ оную въ открытомъ прудѣ до тѣхъ поръ, какъ холодность свою утратитъ. Если же вода споячая, и потому легко можетъ приити въ гнилость, должно оную привести въ движеніе. —

Въ этомъ состоятъ особливья правила къ наводненію луговъ Швейцарскаго учителя домоводства, послѣ того, какъ онъ непосредственно предъ тѣмъ заставлялъ говорить своего прикащика о искусственномъ луга наклоненіи или скапоси, которую сообщалъ онъ неоднократнымъ луга вспахиваніемъ съ одной стороны. Ручей, изъ котораго лугъ наводненъ бывъ, долженствовалъ, былъ ниже, нежели лугъ; а чтобъ воду изъ онаго приподнять, положилъ онъ поперекъ его старое полевое дерево, дабы посредствомъ сего оного названнаго шлюза лугъ по желанію наводнятъ можно было. Послѣ того присовокупляетъ Г. Бертрадъ: удобно даже съ выгодою наводнятъ лугъ, не имѣющій скапу, когда его съ осени по самую весну совсѣмъ покрывъ водою, чтобъ растѣнія довести къ произведенію ихъ роста. —

Оказывается, что сіи правила отъ предшедшихъ нѣсколько отходятъ; поелику мѣстныя обстоятельство не всюду одинаковы бывъ могутъ, и деревенскому жишелю собственныя обстоятельство своего мѣста должны руководствоватъ

вашъ къ лучшему употребленію сего поправляющаго луга средства. Однакожъ не искусившемуся въ шомъ должно по симъ предписаніямъ такъ себя учреждать, чшобъ примѣчалъ онъ всѣ свои опыты, и держался шѣхъ, кои по сосстоянію почвы земли своей, также больше или меньше теплаго климату страны своей, найдеть лучшими. Я заключу матерію эту присовокупивъ нѣкоторыя примѣчанія.

а) Имѣющій намѣреніе и способность одинъ или нѣсколько луговъ своихъ наводнишь, долженъ прежде всего взирать на то, нѣтъ ли на оныхъ лощинъ; ибо, когда вода на оныхъ застоится, то при повшореніяхъ такового поливанія произойдутъ кислыя, жесшкія и просшитыя растѣнія, кои добрую сладкую праву испребятъ. Къ предваренію сего должно шаковыя углубленія заравняшь. Можно употребить къ сему землю, выкидываемую изъ рововъ и бороздъ, служащихъ къ разпросираненію воды по лугу.

б) По краямъ ровковъ и бороздъ, кои воду на лугъ приводятъ, могутъ вырастать негодныя болошныя травы, даже и въ срединѣ оныхъ. Злу сему препяшствуешь шѣмъ, когда по всякую осень шаковые ровки и бороздки перемѣняются, а выкидываемая земля изъ рововъ новыхъ употребляется къ наполненію старыхъ. Заровненные шаковымъ образомъ старые ровки вмѣсто шого, чшобъ произращать

болошныя растѣнія, произведутъ изобильную сладкую траву, пошому что пошва ихъ годъ спояла ошверзшою.

в) Во Франконіи пользу поливанія луговъ разумѣютъ сполько, что не жалѣютъ никакихъ убытковъ къ произведенію сего въ дѣйство. Находяшся шамъ во множествѣ тѣ мѣльницы, кои въ Голландіи употребляютъ къ вычерпыванію воды, изъ кошорыхъ каждая въ нѣкошорыхъ мѣстахъ можетъ спостоять отъ 80 до 100 шалеровъ. Въ разныхъ мѣстахъ подѣланы отчаспи больше, отчаспи меньше дорогія машины къ поднятію воды вверхъ. Но изъ оныхъ останетсѣ всегда лучшеш и дешевѣйшеш такъ называемое *Персидское колесо*, кошорое изображено въ Моршимеровомъ земледѣліи (*Acker- und Feld=Baue*).

г) Кто хочетъ держатъ траву въ водѣ до самаго сѣнокосу, получить оной много, но не въ надлежащей добростѣ, какъ отчаспи уже выше упомянуто. Въ первой или второй годъ прежнія добрыя травы будупъ ещеш держашься въ посредспвенномъ сосшояніи, пошомъ учиняшся простишны, грубы и желшны. Да и въ самой первой годъ шрава эша не сосшавишъ здороваго сѣна: ибо отъ воды прилипаютъ къ шравѣ шонкія земляныя и илованыя часпицы, и производяшъ, что по засушеніи будешъ она несказанно пыльна. Когда лошади будутъ ѣсть эшо пыльное

ное

ное сѣно, никогда не освободятся отъ сипепницы, и даже останутся съ запахомъ, кашлемъ и чахошкою. Изъ всѣхъ же скотовъ всего меньше могутъ оно выдерживать овцы; также и у коровъ происходитъ отъ него худоба и воспалительная лихорадка. Довольно несчастія, когда сѣно въ мочливыя лѣта при разлитіи рѣкъ получишь въ себя таковое вредное свойство: должно тогда взять прибѣжище къ молоченію цѣпами, дабы пыль выбишь вонъ; но и послѣ таковой молошбы сѣно это все еще останется опасно; почему конечно не должно дѣлать онаго таковымъ изъ доброй воли. Г. Бергенъ совѣтъ прошивурѣчишь сему излишнему наводненію луговъ, и говоритъ: когда они недѣли за двѣ или за три до сѣнокосной поры обсохнутъ, и въ это время ихъ дождемъ, рѣдко въ сію пору не бывающимъ, отъ земныхъ часпицъ или илу обмоешь, таковое сѣно конечно по добротѣ своей больше стоить, нежели множайшее количесво необмышаго дождемъ. — Однако всюду лучше слѣдовать сему правилу: въ лѣпнее время воды на лугахъ никогда не держать болѣе, какъ пошва ихъ оною напишася.

д) Поминаемый часто Г. Бергенъ очень правъ, когда о зимнемъ наводненіи луговъ, кое Г. Бертрантъ всеобще похваляешь, говоритъ опредѣленнѣе такъ: можешь быть лѣзя будешь повѣришь, какъ

и многіе Хозяева вѣрили, пока для нихъ вещь сія еще нова была, что зимнимъ наводненіемъ луговъ можно доспавишь себѣ пользу. Онос полезно, когда пошва луговъ песчана или вообще рыхла, и когда вода на оныхъ шакъ глубоко станешъ, что хопя бы и замерзла, ледъ до пошвы не доспанешъ. Въ прошивномъ же случаѣ должно будетъ опасаться того, что прежде писано о рановременномъ поливаніи луговъ весною.

К. О непусканіи на луга скотины.

Во многихъ мѣстахъ пасьба скопа по лугамъ весною и осенью щитається за особое благополучіе, но въ основаніи это больше вредно, нежели полезно.

Простолюдинъ, бѣдной кресъяннинъ, обыкновенно къ исходу зимы имѣешъ въ скопскомъ корму недоспашокъ; а поелику въ первые весенніе мѣсяцы на обыкновенныхъ скопопасъбищахъ травы бываешъ еще мало, то спада гоняющъ всюду, гдѣ только трава растешъ.

Всего же меньше должно позволять пасьбу скопа весною на лугахъ, хошябъ были оныя возвышенны или низменны, хошя бы осеннюю паству на оныхъ и не возпрещашъ. Скопы сбѣдающъ молодые расткы прозябающихъ травъ, или раздробляющъ оныя ногами, шакъ что при заказываніи луговъ, что бываетъ въ первой половинѣ Мая, луга бывающъ совсѣмъ голы,

лы, и очень поздно обростающъ. Есть случай видѣть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ огороженные луга и правыя мѣста, кои отъ весенней паствы чрезъ то освобождаются, а близъ или въ срединѣ между оныхъ другіе, подверженные скопопаствѣ: тамъ оказывается, что на первыхъ права уже высока, такъ что почти косить можно, когда другіе заказываютъ, а на сихъ развѣ недѣль чрезъ шесть такая права выросетъ. Однокосные луга, кои въ исходѣ Іюля косятъ, могутъ превращены бытъ въ двоекосные, когда опрѣшивъ на нихъ весеннюю пасьбу.

Весеннее скопопаство на лугахъ во многихъ мѣстахъ продолжается до 9 Мая, а потомъ еще нѣсколько дней проходитъ, такъ что луга не прежде, какъ съ половины Мая, щадятся. Когда по заказаніи луговъ случаются сухменные и жаркіе дни, права на лугахъ будетъ столько низкая и рѣдкая, что по единому сему обстоятельству по крайней мѣрѣ половиною меньше обыкновеннаго сѣна съ нихъ получить должно будетъ: ибо солнце осушаетъ тогда обнаженную землю, отъ чего молодая права, за недостаткомъ земной влаги, произведетъ ростъ весьма слабый.

Многія общества крестьянъ въ Брандебургіи начали, соображаясь учрежденіямъ отъ начальства, луга отъ весенней

скопо-

скошопасьбы щадить, и потчасъ обрѣли ошъ того пользу. Другіе того исполнить не могушъ, для того что не достаетъ имъ зимняго корму столько, чтобъ могли скошину въ домахъ до шѣхъ поръ содержать, пока на общихъ скошопасьбищахъ ошраснетъ шрава столько, чтобъ скошина набьшся могла. Объ этомъ упомянуто будетъ во второй половинѣ сего сочиненія въ XI Части, въ VIII главѣ, и при томъ поданъ будетъ совѣтъ, чтобъ помышлять о соломенномъ магазинѣ, и солону въ добрые годы запасать въ шаковомъ количествѣ, чтобъ во всѣ слѣдующіе годы доставало оной на рѣзку до половины Мая, дабы рѣзкою сею кормить, а на луга скошины не пускашь. Кой часъ это только одинъ годъ исполнено будетъ, сельскіе жители получають больше корму, и доведено будетъ къ тому, что при безпрестанно содержимомъ магазинѣ не будетъ нужды пускашь весною скошину на луга. Нужно это лишь въ первой годъ испытать, шо очевидность докажетъ о великой пользѣ, сколько она къ приращенію скотоводства и хлѣбопашества простирается, ешъли только непусканіе скошины весною на луга всегда наблюдашь.

Выше упомянуто, что когда одно изъ двухъ не минуемо, шо лучше шерпѣть осеннюю, нежели весеннюю пасьбу скоша на лугахъ. Однакожъ къ поправленію

ленію луговъ и сію опсшавишь должно: ибо въ разсужденіи возвышенныхъ луговъ опышы доказывающъ, что шрава на нихъ бываетъ лучше, когда пощадишся они опъ осенней скошопасшвы. Послѣ послѣдней скоски отшрасшавшя шрава предохраняетъ пошву луговъ сихъ не шокмо въ сухменную осень опъ сильного высыханія, но и зимою сосшавляетъ корнямъ покрышу опъ холода, а пошомъ по перемерзнушій и сошлѣній навозъ къ угсбженію пошвы луговой. Но есшлы луга низменны и мягки, шогда пасущаяся скошина вшашываешъ многіе шравные корни въ глубину, осшавляетъ ямки и шероховатосши. Ямки подъ зиму наполняются водою, кошорая замерзаешъ, а шравные корни слабѣющъ опъ шого или совсѣмъ погибающъ. Хошя же въ слѣдующую весну бугорки и ямки, опъ копынъ скошскихъ произшедшія и заравняшъ кашкомъ, но вредъ, льдомъ произведенный, шѣмъ не загладишся.

Л. О кошеніи луговъ и заготовленіи сѣна.

При кошеніи луговъ не маловажная производишся погрѣшность, когда пришомъ въ совѣшъ призывающъ болѣе выгоды, или старинное обыкновение, нежели собственно лучшее время, что шраву должно косишь шогда, какъ находишся она въ лучшихъ своихъ силахъ.

Когда прежде сего шла рѣчь о засѣяніи луговъ однимъ родомъ шравы, шамъ

глав-

главнѣйше съ основаніемъ совѣтовано, чѣмъ праву вообще во время ея цвѣту скашивать; ибо она бываетъ въ это время въ полной силѣ, въ лисахъ и стебляхъ приноситъ изобильнѣе сѣна, а оное хорошаго цвѣту и пріятнаго запаху. Когда же трава скошена будетъ по созрѣніи сѣменъ, тогда сила листовъ и стеблей въ половину будетъ уже изнощена; трава на своихъ цвѣтахъ теряющихъ стеблей опчасу высыхивается, высыхаетъ, обращается въ солому, и въ такомъ состояніи скошенная плохо отращиваетъ. Последнее происходитъ несравненно лучше, когда трава скошена будетъ, такъ сказать, въ своемъ юношесствѣ, то есть въ цвѣтѣ.

У кого самородные луга, на которыхъ злаки и травы разнаго рода стоятъ перемѣшанно, и поному не могутъ цвѣсти въ одно время, тому должно кошеніе свое разпоряжанъ по содержанію тѣхъ травъ, кои опчаси большее количество по видимому составляютъ, частью же прочихъ лучше, и спожутъ скошены бытъ въ полной своей силѣ, чѣмъ тѣмъ доставитъ сѣну лучшую доброшу. По крайней мѣрѣ должно это правило наблюдать всегда при закоскѣ, то есть первоначинаніи кошенія, когда время въ разсужденіи скопопаствы не можетъ терпѣть отлагательства, и чѣмъ поступить такимъ же образомъ съ отращивающею вторично травою. Ко-
ситъ

ситъ еще до цвѣту и недозрѣлую траву, хотя доброшы сѣна ни мало не поршитъ: ибо чрезъ то оное, а особливо молодымъ скошамъ, нѣкоторымъ образомъ пріятнѣе и вкуснѣе бываешъ; но шеряется припомъ очень много въ количествѣ сѣна.

Еще въ разсужденіи времени кошенія замѣшшь должно, что лучше оное производишь въ сухменную, нежели мочливую погоду; лучше надъ вечеръ и въ ночь, нежели рано поутру съ росю, а особливо когда трава росла и густа, а пошому ряды ея будутъ толсты; ибо въ мочливую погоду вскорѣ производитъ въ таковой травѣ отъ влаги жаръ и броженіе, что составляетъ первый спелень обезсиленія сѣна. Косцы конечно мочливую погоду сухменной предпочитающъ за шѣмъ, что тогда коса рѣжетъ лучше и работа легче, но таковое облегченіе въ работѣ лучше позволяющъ имъ съ правою низкою и рѣдкою, кошорой ряды бывающъ не толсты; съ высокою же и густою правою таковой предлогъ легкаго косою рѣзанія при дождливой погодѣ шѣмъ меньше позволенъ, что земля подъ нею мокра бываетъ и не высыхаетъ, кромѣжь того, по нашему предписанію, траву должно косить въ ея юношество, или когда цвѣтешъ. Старая переспоявшая трава напрошивъ бываетъ жестка, и въ сухмень косить оную шруднѣе.

Сѣно-

Сѣнокосѣ составляешъ по хозяйствен-
ное дѣйствіе, которое со всевозможнымъ
раченіемъ производить должно; ибо какая
бы нужда была имѣть на лугахъ лучшую
справу, когда сѣ нею при сушеніи на сѣно
не шакъ посшуплено будешъ, чшобъ учи-
нилась она прямо здоровымъ и сильнымъ
кормомъ. Луга должно щипать основані-
емъ скошководства, а пришомъ и земледѣ-
лія; кормъ сѣнной есть главное намѣреніе
онаго, шакъ что не на одно шокмо мно-
жесшво, но и на доброшу сѣна взирашъ
должно. Есть деревни, имѣющія въ раз-
сужденіи множесшва сѣна изоболіе, но на
доброшу онаго шамъ ни мало не смощряшъ,
и Хозяева шамошніе думаютъ, чшо все
уже сдѣлали, когда шолько оное сухимъ
прибрали. Они могли бы половину своего
изобилія въ справѣ продашъ своимъ имѣ-
ющимъ въ оной нужду сосѣдямъ, когдабъ
шолько о доброшѣ своего сѣна больше ра-
чили; поштому что въ лучшихъ деревняхъ
пригошвовленное сѣно имѣешъ въ себѣ
вдвое силы пишашельной, шакъ что она-
го шолько половина въ кормъ пошребна
прошиву сѣна худо пригошвовленного. При
великомъ множесшвѣ луговъ осшавляющъ
скошенную справу на произволъ судьбы,
переворачиваютъ и перешрясываютъ шоль-
ко по нуждѣ, и пришомъ равнодушно смощ-
ря на шо, двѣли недѣли пролежитъ
оная на рядахъ, или не пролежитъ. Боль-
шая частъ маломочныхъ Хозяевъ слѣду-
етъ

есть примѣру, видимому въ большихъ помѣстьяхъ; а есѣли кой-гдѣ кто ошѣ обыкновеннаго образа кошенія сѣна и опшупаетъ, а при томъ прилагаетъ всевозможное раченіе, бывають большею часью шѣ Хозяева, у коихъ луговъ мало, или оныя нанимають, но малое число у нихъ бываетъ шѣмъ доброшѣе; ибо чрезъ примѣчанія свои нашли они, что въ кормленіи скота добраго сѣна пошребна половина прошиву сѣна, худо прѣутошвленнаго.

Во впорой половинѣ сего сочиненія въ Часши XI, главѣ VIII, будетъ показано къ доброму загошвленію сѣна правило, а въ ономъ за основаніе положено, чтобъ праву не вдругъ высушивать, и не давая солнечному жару оную высасывать, а шѣмъ лишая сѣно большей часши его силы. Въ равномъ намѣреніи должно сѣно шакъ сохранять, чтобъ ночная роса, сколько возможно, меньше онаго касалась: ибо чѣмъ больше частей сѣно будетъ имѣть ошѣ солнца и росы прикосновенія, шѣмъ больше шрашится внутренней доброшы сѣна. Напослѣдокъ должно и на шо взирать, чтобъ сѣно (и эшо случается всего скорѣе, когда шрава ошѣ росы и дожда внутри промокнетъ) не разгорячилось и не начало прѣшъ. Въ эшомъ случаѣ цвѣшъ и запахъ совсѣмъ пропадаютъ, и шрава, бывшая сладкою, получаетъ по засушеніи въ сѣно совсѣмъ кислой вкусъ,

Часть III. Одѣл. 2. III шакъ

такъ чшо скопшъ бдяшъ оное не охотно, и подбивающъ подъ ноги. По сему правилу должно о всѣхъ худыхъ и добрыхъ сѣнахъ заключеніе дѣлать, дабы первыя сбывашъ съ рукъ, а послѣднія сберегашъ. Въ выше помянушой Часши и главѣ добрые роды сѣна будутъ обстоятельно описаны; а чшобъ чшпашелей въ ожиданіи выхода послѣднихъ Часшей сего сочиненія не подвергнуть терпѣнію, опишу я оныя и здѣсь предварительно. Объ обыкновенномъ способѣ прѣготовленія сѣна, чшобъ давать справѣ до шѣхъ порѣ на одномъ боку въ рядахъ лежать, пока оная высохнетъ, и послѣ перевернувъ, такимъ же образомъ поступашъ и съ другою стороною, упоминать я не буду.

- 1) Добрый и поднесъ еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мало употребительный способъ, и который обыкновенно называется *вѣтреное прѣготовленіе сѣна*, состоитъ въ томъ, чшобъ въ первый день по скошеніи праву на рядахъ не шрогать; на другой день оныя разбивающъ или расширяющъ; почти ежедневно сѣно ворочающъ, и пока еще роса не пала, надъ вечерѣ, пока права еще нагрѣта солнцемъ, сгребаятъ оное въ малыя копешки: ибо теплоша сѣя производшъ, что сѣно даже ночью внутри сохнушъ должно. Складываемыя копешки называютъ вѣтренными, пошому чшо по рыхлому оныхъ складыванію вѣтромъ

шромъ ихъ продуваетъ, и входящій воздухъ сушенію правы помогаетъ. Въ самомъ дѣлѣ истинно то, что сильно дующій вѣтръ ночью сѣно въ копешкахъ скорѣе сушитъ, нежели сохнетъ оное днемъ при тихой погодѣ и солнцѣ. Только при сильномъ вѣтрѣ должно наблюдать то, чтобы копны внизу класъ шире обыкновеннаго; дабы вѣтромъ ихъ не опрокинуло. Еслили вѣтръ усилился, оставляющъ копны нѣсколько просохшія не трогавъ, чтобы вѣтромъ былокъ не разносило, и сѣна шѣмъ не уменьшало. Кромѣ случая сильно дующаго вѣтра, сіи вѣтренныя копны на другой день, когда роса обсохнетъ, разбиваютъ тонкимъ слоемъ врознь, и до шѣхъ поръ ворожатъ, какъ сѣно довольно высохнетъ. Когда же случится дождь, копенъ не трогаютъ до ведреной погоды. Еслили сѣно большею частью довольно высохло, тогда вѣтренныя копны надъ вечеръ складываютъ побольше, чего прежде съ намѣреніемъ для того не дѣлаютъ, чтобы въ увеличенныхъ копнахъ излишняя влага сѣна въ сопрѣваніе или потъ не привела, отъ чего оное много своей доброшты пошеряетъ можетъ. Когда же окажется, что вѣтренныя копны ночью пропотѣли, должно оныя поуштру раскинуть и просушить. Еслили жаръ отъ солнца великъ, должно смотрѣть, чтобы

сѣна не пересушишь: сѣно не шокмо отъ шого очень безсилѣетъ, но и убавляется, для шого что пересохшіе листы и сѣбли ломаются, а шруха шакковая при навиваніи сѣна на вozy большою часшью пропадаетъ.

Траву осшавляютъ на рядахъ не шрогавъ, когда по скошеніи оной послѣдуетъ дождливая погода; или ряды, когда оные шолсты и высоки, переворачивающъ шолько граблями, а не разбивающъ. Естли дождливая погода продолжится, должно эшо производить не на другой, но въ шретій день. Далѣе сего оплагать не должно, чтообъ внизу лежащая шрава не пожелѣла, не заплеснѣла, или бы не сопрѣла. Когда же въшреннія копны смочитъ дождемъ, осшавляютъ ихъ по шѣхъ поръ не шрогавъ, пока обсохнетъ по крайней мѣрѣ поверхность. Естли же случится, что шогда дождь нѣсколько дней сряду продолжится, шогда въ шретій день сѣно необходимо должно перево-рошить, чтообъ оное внизу не сгнило.

Когда наконецъ сѣно до надлежащей его сухости доведено будетъ, а въ шомъ день свозить онаго будетъ не можно, шогда изъ опасенія, чтообъ не случилось дожда, складаваютъ въ большія копны, кои дѣйствію дожда больше сопротивляющся, нежели малыя. Естли оныя съ которой стороны дождемъ примочитъ, все мокрое сѣ-

сѣно граблями вычесывается вонѣ до сухова, когда вскорѣ послѣ дождя оное свозить должно будетъ. Вычесанное мокрое сѣно разпрушается, и частымъ переворачиваніемъ опять высушивается.

Не рѣдко случается, что не шерпящія ошсрочки жатвенныя работы высушеное сѣно поскорѣ свезти не допусаятъ, и принуждають оное нѣскольکو недѣль оставить въ копнахъ на лугу. Въ шаковыхъ обстоятельствахъ должно копны или сноги шакъ скласить, чѣобъ дождь оныхъ не проникъ: ибо, когда копна или сногъ складены будуть не хорошо, можетъ дождемъ оныя до подошвы промочивъ, сѣно учинить гнилымъ, плесневвымъ и вовсе негоднымъ. Къ сему намѣренію нужно, чѣобъ копны или сноги дѣлать сколько возможно больше, для того что малыя несравненно больше отъ дождя шерпятъ, нежели большіе. Навѣрное дождь проникаетъ внутрь оныхъ, когда вершина будетъ сорвана въпромъ, что не рѣдко случается въ грозы, бурями сопровождаемыя. Къ предупрежденію сего, нѣкоторые Хозяева, при складываніи сноговъ вшыкають въ землю по срединѣ оныхъ жердь, и очень прямо по оной сногъ выводятъ къ верьху плотно и оспрова-то, чѣобъ дождь спекалъ долой, и сногъ могъ бы вътру сопрошивляться. Удачно то будетъ, когда сногъ по

складкѣ прѣстоишѣ сущи; ибо сѣно въ это время осядетъ, и не будетъ шаково рыхло, какъ въ началѣ. Кто же хочетъ сногѣ сѣ лучшимъ образомъ отъ дождя зацѣпшѣ, долженъ верхній конецъ жерди столько изъ снога выставишѣ, чѣтобъ вдвое къ концу сему привязанная сноповая длинная солома вершину снога по зацѣпшѣи концовъ ея въ средину покрыла какъ бы кровлю. А чѣтобъ силою бурь вершины не сворошило, должно жердь выпыкать гибкую, и чѣтобъ солома изъ вершины снога шорчала не высоко, и шолько на пяшую или шесшую часть конца жерди. Въсто соломѣ можно употребляшѣ шросшникѣ, сшшникѣ и осоку.

- а) Такъ называемое *зеленое* и *темноватое* сѣно *Англичанѣ* начинашѣ нынѣ въ разныхъ мѣстахъ заслуживать одобреніе. Первое имѣшѣ совершенно зеленой цвѣтѣ, которой по нѣсколькихъ годахъ шакое же свѣжѣ ошпаешѣ, какъ бы сѣно вчера было скошено. Темноватое сѣно равномерно чрезъ нѣсколько лѣтѣ удерживаетъ цвѣтѣ свой, и превосходитъ зеленое прѣшнѣйшимъ запахомъ.

Кому угодно сдѣлать *зеленое сѣно*, должно послѣдовать сему предписанію: когда солнце очень жарко сіяетъ, шрава, какъ скоро скошена будетъ и нѣсколько полежитъ, преворачиваетъся.

Пере-

Переворачивашь оную должно почти ежечасно, чтобъ тѣмъ скорѣе просыхала, и отъ солнечнаго жару укрываема была; ибо долго полежавъ, онымъ высасывается и приводишся въ блеклоспъ. Какъ скоро сѣно высохнетъ, сгребаяшъ оное и свозяшъ подъ кровлю, или складывается на открытомъ воздухѣ въ скирды или стоги, коимъ описаніе вскорѣ приложено будетъ. Въ нѣкопорохъ мѣстахъ Вестпфаліи давно уже шаковымъ образомъ сѣно убираютъ, шраву непосредственно по скошеніи разгребаяшъ граблями въ тонкіе слои (именно за каждымъ косякомъ долженъ въ слѣдъ итти грабельщикъ), а потомъ поступаяшъ по вышеписанному.

Темноватое сѣно дѣлается шаковымъ образомъ: скошенная шрава по обыкновенному временно переворачивается, пока большею частью высохнетъ. Должно при семъ наблюдать, чтобъ въ сѣнѣ осталась нѣкошорая влага, къ опредѣленію степени которой потребны опытность и искусство. Потомъ весь запасъ сѣнной складывается въ стоги или въ сараяхъ, чтобъ содержащіяся въ сѣнѣ соки потъ или испареніе произвели, что сѣну не токмо не вредно, но еще и пріятнѣйшій запахъ сообщаетъ. Все дѣло тогда состоитъ лишь въ томъ, чтобъ улучшить надлежащій степень влажности въ сѣнѣ; почему Хозяинъ,

или прикащикъ его, долженъ въ прѣу-
гошовленіи сего рода сѣна самъ прису-
свовашъ, и по собсвенному усмо-
тренію заключаашъ, не имѣшъ ли еще
въ себѣ сѣно многой влажности, отъ
чего производитъ плесневѣлой, зашлой
и нездоровой кормъ. Желаящій испы-
ташъ дѣланіе сего шемновашаго сѣна,
можетъ оное лучше начашъ складыва-
ніемъ сѣна на опкрышомъ воздухъ въ
стоги и скирды. На свободномъ возду-
хѣ въ скирдахъ сѣно можетъ скорѣе
избавишся своей влажности, нежели
набишое въ сараяхъ, когда будетъ въ
немъ оной еще слишкомъ.

- 3) Еще опмѣнный способъ прѣу-
гошвенія сѣна сей: праву скоситъ безъ росы
и дождя, но совершенно сухую. Какъ
скоро она скошена, работники слѣду-
ютъ за косцами въ слѣдъ, и сгребаютъ
праву въ малыя копешки, около арши-
на съ четвертью вышиною, и столько
тонкія въ прорѣзѣ, чтобъ только спо-
яшъ могли прямо. Каждая копешка
слегка прикрывается выдергиваемою
изъ подъ-низу вокругъ копешки правую,
горстиахъ въ двухъ состоящую, и на-
крышка эта накладывается тонко и
такъ, чтобъ концы травы внизъ висѣ-
ли. Чрезъ это будетъ сѣно большею
частью внѣ опасности, развѣ вскорѣ
потомъ случится вихрь, и копешки
разворочаетъ и опрокинетъ. (Умѣрен-
ной

ной вѣтрѣ по этому предписанію сдѣланную покрышу сдернешь, для того, что она не имѣетъ никакой связи съ правою, въ копешкѣ лежащею. Искусные люди могутъ и при складываніи копешкѣ придашь таковой верхъ, кошорой бы имѣлъ связь съ нижнею правою, и могъ сильному вѣтру сопротивляясь. Когда таковая копешка простоитъ два или три дни, осядетъ она и сдѣлается половиною ниже отъ того, что права безпрестанно слезается, чѣмъ больше перяетъ своей влажности. Тогда она не токмо вѣтру сопротивившись, но и вершина ея бываетъ уже столько шверда, что вѣтромъ оную своропишь не можешь.) Сильной дождь не вдругъ можетъ глубоко проникнуть въ таковую копешку. Когда права складена въ ней будетъ суха, не можетъ она слечься такъ плотно, чтобъ внутри согрѣлась, хотябъ и два дни стояла, и столько остѣла, что сильной вѣтрѣ опроникутъ ее не можетъ. Оспавляющъ сѣно не прогавъ до тѣхъ поръ въ сихъ копешкахъ, пока по прилѣжномъ осмотреніи окажется, что оное въ большія копны складываемое будетъ ложиться плотно. Обыкновенно потребно къ сему времени дней восемь или недѣли двѣ, по состоянію погоды. Выгоды такового пріуготовленія сѣна состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Работа очень сокращается, потому что ни вполнѣ оной не надобно, чтобы по обыкновенію сѣно ворочать и разпрушать, и когда очень дождемъ смочить, взвертывать и разбивать.

2) Сѣно не столько разпрушается и прашился, какъ въ обыкновенномъ пріугошвленіи, когда оное на рядахъ лежитъ. При сѣнѣ бываетъ, что при сваливаніи въ валы несказанно много былинъ, заспрѣвающихъ въ справномъ жнивье, отъ грабель ускользаетъ и пропадаетъ. Когда копешки прямою чертою вдоль по ряду спаваясь, нѣтъ нужды сгребать ихъ изъ малыхъ въ большую копну, но одну по одной навивать на возъ, пока будетъ полно.

3) Сѣно остается почти таковожъ зелено, какъ было скошено, и удерживаетъ цвѣтъ свой въ величайшемъ совершенствѣ; ибо кромѣ самой малой части лежащаго на поверхности копенъ, которое блекнетъ, высыхаетъ прочее исподоволь и равнымъ образомъ.

4) Сохраняется оное даже большею частью отъ дождя, и не терпитъ поврежденія. Одно уже сіе обстоятельство заслуживаетъ отъ Хозяевъ сему способу сѣно-собиранія одобреніе.

Болѣе всего должно того смотрѣть, чтобы сѣно совершенно высохло прежде, нежели оное въ копны складушъ; ибо, хотя бы оное тогда ни мало не было

вла-

влажно, но вскорѣ заплесневѣетъ, и такъ плотно сляжется, что воздухъ ни мало его проникаетъ не можетъ. Почему нужно при спящей ведреной погодѣ кошеніе начинать поутру, тогда какъ роса на травѣ усохнетъ, и грабельщики не прежде бы начинали свою работу, какъ трава совсѣмъ будетъ суха, и тогда бы начинали уже сгребать въ копешки. Къ осыханію травъ нужно отъ прехъ до четырёхъ часовъ. Если же лугъ шаковаго положенія, что въшрѣ на концахъ его не довольно провѣивать можетъ, а косьба начинается обыкновенно въ 4 и 5 часовъ съ полуночи, то роса на толстыхъ рядахъ травы едва въ 11 часовъ или за часъ предъ полуднемъ усохнетъ.

Когда въ сѣнѣ будетъ большая часть дятловины, а погода въ это время мрачная, то нужно бываетъ иногда копешки разворачивать и пропускать въ нихъ свѣжаго воздуха, или совсѣмъ перекладывать низомъ вверхъ, при чемъ бывшее въ срединѣ выворачивать наружу.

Опыты также научили, что при семъ средствѣ сѣнособиранія сѣмена травныя, когда собираютъ оныя нужно, лучшимъ образомъ сберегаются, а на рядахъ напрошивъ того разсыпаются и пропадаютъ. (А именно здѣсь предполагается, что деревенскому Хозяину собственно сѣмена травныя нужны; ибо

ибо впрочемъ по вышеприведеннымъ правиламъ обязываешься онъ праву косишь, когда она зацвѣтешъ. Таковыя въ спѣлости сѣменъ скошенныя травы въ стебляхъ и листьяхъ своихъ составляютъ сѣно жесткое, годное только лошадямъ, для того что коровы и овцы жесткаго сѣна безъ нужды ѣсть не станутъ.)

Самая дяпловина и другіе роды кормныхъ травъ, посѣвомъ заводимыхъ, могутъ по сему же образу въ сѣно заготовляемы быть, а чрезъ то и больше и лучшаго сѣна получится; напротивъ отъ многокрашнаго ворожанія и разтрясанія листовъ дяпловинныхъ много отъ стеблей опламывается, и почти шрепья доля пропадаетъ. —

По сему способу сѣно-собиранія, который Г. Профес. Боровски въ своемъ *Альманажѣ* въ особенности выхвалилъ, пославилъ я въ нынѣшнемъ Юлѣ мѣсяцѣ при сильныхъ вѣтрахъ, сего года бывшихъ, траву въ копешки. Я вошкнулъ для всякой изъ оныхъ по жердочкѣ ольховой и ивовой, въ палецъ толщиною и въ полтора аршина длиною, съ конца завостренныхъ, въ землю, и складывалъ около оныхъ копешки къ лучшему сопротивленію вѣтрамъ. Когда запасши сошны двѣ таковыхъ скобленныхъ палочекъ (кои только при сильно дующихъ вѣтрахъ нужны), которыхъ каждой работникъ по 60 подѣ
мы-

мышкою или въ связкѣ легко нести можеть, естли не похочеть кшо возить оныхъ на лугъ: онѣ по ошправленіи должноти своей могутъ быть собраны, и въ сухомъ мѣстѣ сохраняемыя пролежашъ цѣлы множество лѣтъ. Для опыту взялъ я жердку, каковыми горохъ напериваютъ, около сажени вышиною, вошкнулъ и велѣлъ таковой вышины копну около оной сложить, но внизу въ основаніи шонѣ прочихъ, и чшобъ держалась съ шрехъ споронъ, вошкнулъ по палочкѣ. Таковымъ образомъ не упала она, и удержалась противу жестокой бури, послѣдовавшей на другой день съ грозою. Послѣ оказалось, что она нѣсколькими днями прежде другихъ высохла, для того что, какъ сказано, въ основаніи своемъ была не толста. При множествѣ луговъ это дѣйствіе можеть быть затруднительно, однакожъ полезно при сѣвѣ дятловины, когда въ жердяхъ повернуть скважины, вершковъ на шесть одна отъ другой разстояніемъ, и просунуть въ оныя палочки, вошкнувъ жерди, около оныхъ складывать въ копны дятловину. Это возпрепятствуетъ дятловинѣ разгорячаться, для того что не будетъ оной сверху давленія, и на каждыхъ шести вершкахъ будетъ свобода отъ поперечныхъ палочекъ, слои поддерживающихъ, проходишь воздуху.

М.

М. Способы къ сохраненію сѣна.

Когда Хозяева начнутъ спараться понынѣ большею частью столько пренебрегаемое луговое земледѣліе производить лучше, естественнымъ по слѣдствіемъ будетъ, что прежнихъ мѣстъ къ сохраненію сѣна, какъ по сараевъ и прочаго, доставасть не можеть на количесво умножающагося сѣна. Многимъ Хозяевамъ можеть быть недоставокъ къ тому въ мѣстахъ и удобности помышлять о новыхъ зданіяхъ. Равномѣрно многимъ Хозяевамъ великая окажется услуга, когда они при безпрестанно возвышающейся цѣнѣ на спроенные припасы сберегутъ иждивеніе, хотя бы и не было недоставка на ихъ дворахъ въ мѣстахъ къ новымъ зданіямъ. Въмѣсто оныхъ могутъ они, по подобію Англичанъ, хранить свое сѣно на открытомъ воздухѣ (*), и поступать шаковымъ образомъ:

Въ Англіи складываютъ кучу сѣна очень плотно, и такъ какъ бы навивали оное на возъ; но кладутъ оное не на голой, ибо отъ оной сѣно можеть въ себя влажностъ втягивать. Дѣлаютъ, пошому что въ Англіи снѣгъ рѣдко выше четверти аршина лежитъ глубиною, подмоштокъ на шолбахъ изъ досокъ, рѣдко наспланныхъ, едва въ поларшина вышиною.

На-

(*) Въ Нѣмецкой землѣ на открытомъ воздухѣ въ поляхъ и на дворахъ сѣна не складываютъ; а потому Авторъ и пишетъ сіе.

Наружной видъ этой кучи или скирда составляетъ главную вещь въ этомъ складываніи. Снизу бываетъ онъ узокъ, къ срединѣ всего шире, а опшуда вывершивается усшупомъ и остро, точно такъ, какъ кровля на домахъ. Наружныя спороны вычесываются граблями очень гладко, чшобъ не было нигдѣ ямъ и углубленій, куда бы дождь или снѣгъ зайши могъ.

Когда скирдъ получитъ означенную фигуру, покрываютъ оной длинною соломою такимъ образомъ, какъ избы крестыянскія, шолько до половины сверху, или по самое шю мѣсто, съ котораго скирдъ ко дну своему пойдетъ уже; съ этой половины весь низъ осшавляется безъ прикрыши, чшобъ воздухъ въ него безпрепятственно входитъ могъ. Однакожъ покрышная солома не привязывается на скирдъ, но шолько пригнѣшается сцѣпленными на срѣзѣ вершины другъ за друга деревянными крюками, или тонкими жердями, кои называются пришуги; однакожъ лучше къ сему употреблять двѣ сбишыя гвоздемъ тѣсницы. Накрывать соломою скирдъ начинаютъ снизу, пригнѣшаютъ оную накрѣпко и накладываютъ пару пришугъ; такъ продолжаютъ, пока весь скирдъ покрытъ будетъ. Прибиваніе и сглаживаніе соломы составляетъ при семъ главную уловку; соломой слой въ этой крышкѣ не бываетъ толще двухъ вершковъ или съ половиною.

Боль-

Большіе *скирды*, по меньшей мѣрѣ восьми сажень длиною и сажени получетверши шириною, называютъ Англичане *Reacks*, ш. е. спина; а малые *стоги* второкоснаго сѣна обыкновенно дѣлають большую частью круглые, и называютъ оныя тогда *Sacks*, ш. е. *пѣтушки* или *гребни*. Сѣно хранился въ оныхъ преизрядно, и выпускаетъ очень пріятной запахъ, когда будетъ скирдъ начать, или часъ онаго ошсѣчена.

Средство брать изъ скирда сѣно состоитъ въ семъ: имѣють длинной ножъ, подобной Англинской пилѣ, которымъ и дѣлываютъ такъ, какъ пилю, да и дѣлають ножи сѣи изъ старыхъ пилъ, сглаживая зазубрины, и ошпачивая остро. Всовываютъ ножъ эшотъ сверху въ скирдъ и рѣжутъ поперегъ, а потомъ съ боковъ, чтобы ошдѣлился вдругъ прямоугольной четвероспоронной кусокъ. Въ Англіи куски сѣи бывають обыкновенно нѣсколько подлиннѣе аршина, почти во столькожъ шириною, и въ доброй полуаршинъ толщиною. Вынимають ихъ цѣлкомъ, не разрывая, что и удобно, пошому что сѣно въ скирдъ очень плотно слегаешся; ошносять оныя, опушавъ крестъ на крестъ веревкою. Къ укладкѣ шаковые куски чрезмѣрно способны, и сославляютъ лучшую выдумку въ Англинскомъ Хозяйствѣ. Продають куски сѣи обыкновенно въсомъ.

Ког-

Когда часть скирда съ одной стороны до самого дна шаковымъ образомъ будешь вырѣзана, продолжаютъ далѣе, вырѣзывая другіе слои также сверху, кусокъ по куску, и скирду оспальному не будешь ошъ того никакого вреда; ибо опрѣзъ оспаеся прямъ, какъ спѣна, или представляетъ нѣсколько прямоугольныхъ боковъ. При каждой надобности въ сѣнѣ продолжаютъ опрѣзывать изъ скирда по вышеписанному, пока весь скирдъ изойдетъ, что иногда болѣе году продолжается, однако опрѣзу не прикрываютъ (*). Потребна къ сему лишь искусная рука, чтобъ стоявъ прямо рѣзать, частью по кускамъ вынимая, частью же оспѣкая сверху до низу спѣною. Въ Англіи каждой работникъ совершаетъ это съ исправностию, попому что сдѣлали привычку. —

Способъ, каковымъ въ Венгріи на открытомъ воздухѣ сѣно складываютъ, слѣдующій: по скошеніи и высушеніи сѣна складываютъ оное въ малыя копны, которыя *петренцами* называютъ. Петренца содержитъ столько, что два человека на двухъ жердяхъ неси могутъ. Таковыхъ сносятъ въ кучу по 30, по 40 и 50, и складываютъ изъ нихъ подобіемъ кегля сногъ. Оставляютъ сноги сіи до време-

Часть III. Отдѣл. 2. III ни

(*) Въ Россіи сѣно изъ скирдовъ оспѣкаютъ шопорами, что конечно не шаково удобно, какъ ножемъ по Англически.

ни спояшь на лугахъ. Когда стогъ хорошо осядетъ, закладываяющъ Хозяева за нижнюю часть онаго, отъ земли вершковъ на 14, двойною цѣпью, припрягаютъ къ оной воловъ шесць или восемь, и перевозятъ шакъ весь стогъ, въ кошоромъ бываетъ въсомъ ценшнеровъ по 25 и по 30, и больше, безъ всякихъ шѣлегъ (иногда съ шѣлегами) на другое мѣсто, гдѣ складываютъ по нѣскольку споговъ шаковыхъ, иногда больше ша, въ одинъ скирдъ, кошорому придаютъ видъ дому съ кровлею, шириною сажени въ чешыре и пять, а длиною отъ 10 до 40, и больше, вышиною же равно противъ ширины. Таковой великой скирдъ называется шамъ *трисе*. Въ сихъ трисахъ споитъ сѣно лѣтно и зиму на открытомъ воздухѣ въ полѣ до надобности; тогда выдвигаютъ изъ него сѣно крюкомъ, или отсѣкаютъ, и кормятъ онымъ скошину также на открытомъ воздухѣ. —

Изъ двухъ сихъ способовъ складывать сѣно на открытомъ воздухѣ, Англинской заслуживаетъ преимущество, и оной у насъ въ Нѣмецкой землѣ въ разныхъ мѣстахъ испытывая нашли, что когда оставишь сѣно на низменныхъ лугахъ до заморозовъ и способной перевозки въ стогахъ споятъ, скошина бѣстъ оное лучше того, кошорое лежало подъ крышею въ сараяхъ.

Поелику у насъ зимою снѣгъ напада-
етъ глубже, нежели въ Англіи, и попому
сногъ, въ лѣшю заспаивающійся, когда оной
стоитъ не на возвышеніи, во время шая-
нія снѣгу можеть быть подшопленъ: по-
чему лучше оные спавишь на возвышеніи,
или на подмосккѣ опѣ земли на аршинѣ
или больше. Можно сдѣлать къ сему не-
премѣнное основаніе для цоспилки полу
изъ дикихъ камней, или чпобѣ вмѣсто
полу класъ на нихъ рѣшешины изъ сле-
жекъ. У кого сѣно дробное, кошорое при
складываніи сквозъ рѣшешникъ можеть
проваливаться, можно на рѣшешникъ по-
сплать слой соломы, чпо сему запре-
пятствуетъ. Чпо же слегами рѣшешятъ
полъ рѣдко, производится для шого, чпобѣ
воздухъ снизу въ сногъ проходилъ. Когда
подшилается снизу солома, должно ко-
лосья у оной обрубить, дабы не привле-
кали они мышей искашь въ нихъ зеренъ,
и завесъ шупъ свои гнѣзда. Заведеніе
мышей въ сѣнѣ не должно считать за
ничпо: случилось, чпо они сѣно шакъ
переѣдали и пакосшили, чпо дѣлалось
оное какъ мякина, и скопинѣ бѣшь онаго
было не лзя.

Наружный видъ въ складкѣ сноговъ
составляетъ главную вещь, къ сохраненію
сѣна необходимую, а именно: по Англин-
скому образцу складываемые снизу со всѣхъ
чешырехъ сторонъ уже, а въ срединѣ брю-
шисто, и къ верьху сходящіеся острѣмъ;

ибо съ сноговъ и скирдовъ, шаковымъ образомъ складываемыхъ, мокрота, опшъ дождей и снѣгу стекаетъ такъ, что ни мало не касается основанія сногу. Внищаніе мокроты будетъ необходимо, когда низъ сногу или скирда не вдавнется успупомъ, а выпятитъ на равнѣ или больше прошивъ середины.

Почасу въ тѣ годы, кои мочливыми называютъ, между дождей бывающъ шолько на малое время промежки ведреной погоды, почему жатва и убираніе сѣна подвергаются великому затрудненію, а особливо сѣна почти не можно бываетъ прибрать сухаго совершенно. Когдажъ случится необходимость свозить сѣно влажное, то щастьемъ можно назвать, еслили оное получишъ въ сараяхъ шолько зашлой запахъ; напрошивъ шаковоежъ сѣно, снопявшее въ сногахъ, бываетъ совсѣмъ свободно опшъ шаковаго запаху; а это показываетъ, что сырость изъ сѣна въ сногахъ воздухомъ выпягиваетъ, и дѣлаетъ чрезъ то оное для скоша пріятнѣе и здоровѣе.

Въ мочливые годы главная выгода состоитъ въ томъ, чтобъ успѣть убрать сѣно въ бездождные дни и часы на скорую руку. Къ сему складываемые на лугахъ сноги служатъ всего лучше, и освобождаютъ опшъ возки сѣна домой; слѣдственно сокращающъ побѣдки, такъ что въ одинъ день можно больше сѣна свозить въ снота,

га, нежели въ цѣлую недѣлю домой: ибо кромѣ убавки въ разстояніи дороги, выигрывается и время въ навиваніи и складываніи воевъ, понеже на малое разстояніе накладываніе на возы можешь произвести скорѣе. Тутъ онаго не упытываешь, но кое какъ накладываютъ рыхло, ибо на маломъ разстояніи и по мягкому мѣсту оное не свалился. Складываніе также производишь скорѣе, когда кромѣ возящаго сѣно будетъ у стога другой работникъ, который помогаетъ оному сваливать, и послѣ кладешь въ стогъ, между шѣмъ какъ первой опять ѣдешь за сѣномъ, не дожидаясь, пока бывшее на возу въ стогъ покладено будетъ. Если же употребляешь перемѣнные шѣлеги, то работа пойдетъ еще скорѣе. А чтобы въ одинъ день своженнаго сѣна, и когда стогъ еще не довершенъ, дождемъ не смочило, должно въ запасъ имѣть нѣсколько сноповъ соломы, чтобы въ случаѣ дождя верхъ стога оною прикрыть: это скорѣе можно совершить, когда солома будетъ въ связкахъ, и можно будетъ оную послѣ обратно домой отвезти. Таковая запасная солома служитъ и къ тому, чтобы недокончанной стогъ закрывать на ночь; ибо не должно стоговъ шаковыхъ на ночь оставлять непокрытыми, потому что небольшой ночной дождь можешь промочить ихъ до пошвы, и принудить размешивать ихъ и сѣно пересушивать вновь.

Таковыя въ мочливое лѣто на лугу складенныя снога можно зимою въ ясную погоду вдругъ поднявъ, или мало по малу, перевезшъ домой въ сѣнной сарай; напротивъ въ сухменное лѣто лучше сѣно перевозить и близъ двора складывать въ скирдъ, дабы можно было изъ онаго ежедневно по Англински на расходъ отсѣкать, а именно большимъ острымъ ножомъ, чѣмъ въ острѣзѣ была всегда гладкая сѣнна, могущая проницанію мокроты прошивишся, также чѣмъ и сѣно не страшилось, безъ чего не обходится, когда выдергивать оное руками. Сверхъ того посредствомъ острѣзыванія сообщается сѣну пріятной запахъ, что въ сѣнномъ корму не мало важность составляетъ; ибо чѣмъ пріятнѣе запахъ отъ пищи, тѣмъ лучше скоты оную ѣдятъ. По сей причинѣ у нашихъ рачительныхъ Хозяекъ изъ самой сѣнарины ведется, чѣмъ ходящая за сѣномъ дѣвка не брала оное изъ сарая руками сверху, но выдергивала бы изъ подъ верхняго слою нарочно для того дѣлаемымъ деревяннымъ крюкомъ. Называется это выдергиваніемъ сѣна по тому, что крюкъ имѣетъ передній конецъ свой острѣ, и потому легко оной въ сѣно воткнушь, а вышаскиваетъ онъ изъ середины понемногу. А поелику отъ сего происходитъ волошамъ сѣннымъ шрение, то запахъ, бывшій дополъ какъ бы запертъ въ сѣнѣ, освобождается, разпространяется и

возбуждаетъ въ скопахъ позывъ на ѣду, дѣлая подобно какъ въ челоуѣкахъ, копорымъ съ полнымъ аппетишомъ вкушенная пища бываетъ пріятнѣе и здоровѣе. Одинъ шокмо доброй запахъ самъ по себѣ можетъ произвестъ, что коровамъ можно набить брюхо самымъ плохимъ кормомъ или мѣсивомъ, лишь бы оное пріятно пахло. Такъ на примѣрѣ, одна соломенная рѣзка, съ прибавкою небольшого количества сушеныхъ травъ, кои для сего крестьяне загошавливаютъ изъ числа шѣхъ, копорыя выдерживающіяся при полоніи хлѣбовъ, обваренная, разпареніе коихъ производитъ очень пріятной запахъ, копорой скошину понуждаетъ самага непипашельнаго корму или мѣсива сѣѣть много, а безъ этой приправы она до него и не допронудась бы.

Дяшловинное сѣно больше, нежели обыкновенное зашлону вкусу и запаху въ сараяхъ подвергается; почему храненіе онаго въ стогахъ можетъ быть удобнѣе. Однакъ изъ него въ разсужденіи толстыхъ его будылокъ, шакъ и лисшовъ, не лзя вывесъ шакихъ гладкихъ боковъ, какъ изъ простаго сѣна; хошя оное и можно большимъ острымъ ножомъ гладко обрѣзывать, но не сначала, а шогда, какъ уже оное довольно осядетъ. Съ ядренымъ и широколишпеннымъ сѣномъ равное обстоятельсшво. Для сего можно на складку стоговъ изъ дяшловиннаго сѣна дѣ-

лашь отверстыя сараи, подобныя тѣмъ, въ каковыхъ кирпичи къ сженію просушиваютъ. Само по себѣ разумѣется, что шаковыя сараи должны состоять изъ широкой кровли, протисникомъ или соломою покрытой, чтобы дождь до сѣна не доставалъ. Противу зимнихъ мешелей, заносящихъ снѣгъ, можно бока заставлять соломенными щипками, и оныя къ веснѣ опнивать. Заготовленіе сихъ щипковъ не составляетъ работы трудной: стоить только положить въ нѣкошоромъ разстояніи два шестка, разосплавъ на оныхъ соломѣ, положить сверху еще два шестика, и между оными соломѣ увязавъ, посипавъ на охвостье и разровнявъ. Весь сарай шаковой стоитъ не многого; нужно взглянувши только на кирпичной, и шопчасъ счесть, во что оной спанеть: онъ можетъ простоять лѣтъ 20 и 30, а мѣсто рѣшивъ, каковаго бытъ ему пространства. Таковыя сѣнные магазины уже въ другой или третій годъ могутъ за себя заплащивъ; и когда кто не въ силахъ построишь прочнаго къ сему зданію, долженъ довольствоваться шаковымъ сарайцомъ, имѣвъ предметомъ, чтобы посредствомъ онаго доставлять скотинѣ своей здоровое и пріятное надворное сѣно, въ перемѣну съ лежащимъ въ сѣнныхъ сараяхъ закрытыхъ, гдѣ рѣдко оное не поучаетъ заплоски.

И з в ѣ с т і е.

Въ слѣдующей четвертой Частии три главы: въ первой изъ оныхъ предлагается о кормныхъ травахъ, какъ-то дяшловинахъ или клеверахъ, о луцернѣ, объ эспарцетѣ, о разныхъ другихъ шравахъ, надлежащихъ въ число кормныхъ шравъ, и вновь къ онымъ помѣщаемыхъ, о посѣвѣ оныхъ, хожденіи за ними и употребленіи. Во второй о *скотопаствѣ*, предлагающія причины прошиву пасшвы скота въ полѣ, и возраженіе на оное; далѣе, доказательство о невыгодности пасьбы спада въ паровыхъ клинахъ съ возраженіемъ прошиву сего; о различныхъ состояніяхъ скошопасьбищъ, какъ-то весеннихъ или скудныхъ, полныхъ, опдаленныхъ, близкихъ, низменныхъ, возвышенныхъ, кислыхъ, сладкихъ, полевыхъ, лѣсовыхъ; о содержаніи скошопасьбищъ; совѣтъ объ учрежденіи скошопасьбищъ; совѣтъ объ учрежденіи оныхъ шамъ, гдѣ зимняго корму не можетъ доставать до половины Мая мѣсяца; о заведеніи кормнаго магазина. Въ шрешей главѣ описывается *овощникъ* или *поваренной огородъ*: въ ономъ предлагается буквою а) состояніе добраго овощника; б) парники и различіе оныхъ, прѣуготовление земли, обгораживаніе сихъ грядъ, накрываніе оныхъ, о навозѣ для паровыхъ грядъ, какъ класъ оной, о насыпаніи земли на навозъ, о содержаніи на-

возныхъ или паровыхъ, о календарѣ для навозныхъ грядъ, ш. е. какія распѣнія въ которомъ мѣсяцѣ сѣять и сажать, и какъ содержать, о паровыхъ грядяхъ къ особливому употребленію; в) о унавоживаніи овощника; г) о вскапываніи огородной земли; д) засѣваніе овощника; е) полоніе, поливаніе и пересадка. Попомъ описывающія разныя огородныя распѣнія и корни подробно по ихъ родамъ, какое пошребно за ними хожденіе и содержаніе, и проч.

Конецъ втораго Отдѣленія

и

ТРЕТІЕЙ ЧАСТИ.

О Г Л А В Л Е Н І Е

III Частн 2 Отдѣленія Хозяина и Хозяйки.

			Стран.
Продолженіе III главы.			
Горохъ.	-	-	4
Сѣрой полевой горохъ.	-	-	24
Англинской горохъ.	-	-	26
Горошекъ.	-	-	28
Горошекъ съ продолговатыми цвѣ-			
почными стебельками.	-	-	38
Крупной лѣсной горошекъ.	-	-	39
Лѣсной горошекъ съ яйцеобразны-			
ми листьями.	-	-	40
Птичей горошекъ.	-	-	41
Восточныхъ странъ горошекъ.	-	-	42
Двулѣтній горошекъ.	-	-	43
Бенгальской горошекъ.	-	-	45
Горошки, у которыхъ цвѣты сидятъ			
почти плотно къ углу листовому.			—
Повѣсной горошекъ.	-	-	—
Бѣлой горошекъ.	-	-	46
Малой весенній горошекъ.	-	-	52
Желшой горошекъ съ гладкими			
цвѣтами.	-	-	54
Желшой горошекъ съ мшисстыми			
цвѣтами.	-	-	—
Подзаборной горошекъ.	-	-	—
Виѣнской горошекъ.	-	-	55
Французской горошекъ.	-	-	—
Сочиво, сочевица или чечевица.	-	-	57
Конскіе бобы.	-	-	60
			Смѣсь

	Стран.
Смѣсь стручковыхъ плодовъ. - -	63
Горохъ съ рожью. - -	64
Горохъ съ овсомъ. - -	67
Горошекъ съ рожью. - -	68
Горошекъ съ ячменемъ. - -	70
Горошекъ съ овсомъ. - -	—
Горошекъ съ конскими бобами. - -	71
Горошекъ съ гречихою. - -	—
Сочевица съ ячменемъ. - -	72
Гречиха или греча. - -	73
Сибирская гречиха или кырлыкъ. - -	86
Вьющаяся гречиха. - -	88
Маисъ, кукуруза или Турецкая пше- ничка. - -	91
Просо. - -	112
Боръ или мѣлокое просо. - -	132
Турецкое просо. - -	133
Манна. - -	134
Глава IV. Маслоносныя растѣнія. - -	138
Рѣпное сѣмя. - -	140
Озимое рѣпное сѣмя. - -	142
Яровое рѣпное сѣмя. - -	157
Рапсъ или кользашъ. - -	163
Употребленіе и содержаніе масла изъ рѣпнаго сѣмени и рапса. - -	164
Выгоды отъ продажи масла. - -	169
Восточная Индѣйская маслиная рѣдка. - -	171
Рыжикъ. - -	174
Горчица. - -	175
Сафлоръ. - -	178
Солнечники или подсолнечники. - -	183
Макъ. - -	185
Дальнѣйшіе роды маслоносныхъ ра- стѣній. - -	195
Грецкіе орѣхи. - -	197
	Лѣс-

	Стран.
Лѣсные орѣхи. - -	197
Липовые орѣшки. - -	—
Буковые орѣхи. - -	198
Настоящая сурепица или па- шенная рѣдка. - -	199
Ненастоящая или подложная сурепица или пашенная горчица. - -	201
О выгнѣваніи масла. - -	203
Описаніе масляной мѣльницы. -	206
Глава V. Луговое земледѣліе. - -	220
Раздѣленіе луговъ. - -	221
Различныя пошвы луговъ. - -	222
На лугахъ расшущія травы и злаки. -	224
Показаніе и описаніе вредныхъ и испре- бленіе заслуживающихъ правъ на лугахъ и скопопасъбищахъ. -	228
Хвощъ. - -	235
Суковатыми листьями снаб- женный или лѣсной хвощъ. -	—
Хвощъ, вырастающій купно съ го- лыми и лиственными стеблями. -	236
Сосенка, или пашенной хвощъ. -	—
Угловатыми спволами расшущій хвощъ или болошной хвощъ. -	—
Гладкой почти голой хвощъ или глинистой хвощъ. - -	237
Острой почти голой хвощъ, судо- мой или зимозеленой хвощъ. -	—
Ранункули. - -	239
Ранункули съ цѣльными листьями. -	—
Лютикъ или спелющійся ранун- куль. - -	—
Ползучій ранункуль. - -	240
Лютикъ пряморасшущій. - -	—
	Ра

Ранункуль съ раздѣленными и со- спавными листьями. - -	241
Многоцвѣтной желтой лютикѣ, или лягушечій перецѣ и ядови- шая пѣтушья нога. - -	242
Желшоватый лютикѣ. - -	—
Ползучій лютикѣ. - -	243
Прямостоящій многоцвѣтный ра- нункуль. - - -	—
Прямостоящій многоцвѣтной лю- тикѣ. - - -	244
Прямостоящій многоцвѣтной лю- тикѣ съ колючими сѣменами. -	245
Бѣлой водяной лютикѣ. - -	—
Красномолочникѣ. - - -	—
Малая ласповичная трава. -	247
Простой луговой склизѣ. - -	—
Собачья петрушка. - - -	248
Обыкновенная блошная трава. -	—
Водяной перецѣ. - - -	249
Короткоколосная блошная трава. -	—
Денежникѣ. - - -	250
Пашенная или полевая мята. -	251
Рябинка дикая. - - -	252
Луговой базиликѣ. - - -	253
Однолѣтной луговой базиликѣ. -	—
Многолѣтной луговой базиликѣ. -	254
Ситникѣ или жабикѣ. - -	255
Желтомохорочникѣ или ястреби- ная трава. - - -	256
Широколистная чемерица. -	258
Конопельникѣ. - - -	259
Эвфорбія. - - -	261
Широколистная эвфорбія. -	262
Крутолистная эвфорбія. -	—

	Стран.
Солнечная эвфорбія.	263
Волчье молоко.	—
Малая эвфорбія.	264
Болотная эвфорбія.	—
Колючій салашъ.	265
Весенняя вѣпреница.	266
Висячая весенняя вѣпреница.	267
Висячая вѣпреница съ заворочен- ными цвѣточными лисками.	268
Поручейница.	271
Поручейница малая бѣлая.	272
Вѣхъ или водяная болиголова.	273
Водяной пупъ.	279
Конскія сѣмена права.	280
Красной каменоломъ.	283
Солнечная роса.	285
Засѣваніе луговъ однимъ родомъ правы.	287
Показаніе лучшихъ злаковъ.	299
Медвяная права, конская права, пырей хлѣбообразной мягкой.	307
Многоцвѣтной водяной шишков- никъ, или водяной пырей.	312
Луговой овесъ, дикой овесъ, рай- грасъ или фроманшаль.	315
Луговой лисій хвостъ.	319
Спелющійся водяной лисій хвостъ.	321
Анеоксанфъ желтая благовонная права, желтая донная права или лавендель.	—
Пырей или собачья права.	324
Гладкая вислая перловая права.	330
Собачья права.	331
Пухъ.	336
Скопская права.	338
Тимофеева права.	346
Уна-	

	Спран.
Унавоживаніе луговъ. - - -	349
Вычищаніе луговъ отъ моху, крош- выхъ кочекъ и кустарниковъ. -	353
Обсушиваніе мокрыхъ луговъ. - -	358
Поливаніе луговъ. - - -	366
О непусканіи на луга скопины. -	378
О кошеніи луговъ и заготовленіи сѣна.	381
Способы къ сохраненію сѣна. - -	398

УКАЗАТЕЛЬ

На содержащіяся въ сей Части первенствующія вещи.

Б.	Стран.	Г.	Стран.
БОРЪ. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 132		ГОЛОВНЯ , раздѣленіе оной. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 238	
В.		— производитъ ве- ликой уронъ въ зер- нахъ. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 241	
ВОРОВЫ , какъ оныхъ ощущашь отъ пло- довъ древесныхъ и полевыхъ. Ч. III. Ошд. 1. - - 343		— различныя мнѣ- нія о головнѣ раз- ныхъ писателей, отъ чего она про- исходитъ: Тулазово и Тильешово. Ч. III. Ошд. 1. - - 241, 244	
ВЪЯНІЕ или <i>очищеніе</i> <i>хлѣба</i> . Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 50		— Паюмерово. Ч. III. Ошд. 1. - - 247	
— какъ держашь пришомъ лопату; употребленіе <i>мету-</i> <i>шки</i> . Ч. III. Ош- дѣл. 1. 51, 52, - 53		— Бершрандово. Ч. III. Ошд. 1. - 249	
— ошпыргъ или чо- лушко. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 54		— предохранитель- ныя средства отъ головни. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 250	
— озадки и сорныя травы. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 54, 55		— мнѣніе Экхарто- во. Ч. III. Ошд. 1. 254	
— вѣяльныя маши- ны, хлѣбныя щел- куши. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 57, 58		— Минхаузенново. Ч. III. Ошд. 1. - 257	
Часть III. Ошдѣл. 2.		ГОРОХЪ. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 3 Ъ ГО-	

Стран.	Стран.
ГОРОХЪ, для чего по- сѣвъ онаго всюду полезенъ. Ч. III. Омдѣл. 2. - - 23	— горошекъ съ ов- сомъ, конскими бо- бами, съ гречихою. Ч. III. Омдѣл. 2. 70, 71
— приуготовление подъ него пашни, и какая земля подъ не- го лучше. Ч. III. Омд. 2. - - 5	ГРЕЧИХА или греча. Ч. III. Омдѣл. 2. - 73
— ранней и позд- ней. Ч. III. Омд. 2. 7	— о времени къ собиранію гречихи, и средствахъ къ тому. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - 76, 80
— о собираніи го- роху съ поля. Ч. III. Омдѣл. 2. - 15	— мнѣніе о кру- пахъ грешневыхъ. Ч. III. Омдѣл. 2. - 84
— сѣрой полевой горохъ. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - - 24	ГРЕЧИХА, Сибирская или Кырлыкъ. Ч. III. Омдѣл. 2. - 86
— Англинской го- рохъ. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - - 26	— вьющаяся гречи- ха. Ч. III. Омдѣл. 2. 88
— горохъ съ рожью. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - - 64	Д. ДИНКЕЛЬ или красная пшеница, ш. е. пол- ба. Ч. III. Омдѣл. 1. 300
— горохъ съ ов- сомъ. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - - 67	ДОМОЛАЧИВАНІЕ хлѣ- ба. Ч. III. Омдѣл. 1. 68
ГОРОШЕКЪ. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - - 28	ДѢЛАНІЕ скорбила. Ч. III. Омдѣл. 1. - 215
— зеленой горошко- вой кормъ. Ч. III. Омдѣл. 2. - - 34	Ж. ЖИТНИЦА или амбаръ. Ч. III. Омдѣл. 1. 96
— разные роды го- рошковъ. Ч. III. Ом- дѣл. 2. - - 38	— какимъ образомъ оную строить. Ч. III, Омдѣл. 1. 97, 101, 106
— горошекъ съ рожью и ячменемъ. Ч. III. Омдѣл. 2. 68, 70	— какъ содержать въ нихъ хлѣбъ. Ч. III. Омдѣл. 1. - 110
	ЖИ-

	Стран.
ЖИТНИЦА, какимъ образомъ предохра- нить зерна отъ хлѣб- ныхъ червей. Ч. III.	
Ошдѣл. 1. - -	118
— о гипсовыхъ по- лахъ въ житницахъ.	
Ч. III. Ошдѣл. 1. 132, 141	
З.	
ЗАМОЛОТНОЙ реэстръ.	
Ч. III. Ошдѣл. 1. 95	
ЗАМѢНЪ хлѣба хлѣ- бомъ. Ч. III. Ош.	
дѣл. 1. - -	170
ЗЛАКИ, что значатъ?	
Ч. III. Ошдѣл. 2. 299	306
— описаніе различ- ныхъ родовъ зла- ковъ. Ч. III. Ош.	
дѣл. 2. - -	307
— медвяная справа.	
Ч. III. Ошдѣл. 2. —	
— водяной пырей	
Ч. III. Ошдѣл. 2. -	312
— луговой овесъ. Ч.	
III. Ошдѣл. 2. -	315
— луговой лисій хвостъ. Ч. III. Ош.	
дѣл. 2. - -	319
— Анфоксанфъ. Ч.	
III. Ошдѣл. 2. -	321
— пырей или соба- чья права. Ч. III.	
Ошдѣл. 2. -	324
— перловая права.	
Ч. III. Ошдѣл. 2. 330	
— собачья права. Ч.	
III. Ошдѣл. 2. -	331

	Стран.
ЗЛАКИ, кистерь. Ч. III.	
Ошдѣл. 2. -	334
— пухъ. Ч. III. Ош.	
дѣл. 2. - -	336
— шотландская справа.	
Ч. III. Ошдѣл. 2. 338	
— бирдъ - грасъ. Ч.	
III. Ошдѣл. 2. -	340
— Тимофеева пра- ва. Ч. III. Ошдѣл. 2. 346	

К.

КОЛЬЗАТЬ, смотри	
<i>Рансб.</i>	
КОНСКІЕ бобы. Ч. III.	
Ошдѣл. 2. - -	60
КРУПЫ, о разныхъ ро- дахъ оныхъ. Ч. III.	
Ошдѣл. 1. 200, 205	
— о дѣланіи крупъ перловыхъ. Ч. III.	
Ошдѣл. 1. 205, 206	

Л.

ЛАПША, какъ дѣла- ютъ вермичели. Ч.	
III. Ошдѣл. 1. 118, 219	
ЛУГА, о луговомъ земледѣліи. Ч. III.	
Ошдѣл. 2. - -	220
— о растущихъ на лугахъ травахъ и злакахъ. Ч. III. Ош.	
дѣл. 2. - - -	224
— показаніе и опи- саніе вредныхъ и истребленіе заслу- живающихъ травъ.	
Ч. III. Ошдѣл. 2. 228, 287	

Стран.	Стран.
ДУГА, застѣваніе луговъ однимъ родомъ травы. Ч. III. Ошдѣл. 2. 287	шребленіе листовъ въ кормъ скоту. Ч. III. Ошдѣл. 2. 108, 112
— показаніе лучшихъ злаковъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. 299-348	МАКЪ, описаніе онаго. Ч. III. Ошдѣл. 2. 185, 187
— унавоживаніе луговъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 349	— какія головыцы избирають на сѣмена. Ч. III. Ошдѣл. 2. 187, 194
— вычищеніе луговъ отъ мхи, ко- чекъ и кустовъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 353	МАННА, или <i>Шваде</i> или <i>небесная роса</i> , ростѣніе изъ кото- раго дѣлають кру- пу лучшую саго и пшено срадинское. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 134
— обсушиваніе мо- крыхъ луговъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 358	МАСЛОНОСНЫЯ растѣ- нія. Ч. III. Ошдѣл. 2. 138
— поливаніе или на- водненіе луговъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 366	— роды оныхъ: рѣп- ное сѣмя. Ч. III. Ош- дѣл. 2. — - 140
— о непусканіи на луга скотины. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 378	— сѣмое рѣпное сѣ- мя. Ч. III. Ошдѣл. 2. 142
— о кошеніи лу- говъ. Ч. III. Ош- дѣл. 2. — - 381	— яровое рѣпное сѣ- мя. Ч. III. Ошдѣл. 2. 157
М.	— рясень. Ч. III. Ош- дѣл. 2. — - 163
МАИСЪ или кукуруза или початки. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 91	— употребленіе и содержаніе масла изъ рѣпнаго сѣмени. Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 164
— какъ ошдѣляють сѣ початковъ зер- на. Ч. III. Ош- дѣл. 2. — - 101, 103	— восточно-Ин- дѣйская масляная рѣдька. Ч. III. Ош- дѣл. 2. — - 171
— хлѣбъ изъ оныхъ какъ приготавливать? Ч. III. Ошдѣл. 2. — - 104	— рыжикъ, горчи- ца. Ч. III. Ош- дѣл. 2. — - 174, 175
— пиво варить и гнать вино, и упо-	МАСЛО

	Стран.
МАСЛОНОСНЫЯ растѣ-	
нія. Сафлоръ. Ч. III.	
Ошдѣл. 2. - - -	178
— черн я капуста,	
солнечники. Ч. III.	
Ошдѣл. 2. - - -	183, 183
— макъ. Ч. III. Ош-	
дѣл. 2. - - -	185
— прочіе роды масло-	
носныхъ растѣній.	
Ч III Ошдѣл. 2. -	195
МАСЛО, о выгнѣтаніи	
оного. Ч. III. Ошд.	203
МАСЛЯНАЯ мѣльница.	
Ч. III. Ошдѣл. 2. -	206
— примѣченіе къ	
выгодному битью	
масла. Ч. III. Ош-	
дѣл. 2. - - -	212
МАТЕРИНКА, см. ош.	
<i>Цизоръ.</i>	
МОЛ ТИЛЬНЫЯ маши-	
ны; описаніе и опре-	
дѣленіе оныхъ. Ч. III.	
Ошдѣл. 1. 79, 84,	89
МОЛОТЪБА. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	13
— число молошди-	
щиковъ. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	23
— змолотъ Ч. III.	
Ошдѣл. 1. - - -	28
— укладываніе сно-	
повъ на шокъ. Ч.	
III. Ошдѣл. 1. -	31
— первая перебивка	
сноповъ. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	35

	Стран.
МОЛОТЪБА домолачи-	
ваніе сноповъ. Ч. III.	
Ошдѣл. 1. - - -	35
— связываніе обмо-	
лоченной соломы. Ч.	
III Ошдѣл. 1. -	43
— выкладка о пла-	
тѣм а шильщанамъ.	
Ч. III. Ошдѣл. 1. -	73
— <i>молотъба м-</i>	
<i>шадъми.</i> Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	90
МЪРА хлѣба въ гу-	
миѣ по обмолаче-	
ніи. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. 49, 59, 61, 65, 67	
МЫШИ, какъ сбере-	
гать ошѣ н ихъ	
хлѣбъ въ житни-	
цахъ. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	226
О.	
ОВЕСЪ, описаніе ро-	
довъ и земледѣліе	
его. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	364
— шяжеловѣсной Ан-	
глинской. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	378
— гладкой черной.	
Ч. III. Ошдѣл. 1. -	380
— Турецк. й. Ч. III.	
Ошдѣл. 1. - - -	382
— голой. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	384
ОПИСАНІЕ хлѣбныхъ	
родовъ. Ч. III. Ош-	
дѣл. 1. - - -	230

Стран.	Стран.
<p>ОПИСАНІЕ хлѣбныхъ родовъ. Пшеница. Ч. III. Ошдѣл. 1. - - 230 — рожь. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - 185, 307 — ячмень. Ч. III. Ошдѣл. 1. - 323, 324 — овесъ. Ч. III. Ошд. 1. 364 — горохъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. - - 3 — горошекъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. - - 28 — сочиво. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 57 — конскіе бобы. Ч. III. Ошдѣл. 2. - 60 — цизеръ. Ч. III. Ошдѣл. 2. - - 61 — гречиха. Ч. III. Ошдѣл. 2. - - 73 — майсь. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 91 — просо. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 112 — манна. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 134</p>	<p>ПРОСО, мѣкое просо, или боръ. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - - 132 — Турецкое просо. Ч. III. Ошдѣл. 2. - 133 ПШЕНИЦА. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 202 — озимая. Ч. III. Ошдѣл. 1. - - 232 — паханіе земли подъ нее и сѣвъ. Ч. III. Ошдѣл. 1. - 234 — пристриганіе. Ч. III. Ошдѣл. 1. - 277 — время посѣванія. Ч. III. Ошдѣл. 1. - 284 — обыкновенная яровая. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 287 — усатая. Ч. III. Ошдѣл. 1. - - 291 — Польская, Пор- тугальская, Вен- герская. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - 293-295 — Англическая Ч. III. Ошдѣл. 1. - 297 — многолѣтная. Ч. III. Ошдѣл. 1. - — — красная. Ч. III. Ошдѣл. 1. - - 300</p>
П.	
<p>ПОЛЕНТА. кушанье ишадіанское, дѣлае- мое изъ маису. Ч. III. Ошдѣл. 2. - 105 ПРОСО. Ч. III. Ошдѣл. 2. 112 — о земледѣліи для снаго. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - 114, 128 — о крупахъ изъ проса. Ч. III. Ош- дѣл. 2. - 129, 132</p>	<p>Р. РАПСЪ или колызатъ. Ч. III. Ошдѣл. 2. - 163 РОЖЬ. Ч. III. Ош- дѣл. 1. - - 185, 307 РОЖЬ</p>

Стран.

Стран.

РОЖЬ, приуготовление
земли подъ нее и
сѣвъ. Ч. III. Ом-
дѣл. 1. - - 307
— яровая рожь
Ч. III. Омдѣл. 1. - 312
— кустовая рожь.
Ч. III. Омдѣл. 1. - 315
— Архангельская
рожь. Ч. III. Ом-
дѣл. 1. - - 320
— Воложская рожь.
Ч. III. Омдѣл. 1. - 321
— распунивая. Ч.
III. Омдѣл. 1. - - 322
РѢПНОЕ сѣмя. Ч. III.
Омдѣл. 2. 140, 142, 157

C.

САФЛОРЪ, маслосное
и красильное растѣ-
ніе. Ч. III. Омдѣл. 2. 178
СОЧЕВИЦА, *сочиво* или
исчевна Ч. III. Ом-
дѣл. 2. - - - 57
— сѣвъ оной смѣ-
шавъ съ ячменемъ.
Ч. III. Омдѣл. 2. - 72
СМѢСЬ стручковыхъ
плодовъ. Ч. III. Ом-
дѣл. 2. - - - 63
СТРУЧКОВЫЕ плоды.
Ч. III. Омдѣл. 2. - 64
СУРѢПИЦА. Ч. III. Ом-
дѣл. 2. - - 199, 201
СѢМЕНА травяныя
какъ собирать. Ч. III.
Омдѣл. 2. - - - 348

СѢНОКОСЪ, пригото-
вленіе сѣна. Ч. III. Ом-
дѣл. 2. - - - 384
— по Англинскому
образцу зеленого и
темноватаго. Ч. III.
Омдѣл. 2. - - - 390
— еще особливой спо-
собъ сушенія сѣна.
Ч. III. Омдѣл. 2. - 396
— способы къ хра-
ненію сѣна. Ч. III.
Омдѣл. 2. - - - 398

T.

ТАБАКЪ, сѣмена его да-
ютъ много масла. Ч.
III Омдѣл. 2. - - 195
ТРАВОВѢДѢНІЕ полезно
деревенскимъ жи-
телямъ. Ч. III. Ом-
дѣл. 2. - - - 228
ТРАВЫ, показаніе
вредныхъ и употребле-
ніе заслуживающихъ.
Ч. III. Омдѣл. 2. - 228
— подробное описа-
ніе вредныхъ травъ
со способами къ ис-
требленію оныхъ. Ч.
III. Омдѣл. 2. - - 231

У.

УВЫЛЬ хлѣба въ жи-
тницахъ, какъ-то
усышка, ушечка,
мышьядь. Ч. III.
Омдѣл. 1. - - 223

X.

Стран.

Стран.

Х.

ХАБОТЪЕ. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	45
ХЛѢВЪ, о храненіи и	
употребленіи раз-	
ныхъ зеренъ къ	
собственному расх-	
ду и на продажу.	
Ч. III. Отдѣл. I. 96	141
— продажа хлѣба.	
Ч. III. Отдѣл. I. -	143
ХЛѢВНЫЕ РОДЫ. Ч. III.	
Отдѣл. I. - - -	230
— хлѣбные цѣны. Ч.	
III. Отдѣл. I. 151, 184	
— хлѣбные черви,	
описаніе оныхъ и	
способы къistre-	
бленію. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	118, 130
ХЛѢВЫ, искусственное	
употребленіе оныхъ.	
Ч. III. Отдѣл. I. -	184
— ржи, печеніемъ	
хлѣбовъ. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	186
— шоргъ ржаную	
мукою. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	187
— въ кормъ ско-	
пашнѣ, въ инокуре-	
ніе. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	188, 189

ХЛѢВЫ, ямению. Ч. III.


Отдѣл. I. - - -	193
— писаницы. Ч. III.	
Отдѣл. I. - - -	202
— овса. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	221

Ц.

ЦИЗЕРЪ или материн-	
ка. Ч. III. Отдѣл. 2.	61

Ч.

ЧЕЧЕВИЦА, смотри	
Осошница	
ЯЧМЕНЬ, описаніе ро-	
довъ онаго: озимой	
ячмень. Ч. III. От-	
дѣл. I. - - -	323, 324
— яровой ячмень. Ч.	
III. Отдѣл. I. - - -	330
— малый ячмень.	
Ч. III. Отдѣл. I. -	333
— двугранной ма-	
лой ячмень. Ч. III.	
Отдѣл. I. - - -	339
— и бесной ячмень.	
Ч. III. Отдѣл. I. -	340
— пшеницы ячмень.	
Ч. III. Отдѣл. I. -	344
ЯЧМЕНЬ подсобной. Ч.	
III. Отдѣл. I. - - -	346



ms. 3280

